

ECOLOGÍA

Bachillerato tecnológico

José Francisco Gómez

DELTA LEARNING

Ecología

Segunda edición 2024

Copyright © Delta Learning

ISBN: 978-607-8882-36-3

Impreso en México

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

Registro número: 4041

Contacto: 800 450 7676

Correo: contacto@deltalearning.com.mx

deltalearning.com.mx

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de estas publicaciones puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse de ninguna forma o por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación o de otra manera, sin el consentimiento previo del editor, incluyendo, entre otros, en cualquier red u otro almacenamiento o transmisión electrónica, o transmisión para aprendizaje a distancia.

Dirección editorial: Delta Learning®

Editor en jefe: Gabriel Romero Hernández

Autor: José Francisco Gómez Rodríguez

Corrector: Fernando Pérez Rosas

Diseño: Guadalupe González

Diseño de portadas: Elio Teutli Cortés

Imágenes: Adobe Stock

Aviso de exención de responsabilidad:

Los enlaces provistos en este libro no pertenecen a Delta Learning. Por lo tanto, no tenemos ningún control sobre la información que los sitios web están dando en un momento determinado y por lo tanto no garantizamos la exactitud de la información proporcionada por terceros (enlaces externos). Aunque esta información se compila con gran cuidado y se actualiza continuamente, no asumimos ninguna responsabilidad de que sea correcta, completa o actualizada.

Los artículos atribuidos a los autores reflejan las opiniones de los mismos y, a menos que se indique específicamente, no representan las opiniones del editor. Además, la reproducción de este libro o cualquier material en cualquiera de los sitios incluidos en este informe no está autorizada, ya que el material puede estar sujeto a derechos de propiedad intelectual.

Los derechos están reservados a sus respectivos propietarios y Delta Learning no se responsabiliza por nada de lo que se muestra en los enlaces provistos.

ÍNDICE

Unidad 1

Ecología, sustentabilidad y desarrollo sustentable 8

¿La Ecología es una ciencia experimental? **17**

Ecología, el método científico y la capacidad de predicción **22**

- Los tipos de variables y las tablas de datos en ecología. 23
- Ramas de la Ecología 34
- Patrones en la biodiversidad 39

Sustentabilidad y desarrollo sustentable como entorno de debate **43**

- Los tres ámbitos de la sustentabilidad 45
- Objetivos del desarrollo sostenible. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 47

Investigación experimental, investigación por muestreo y empleo de modelos matemáticos en Ecología **49**

- Experimentos 49
- Muestreos 54

Ley de tolerancia y el mínimo de Liebig (factores limitantes) **57**

- Pensamiento matemático en ecología 58

Unidad 2

Estructura, propiedades y función de los elementos que integran a los ecosistemas 70

El ecosistema donde vivo **77**

- ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? 78
- Las poblaciones y sus características generales 80
- Las comunidades y sus características generales 93
    - Índices de biodiversidad como aproximaciones matemáticas 97
    - Diversidad Alfa, Beta y Gamma 99

Funcionamiento y productividad de los ecosistemas **107**

- Flujo de energía (productividad y soporte del sistema) 107
- Ciclos de nutrientes (ciclos biogeoquímicos) 111
    - Ciclo del hidrógeno (Piché-Choquette & Constant, 2019) 113
    - Ciclo del carbono 113
    - Ciclo del oxígeno 113
    - Ciclo del nitrógeno 113
    - Ciclo del fosforo 114
    - Ciclo del azufre 115
- Redes ecológicas (sistemas biológicos complejos) 116
- Representación general de los sistemas biológicos (ecorregiones y biomas) 123

Unidad 3

Servicios ecosistémicos y huella ecológica 132

Los bienes y servicios que obtengo del ecosistema **139**

Impactos ambientales, perturbación y disturbios ecológicos. **149**

Mi huella ecológica, mi huella hídrica y mi huella de carbono **164**

- Huella hídrica 166
- **Huella de carbono** **169**
- **Energías renovables y ciudades sustentables** **171**
    - **Energías renovables** **172**
    - **Ciudades sustentables** **175**
    - El índice de biodiversidad urbana como una estrategia innovadora para sustentabilidad. 176
- Restauración de los ecosistemas 182

PRESENTACIÓN

La educación ambiental de los niños y jóvenes del país debe contribuir a lograr un desarrollo que contemple la preservación de los recursos naturales para las futuras generaciones y mitigar el impacto que las actividades humanas causan al ambiente, así como contrarrestar el aumento de la desigualdad social. En consecuencia, los cursos de Ecología y Ecología y Medio Ambiente tienen como eje rector el desarrollo sustentable y consideran que para lograrlo, la sociedad tiene que avanzar de manera equilibrada en el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.

La educación ambiental propuesta vincula a los sujetos con su entorno natural y con la sociedad a la que pertenecen, esto es, no se trabajan contenidos circunscritos exclusivamente al ámbito disciplinar de la ecología, sino también aquellos que se refieren a la sustentabilidad.

Debido a que el pensamiento y el desarrollo cognitivo tienen como base la formulación y la resolución de problemas, y a que al resolver un problema se activa el pensamiento para el logro de una meta práctica, ya sea personal o interpersonal, la propuesta involucra un proceso de aprendizaje focalizado en las causas y posibles soluciones a problemas ambientales concretos, que se analizan desde varias perspectivas. Esto permitirá al alumno construir explicaciones sencillas de una realidad social y medioambiental compleja.

La selección de contenidos se realizó a partir de cuatro ideas principales de la Ecología y de la Educación Ambiental, que permiten al alumno comprender y explicar los hechos, fenómenos y problemas ambientales, sus causas y la importancia de la participación de la ciencia, la tecnología y la sociedad para resolverlos. Así, las ideas que estructuran los contenidos de Ecología y de Ecología y Medio Ambiente son:

- **Interrelación.** Todos los elementos físico-químicos que conforman el ambiente interactúan entre sí y con los seres vivos que viven en él.
- **Autorregulación.** Los sistemas que albergan la vida son capaces de autorregularse y resistir los cambios externos, para permanecer en estado de equilibrio dinámico.
- **Alteración.** Cuando las actividades del ser humano sobrepasan la capacidad del planeta o un ecosistema para resistir los cambios externos, se provocan alteraciones o desequilibrios de diferente magnitud, que pueden ir desde el daño parcial y temporal a la destrucción total.
- **Preservación.** Una aspiración creciente de la humanidad es lograr el bienestar mundial a largo plazo mediante el desarrollo económico, el desarrollo social y la preservación del medio ambiente.

ESTRUCTURA DEL LIBRO

Proyecto Intégrate

El aprendizaje de manera colaborativa se aborda a través del Proyecto Intégrate, el cuál se desarrolla en tres etapas a lo largo de cada Bloque, donde se ponen a prueba los conocimientos, habilidades y actitudes que vas adquiriendo a lo largo de los temas.

Durante el desarrollo de los temas y para complementar la información a través de las TIC, se incluyen Códigos QR.

Evaluación Diagnóstica

Una de las formas de recuperar los conocimientos previos necesarios para ir adquiriendo los nuevos es por medio de una Evaluación Diagnóstica, la cual encontrarás al inicio de cada bloque.

Portafolio de Evidencias

Una manera de validar tus aprendizajes esperados es por medio del Portafolio de Evidencias, el cual recopila los productos de aprendizaje en cada uno de los temas a lo largo del bloque.

Nueva Escuela Mexicana

Todos los textos de Editorial Delta Learning, contienen actividades de transversalidad apegadas a los Principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Las Actividades de Aprendizaje las podrás identificar por este ícono.

Actividad Socioemocional

El desarrollo de habilidades socioemocionales que encaminen a las y los jóvenes a generar ambientes escolares y de promoción del aprendizaje se incluye en los textos por medio de las Actividades Socioemocionales.

Actividades transversales: Dentro de los libros de texto encontrarás Actividades Transversales, las cuales contienen aprendizajes interdisciplinarios donde se vinculan los conocimientos de las otras asignaturas que cursas en el presente semestre.

PRINCIPIOS NEM

Fomento de la identidad con México

Responsabilidad ciudadana: honestidad

Nueva Escuela Mexicana

Transformación de la sociedad

Respeto de la dignidad humana

Interculturalidad

Cultura de paz

Respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente

El presente libro se encuentra alineado a estos principios que marca el rumbo de la educación en nuestro país, los podrás identificar con la palabra NEM, seguida del principio y una actividad que los incentive.

En la Editorial Delta Learning estamos a la vanguardia en los cambios en el Sistema Educativo de México y por lo tanto, todos nuestros ejemplares cuentan con el apego a los siete principios de la Nueva Escuela Mexicana.



UNIDAD 1

Ecología, sustentabilidad y desarrollo sustentable

Eje

Explica la estructura y organización de los componentes naturales del Planeta.

Componente

Ecosistemas y actividad humana.

Contenido central

Ecología, sustentabilidad y desarrollo sustentable

Contenido específico

- **¿Qué es ecología, sustentabilidad y desarrollo sustentable?**
- **¿Qué puedo hacer para conservar el ambiente y preservar los recursos naturales?**
- **¿Cuáles Objetivos del Desarrollo Sostenible puedo apoyar individualmente y cuáles requieren la participación institucional?**
- **Los tres ámbitos de la sustentabilidad (ecológico, económico y social)**
- **Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.**
- **La Declaración de Río**
- **La investigación experimental, por muestreo y el empleo de modelos matemáticos en ecología.**

Aprendizaje esperado

- **Diferencia entre sustentabilidad y desarrollo sustentable.**
- **Identifica organizaciones o instituciones a través de comunidad de indagación que pro-mueve la sustentabilidad y el desarrollo sustentable.**
- **Propone alternativas de solución a un problema ambiental de su entorno.**

Productos esperados

Texto individual sobre: ¿Qué puedo hacer para que mis hijos tengan un ambiente sano, alimentos y recursos naturales suficientes?

Presentación de la unidad

¿Alguna vez te has preguntado cuál es la razón de que se incluya la asignatura de **ecología** en los programas de estudio de los bachilleratos? ¿Crees que tenga algo que ver con el cambio climático? ¿Has escuchado hablar de la ecología como disciplina científica?

Para iniciar, vamos a contestar la siguiente pregunta con dos palabras:

¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas ecología?

Pueden usar una plataforma virtual para generar una nube de palabras (www.mentimeter.com) o la pizarra.

En la actualidad, en los diversos centros educativos de México se han incorporado los conceptos de *sustentabilidad* y *desarrollo sustentable* dentro de asignaturas englobadas en las ciencias naturales, principalmente biología y ecología, con el objetivo principal de desarrollar una "'Educación Ambiental para la Sustentabilidad', que ayude en la transformación de la sociedad para mejorar y acelerar el desarrollo integral de las sociedades" (Reyes y Castro, 2017; Rodríguez y Nieto, 2017).

El objetivo mencionado en el párrafo anterior puede verse muy ambicioso en un sentido sociocultural si tomamos en cuenta el contexto de desarrollo y el sistema económico que se tiene en la actualidad, además de la necesidad imperante de incluir parámetros ambientales dentro de los sistemas productivos mexicanos (Flores, 2010). Tal vez se complique entender lo anterior en estos momentos, por eso vamos a empezar con el establecimiento de preguntas que nos guíen en este largo camino hacia la ciencia experimental llamada **ecología** y su importancia en la **educación ambiental para la sustentabilidad**.

Sustentabilidad proviene de *sostenible*, que según la Real Academia Española se define como "mantener sin agotar los recursos".

Evaluación Diagnóstica

Contesta las siguientes preguntas para rescatar los conocimientos que tienes del tema:

1. ¿Qué es Ecología?

   a. Una rama
   b. Una ciencia
   c. Un movimiento
   d. El medio ambiente

2. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ecología?

   a. El cuidado del medio ambiente
   b. Las relaciones entre los seres vivos y de cada uno de ellos con su medio
   c. Proteger a las plantas y animales
   d. Mejorar las condiciones de la naturaleza

3. Es donde se expresan puntos de intersección de dos líneas nacidas perpendiculares desde los ejes x y y, referentes a valores escalados para cada eje:

   a. Gráfica
   b. Espacio cartesiano
   c. Zona de intersección
   d. Eje de las x

4. Se establece como un cambio completo de paradigma, asegurando que para proteger el medio ambiente se necesita de un cambio radical en los sistemas de producción y consumo actuales, lo que necesita cambios fuertes en los sistemas políticos y legales de los países.

   a. Ecología
   b. Ecologismo
   c. Ambientalismo
   d. Ecológico

5. Se encuentra relacionado a las políticas y leyes nacionales, dado de manera única en cierta estabilidad económica local, regional o nacional y en un nivel educativo generalizado adecuado. Este movimiento asegura que los grupos sociales pueden dirigir esfuerzos a temas medioambientales para mejorar su calidad de vida, ya que la estabilidad económica lo permite:

   a. Ecologismo
   b. Ecológico
   c. Ambientalismo
   d. Ecología

6. Según los argumentos dados durante la unidad, es sería una característica necesaria para que la Ecología se establezca como una ciencia:

   a. Capacidad de protección ambiental
   b. Capacidad de reforestación
   c. Capacidad de predicción de procesos ambientales
   d. Capacidad de gestión ambiental

7. Representa una herramienta de gran importancia para la explicación de las relaciones entre las especies y con su medio ambiente:

    a. Las leyes ambientales
    b. Los movimientos ambientalistas
    c. Los modelos matemáticos
    d. Los movimientos ecologistas

8. Se lo conoce como “la capacidad de satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”:

    a. Sustentable
    b. Desarrollo sustentable
    c. Desarrollo ecológico
    d. Cuidado de la ecología

9. Lee las siguientes situaciones y relaciona a qué tipo de investigación corresponde, observacional o experimental:

    a. El Doctor en Ciencias Ambientales estudia la dinámica poblacional de los jaguares de la reserva del Abra-Tanchipa, para ello coloca una serie de cámaras trampa que le ayudan a contabilizar los ejemplares existentes. Cada año contabiliza las crías que aparecen en las cámaras y a través de cadáveres encontrados calcula las tasas de supervivencia, mortalidad y natalidad de los ejemplares.
    b. El doctor en ciencias forestales se encuentra probando el efecto de los hongos micorrícicos en las interacciones planta-hongo, con el objetivo de conocer la tasa de desarrollo de las plantas con y sin interacciones. Para lograrlo sembró semillas en suelos inoculados con micorrizas y suelos limpios, y midió el porcentaje de germinación y la tasa de crecimiento de las plantas.

10. Explica que un organismo puede o no existir en un lugar o tiempo definido, según la disponibilidad de nutrientes y la necesidad mínima de consumo para la supervivencia de ese organismo:

    a. Ley de Shelford
    b. Ley de Liebig
    c. Teoría de islas
    d. Ley de tolerancia



Proyecto
Intégrate

Parte 1

En equipos de cuatro personas realicen el siguiente experimento para practicar este tipo de metodologías. Tomen el ejemplo de la luz y agreguen una variable más, inicien con la siguiente pregunta **"¿cómo afecta la luz y la cantidad de agua en el suelo a las plantas?"**. Con esta idea, establezcan un diseño experimental, el cual deberá contener un tratamiento control, es decir, repeticiones sin exposición a la variable de estudio, con el fin de que se pueda comparar el resultado. Una vez con esto, el diseño experimental podría ser:

Variable 1 (contaminante)	**Repeticiones** **NOTA: Recuerda que tienes que controlar todas las variables que puedan afectar a la variable de respuesta.**								
Condiciones normales. **CONTROL**	Planta 1	Planta 2	Planta 3	Planta 4	Planta 5	Planta 6	Planta 7	Planta 8	Planta 9
Con luz	Planta 10	Planta 11	Planta 12	Planta 13	Planta 14	Planta 15	Planta 16	Planta 17	Planta 18
Sin luz	Planta 19	Planta 20	Planta 21	Planta 22	Planta 23	Planta 24	Planta 25	Planta 26	Planta 27
Con riego	Planta 28	Planta 29	Planta 30	Planta 31	Planta 32	Planta 33	Planta 34	Planta 35	Planta 36
Sin riego	Planta 37	Planta 38	Planta 39	Planta 40	Planta 41	Planta 42	Planta 43	Planta 44	Planta 45

Tomando como ejemplo el Proyecto Intégrate de la página 13, organícense en equipos y realicen la selección de las variables y el diseño general del experimento en sus casas o en la escuela, según las necesidades y contextos propios.

Para desarrollar este proyecto de investigación, será mejor que lo dividamos en tres partes:

Primera parte. Selección de variables y el diseño del experimento (actividad de clase)

Así como el ejemplo mencionado sobre el efecto de la luz y el agua, hay muchas otras variables que puedes probar si así lo deseas, selecciona una variable y diseña tu experimento. Lo podemos basar

en la siguiente pregunta de investigación: **¿cómo afecta el desecho de productos químicos urbanos sobre la productividad agrícola del suelo?**

Recuerda que puedes cambiar el número de repeticiones y tratamientos según la variable que quieras probar, además puedes considerar diferentes concentraciones de la variable a probar (saturado, saturación media, saturación baja y sin contaminante).

Las concentraciones definidas para utilizar en cada tratamiento deben de presentarse según las medidas vistas en tu asignatura de física, sean gramos, litros, partes, proporciones, etc. Las concentraciones escogidas deberán ser equidistantes numéricamente hablando, según la magnitud de medición escogida.

Entrega en formato libre, un pequeño texto introductorio que explique los siguiente:

- Pregunta de investigación.
- Variable para probar (utilízala con **plántulas de frijol**, por ser de rápido crecimiento)
- Diseño experimental (realiza una tabla donde expreses el total de plantas y tratamientos que tendrás)



Segunda parte. Desarrollo del experimento (actividad de laboratorio y seguimiento)

Ahora, hay que poner manos a la obra y realizar el experimento, utilicen materiales reciclados, germinen las semillas frijol en estas diferentes condiciones según el diseño que hayan elegido y registren en una bitácora el crecimiento de cada planta durante el tiempo que definan (realiza un registro fotográfico, siempre es importante hacerlo). **Realicen la toma de datos y seguimiento del experimento por al menos 10 días hábiles.**

Utilicen contenedores pequeños controlando el tipo y forma del contenedor, del suelo en que siembran, el agua con que riegan, el número de agujeros en cada contenedor, la regla con la cual miden, la forma en que registran los resultados.

Entreguen un informe que incluya algunas partes de un reporte científico:

- Introducción
    - Planteamiento del problema.
    - Justificación.
    - Pregunta de investigación.
- Metodología en texto explicativo.
    - Materiales y Variable para probar (utilízala con plántulas de frijol, por ser de rápido crecimiento)
    - Diseño experimental (realiza una tabla donde expreses el total de plantas y tratamientos que tendrás)
- Registro fotográfico de tu experimento (bitácora, experimento, entre otras)

Tercera parte. Reporte de investigación (actividad de cierre)

Al terminar de tomar todos sus datos, necesitan vaciarlos a una hoja de Excel para poder analizarlos o pueden tratarlos de forma manual en su libreta. Con ayuda de Excel, podrán graficar los datos para que vean las diferencias y saquen conclusiones de sus resultados.

Con ayuda de los gráficos podrán obtener de forma automatizada el modelo lineal y los valores de la recta para poder ver tendencias, incluso predecir valores fuera de la recta.

Al finalizar el experimento, realicen su reporte de práctica junto con la evidencia fotográfica más relevante de su trabajo.

Características del reporte final de práctica:

- **Título**
- **Autores**
- **Resumen/Abstract**
- **Introducción:** Breve explicación de lo aprendido (con tus palabras, no copies información) sobre los diseños de muestreo y su forma de implementación.
- **Materiales y Métodos:** Materiales utilizados y una breve explicación de tu diseño experimental (Puedes hacer dibujos y diagramas para complementar tu diseño.)
- **Resultados:** Una o varias tablas donde se resuman tus resultados y gráficas que los muestren de forma explicativa. También debe de ir acompañado con un texto explicativo de los resultados y problemáticas abordadas durante el desarrollo del experimento.
- **Discusión y conclusión:** Breves sobre los resultados obtenidos y los objetivos cumplidos.
- **Bibliografía utilizada:** Si crees necesario utilizar bibliografía (revistas científicas o libros digitales), registra los datos bibliográficos.
- **Anexos fotográficos.** Nunca olviden tomar todos los datos y evidencias necesarias para probar sus resultados a cualquier persona que lo solicite, ya que de esto se trata el método científico

¿La Ecología es una ciencia experimental?

Las **ciencias** son disciplinas que se encuentran representadas por un **conjunto de conocimientos** obtenidos mediante la observación, experimentación y el razonamiento científico. Siendo este último un procedimiento sistemático de las ciencias para cumplir sus objetivos.

Primero hay que aclarar que Ecología es una ciencia que nace como rama de la biología y se especializa a tal punto que en la actualidad tiene su propio **objeto de estudio** y sus propias **metodologías** para el estudio de ese objetivo. A pesar de eso, la ecología ha sido desarrollada de forma errónea en casi todos los centros educativos por falta de personal con perfiles adecuados (Isaac-Márquez, et al., 2011), un problema que impera en casi todos los sistemas educativos del país. Sin embargo, desde hace ya tiempo se han analizado y establecido los **conceptos más importantes** que deberían de abordarse en la enseñanza de ecología (Aguilar-Correa, 2012; Fernández-Manzanal y Casal, 1995) para garantizar una adecuada comprensión de los procesos ambientales en los cuales el hombre se encuentra inmerso.

Los 20 conceptos más votados por ecólogos de la "British Ecological Society" para la enseñanza de la Ecología	
1. Ecosistema	2. Redes alimentarias (redes ecológicas)
3. Sucesión ecológica	4. Adaptación
5. Flujo de energía	6. Diversidad de ambientes
7. Conservación	8. Biodiversidad
9. Competencia (redes ecológicas)	10. Densidad de poblaciones
11. Nicho ecológico	12. Factores limitantes
13. Ciclos de elementos	14. Capacidad de carga (redes ecológicas)
15. Comunidad ecológica	16. Rendimiento sostenible
17. Estrategias de sobrevivencia (redes ecológicas)	18. Población ecológica
19. Fragilidad de los ecosistemas	20. Interacciones consumidor-presa (redes ecológicas)

Tomado de: Aguilar-Correa, 2012.

A pesar de tener clara la importancia de los conceptos anteriores, es común que, en los centros educativos de México, la principal percepción que se tienen sobre la **ecología** sea la de ser una ciencia

Corrientes ideológicas: en cuanto a las que se refiere este texto, son movimientos sociales o tendencias que comparten sentimientos o ideas. Normalmente las personas que tienen intereses en común se reúnen para ejercer su libertad de expresión para decir a los demás y dar a conocer su sentir.

encargada de cuidar el medio ambiente, basada y cimentada en una confusa educación ambientalista que se extiende a lo largo de muchos países de Latinoamérica, como sucede en México (Reyes Ruiz & Castro Rosales, 2017; Rodríguez Aboytes & Nieto Caraveo, 2017).

Es entonces necesario diferenciar, entender y clasificar adecuadamente las **corrientes ecologistas-ambientalistas** y las distintas ramas de la **"ciencia ecología"**, pues solo de esta manera podemos garantizar una educación ambiental que garantice el desarrollo de los tres ámbitos de aprendizaje de la asignatura, también llamadas **competencias disciplinares** (Turrubiate, et al., 2017):

1. **Exploración y comprensión del mundo natural y social**

   - Obtiene, registra y **sistematiza** información, consultando fuentes relevantes, y realiza los análisis e investigaciones pertinentes.
   - Comprende la interrelación de la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente en contextos históricos y sociales específicos.
   - Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las **hipótesis** necesarias para responderlas.

Glosario

Sistematizar: es realizar el ordenamiento adecuado y secuencial de distintos pasos de un proceso. Lo que quiere decir que se enumeran y definen el orden de los pasos.
Hipótesis: es una afirmación que se establece con base en supuestos, en respuesta a preguntas aún sin contestar. Las hipótesis pueden ser aceptadas o refutadas al final de las investigaciones.

Para curiosos

Los **pensamientos lógicos** se definen en relación con la disciplina filosófica que estudia y analiza los argumentos lógicos (la lógica), que intenta definir formas adecuadas de argumentar las ideas que contengan mayor contenido de verdad. El razonamiento lógico más conocido es el utilizado por Sherlock Holmes en las novelas de Sir Artur Conan Doyle, es decir, el **razonamiento deductivo**.

2. **Pensamiento crítico y solución de problemas**

   - Utiliza el pensamiento lógico y matemático, así como los métodos de las ciencias para analizar y cuestionar críticamente fenómenos diversos.
   - Desarrolla argumentos, evalúa objetivos, resuelve problemas, elabora y justifica conclusiones y desarrolla innovaciones. Asimismo, se adapta a entornos cambiantes.

3. **Cuidado del medio ambiente**

   - Comprende la importancia de la sustentabilidad y asume una actitud proactiva para encontrar soluciones sostenibles
   - Piensa globalmente y actúa localmente.
   - Valora el impacto social y ambiental de las innovaciones y avances científicos.

En un contexto científico, se pueden clasificar los **tipos de fuentes** según la distancia que existe entre el lector y la información original:



En este sentido, las fuentes relevantes son las primarias.

De esta manera se pretende lograr que todos los estudiantes de la Educación Media Superior (EMS) sean capaces de mejorar su comprensión acerca de las complejas interacciones entre los **elementos físicos**, **biológicos y socioeconómicos del medio ambiente**, y también poder entender sus procesos de cambio y evolución, con el fin de favorecer la formación de **valores**, **actitudes** y **comportamientos** que los lleven a mejorar las **condiciones de vida en sus comunidades**, protegiendo y mejorando el **ambiente** del que dependen para su desarrollo (Turrubiate, et al., 2017).



En este punto es necesario diferenciar los movimientos **ambientalista** y **ecologista**, los cuales tienden a ser representados en entornos político-sociales y sociales-culturales, respectivamente, con distintos enfoques según los temas regionales afrontados en cada país y las culturas locales (Luke, 2009).

El **movimiento ambientalista** se encuentra relacionado con las políticas y leyes nacionales, dado de manera única en cierta estabilidad económica local, regional o nacional y en un nivel educativo generalizado adecuado. Este movimiento asegura que los grupos sociales pueden dirigir esfuerzos a temas medioambientales para mejorar su calidad de vida, ya que la estabilidad económica lo permite. Por lo tanto, el ambientalismo asegura que se puede mejorar la calidad ambiental con el actual sistema de

producción y consumo, mediante el establecimiento de nuevas leyes o la mejoría de las leyes y normas ya existentes (Luke, 2009).

Tomado de: https://bit.ly/3HXbaCn

Por su parte, el **movimiento ecologista**, también llamado **ecologismo**, se establece como un cambio completo de **paradigma**, asegurando que para proteger el medio ambiente se necesita de un cambio radical en los actuales sistemas de producción y consumo, lo que requiere de cambios fuertes en los sistemas políticos y legales de los países (Luke, 2009).

Glosario

Paradigma: es una "teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en conocimiento" (RAE, 2022).

Tomado de: https://www.laizquierdadiario.com.ve/Comienza-la-huelga-por-el-clima-ecologistas-estudiantes-y-sindicatos-se-manifestaran-en-todo-el.

Finalmente, tenemos que reconocer que la Ecología es clasificada como una ciencia natural que pertenece a las ciencias experimentales y que se enfoca en el estudio de las interacciones entre especies y entre éstas con su medio ambiente. Este objetivo de estudio se alcanza utilizando el método científico y desarrollando investigaciones de tipos experimental y muestral, las cuales se logran utilizando una variedad de herramientas tecnológicas (medidores de temperatura y humedad, sistemas de información geográfica satelital, drones, microchips para registro de movilidad, cámaras trampa, entre otros), herramientas numéricas y probabilidad (regresiones lineales, índices probabilísticos, funciones lineales y curvilíneas); entre muchas otras herramientas de utilidad para la investigación científica.

Para curiosos

El **método científico** es normalmente mostrado como una serie de pasos a seguir para hacer investigación científica, aunque puede variar entre las diferentes disciplinas.

Ecología

Ciencia

Ambientalismo

Socio-político

Ecologismo

Socio-cultural

Actividad de aprendizaje 1

Ahora que sabemos diferenciar entre **Ecología**, **Ambientalismo** y **Ecologismo**, desarrollen, en pareja, una tabla comparativa y analicen junto con sus compañeros de grupo qué tipo de acciones han realizado a favor del medio ambiente y en qué tipo de corriente ideológica, política, cultural o científica podrían clasificarlas.

	Acción 1	Acción 2	Acción 3
Acción a favor del ambiente			
Corriente ideológica			
Acción a favor del ambiente			

Corriente ideológica			
Acción a favor del ambiente			
Corriente ideológica			

Ecología, el método científico y la capacidad de predicción

Este título se toma del libro de Rodríguez-Martínez (2013) por ser una de las recopilaciones en español más amplias y adecuadas para los interesados en entender mejor esta ciencia.

Retomando el argumento de Rodríguez-Martínez como base, "...la capacidad de predicción es una característica indispensable para la ecología si pretende ser una ciencia...", es claro que todas las sub-disciplinas de la ecología se apoyaran de las **matemáticas** y la **estadística** para poder explicar el mundo natural que se estudian, estrictamente "el estudio de las relaciones entre los individuos (especies) y la relación de los individuos con su medio ambiente" (Rodríguez Martínez et al., 2013).

Diagrama del objetivo de estudio de ecología



Para explicar las **relaciones interespecíficas** e **intraespecíficas**, así como las **respuestas al medio fisicoquímico**, se utilizan **modelos matemáticos**, que son la principal herramienta explicativa en la ecología.

Glosario

Modelos matemáticos: son explicaciones numéricas para procesos naturales, su función es similar a la de una maqueta que representa una posible construcción; expresan procesos numéricos que explican los procesos naturales.

Algunos modelos matemáticos de gran importancia en la comprensión de la dinámica de los ecosistemas son:

- **Crecimiento de poblaciones** (geométrico, lineal y exponencial, variables densodependientes),
- **Modelos de distribución espacial y temporal** (distribución al azar, binomial o polinomial),
- **Modelos de competencia entre especies** (modelo de Lotka-Volterra, modelo de Tilman, modelo de Nicholson-Bailey),
- **Modelos de colonización y extinción de especies** (la famosa teoría de islas de McArthur y Wilson),
- **Modelos de la estructura de la biodiversidad** (índices de diversidad, equidad y recambio de especies, lo que explica la diversidad alfa, beta y gamma),
- **Modelos de flujo de energía** (modelos de producción primaria, modelos de eficiencia energética en sentido biológico, tasas de producción de biomasa, entre otras),
- **Modelos de balance químico de los ciclos bio-geoquímicos** (gradientes redox, bomba de carbono, puntos de fusión, tensión superficial, difusión y solubilidad de oxígeno, etc.),
- **Modelos de balance energético del planeta** (patrones geostróficos de atmósfera y océano, radiación, temperatura y flujo de calor atmosférico y oceánico),
- Entre muchos otros modelos explicativos y predictivos (Dodds, 2009; Rodríguez Martínez, et al., 2013).

Para curiosos

Las **relaciones interespecíficas** se establecen entre dos o más especies distintas (ej. relación entre el gato y el ratón); por otra parte, las **relaciones intraespecíficas** se dan entre los individuos de una misma especie (relación entre hembras y machos, competencia de machos por hembras, entre otras).

Para curiosos

En un **espacio cartesiano** se expresan puntos donde se interceptan dos líneas nacidas perpendiculares desde los ejes *x* y *y*, referentes a valores escalados para cada eje.

Los tipos de variables y las tablas de datos en ecología.

Para introducir el uso del razonamiento matemático en ecología, primero tenemos que definir conceptos de interés para las herramientas matemáticas utilizadas, tanto el uso de conceptos de variables como el uso de tablas de datos es de gran importancia. **Las variables numéricas** se presentan en magnitudes que se miden u obtienen de la observación, **las variables cuantitativas** se distribuyen dentro de un rango de datos probables (población de datos) que se tienen que seleccionar previamente a un estudio (Arias-Gómez et al., 2016) y estos conjuntos de datos se pueden clasificar en **variables cuantitativas continuas** y **variables cuantitativas discretas**, según su origen y naturaleza.

Lo anterior quiere decir que, si midiéramos los grados Brix del néctar de flores, tendríamos valores porcentuales de 0 al 100, con **valores que pueden tomar números decimales** (números

continuos → 0.1, 0.2, 0.3,...,1.2,..., hasta "n"). Si los valores los tomáramos de diez flores de dos especies diferentes, cada grupo de valores obtenido por cada especie representaría a una población de datos posibles. Por lo que el conjunto de valores de grados brix de las 10 flores de la misma especie son los datos de una población (un conjunto de datos).

Rango posible de datos → 0 al 100.
 # de Poblaciones de datos → 2 especies de flores.

Ahora, entendemos que cada rango de valores en grados Brix representa una variable en una escala cuantitativa continua, mientras que cada especie de flor representa una variable en una escala cualitativa (número de especies de flores posibles a evaluar) ligada a cierta cantidad de valores cuantitativos (grados Brix). En este sentido tenemos dos poblaciones de datos diferentes pero comparables en un sentido ecológico, pues los grados Brix se usan para medir la cantidad de azúcar en el néctar de las flores, lo que nos proporciona una medida directa sobre el sabor de cada néctar.

Los diferentes valores de grados Brix de cada población representa la variación natural de la variable, por lo que cada población mostrará una distribución de valores dentro del rango probable.

Flor 1 → 10 valores entre 0 y 100
Flor 2 → 10 valores entre 0 y 100

Finalmente, cada conjunto de valores se podrá representar como puntos en una métrica numérica para comparar ambos conjuntos de datos. Lo que mostraría una tabla (tipo corta) de datos parecida a la siguiente:

Flor 1	Flor 2
32.5	38.9
36.2	43.3
34.7	48.3
31.6	43.2
39.1	45.4
35.9	46.7
35.2	41.8
37.8	39.7
36.3	42.3
36.4	42.7

Este tipo de tablas se conocen como tablas cortas, las cuales tienen una cabecera para cada conjunto de datos. En este caso, a pesar de estar situadas una al lado de la otra no necesariamente refleja valores relacionados, por lo que cada valor de cada columna es un valor independiente de los valores de la otra columna.

O una tabla tipo larga, como el siguiente formato:

Sp. De flor	Grados Brix
Flor 1	32.5
Flor 1	36.2

Flor 1	34.7
Flor 1	31.6
Flor 1	39.1
Flor 1	35.9
Flor 1	35.2
Flor 1	37.8
Flor 1	36.3
Flor 1	36.4
Flor 2	38.9
Flor 2	43.3
Flor 2	48.3
Flor 2	43.2
Flor 2	45.4
Flor 2	46.7
Flor 2	41.8
Flor 2	39.7
Flor 2	42.3
Flor 2	42.7

Tablas largas

Los mismos datos presentados en la tabla anterior, se expresan todos los valores de respuesta en una misma columna. En este caso solo existe una columna para los valores dependientes y al menos una para los datos independientes o variables descriptoras (sean cualitativas o cuantitativas) de los datos.

Estos datos se pueden distribuir en un espacio cartesiano para graficar y observar su comportamiento, además de permitirnos visualizar similitudes o diferencias en la estructura numérica de cada población de datos. Existen algunas referencias numéricas comunes dentro de estas poblaciones de datos que sirven para el desarrollo de gráficas, como lo son los cuartiles, deciles y percentiles. Cuando se calculan los cuartiles (límite inferior y superior, Q1, Q2 y Q3) y se utilizan para graficar en conjunto con las medidas de tendencia central, se obtienen gráficas (gráfica de caja y pivote) ampliamente explicativas que pueden ayudar en la interpretación de fenómenos naturales.



Otra forma de definir variables cualitativas es la delimitación por bloques de variables numéricas, dentro de una relación de variables cuantitativas continuas. Esto se aplica claramente en la clasificación de los biomas, en donde las relaciones entre temperatura y humedad genera una expresión específica de comunidades biológicas y ecosistemas homogéneos en estructura de la biodiversidad.



Ilustración 1. Relación temperatura y lluvia media anual con los diferentes biomas del planeta (tomado de Matthiopoulos, 2011).

Los conjuntos de datos de las poblaciones (valores observables en un ecosistema) normalmente se muestran en patrones espaciotemporales, lo que representa un universo enorme de posibilidades de abstracción numérica. Sin embargo, las generalidades y repeticiones en los patrones numéricos permiten el ajuste a modelos que ayudan en la predicción de eventos en situaciones específicas.

Un ejemplo de modelaje muy sencillo lo podemos tomar de la forma en que se reproducen las bacterias (fisión binaria), puesto que cada célula da origen a dos células hijas. Entonces podemos razonar que las bacterias tienen un crecimiento en un modelo que se ajusta a $f(x) = x * 2$, lo que se desarrolla en una tabla y gráfica como las que se muestran en seguida:

x	y
1	2
2	4
4	8
8	16
16	32
32	64
64	128



Ejemplo 1.

Tomamos como modelo de análisis a las poblaciones introducidas de cucarachas rojas, también llamadas cucarachas americanas (*Periplaneta americana*), que realmente son originarias del África tropical, de las cuales se puede percibir un cambio de actividad muy evidente en respuesta a la temperatura ambiental (cuando es baja, las cucarachas reducen su actividad dentro de las casas). En este sentido, vamos a construir un modelo general basado en la experiencia que se tiene con la observación de sus abundancias, tomando en cuenta que con el calor aumentan su actividad y abundancia dentro y fuera de las casas (considerando como referencia la región

costera del Golfo (Tamaulipas, Veracruz, la zona baja de San Luis Potosí y Tabasco), donde el clima es principalmente cálido-húmedo, con moderados ingresos de frentes fríos en invierno).

Si tomamos este conocimiento general y lo graficamos en un **espacio cartesiano** donde en el eje de las *x* se represente un rango de temperaturas **medias** mensuales de 0 a 50 °C y en el eje de las *y* un rango de abundancia de 0 a 50 cucarachas observadas por casa/día, obtendríamos una matriz hipotética de datos como esta:

Glosario

La **media** o promedio es una medida de tendencia central que se calcula con la fórmula

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{N}.$$

Etiqueta de muestra (i)	Temperatura °C (x)	No. de cucarachas (y)	x * y	y^2	x^2	y calculada
Conteo (enero) = 1	12	1	12	1	144	0.651341
Conteo (febrero) = 2	11	1	11	1	121	0.00383142
Conteo (marzo) = 3	18	3	54	9	324	4.53639847
Conteo (abril) = 4	24	8	192	64	576	8.42145594
Conteo (mayo) = 5	23	7	161	49	529	7.77394636
Conteo (junio) = 6	28	12	336	144	784	11.0114943
Conteo (julio) = 7	32	14	448	196	1 024	13.6015326
Sumatorias	$\sum$ =148	$\sum$ =46	$\sum$ = 1 214	$\sum$ =464	$\sum$ = 3 502	—
Promedios	$\bar{x}$ = 21.1428571	$\bar{y}$ = 6.57142857	***n* = 7**			
	$f(x) = b = \frac{1214 - (7 * 21.1428571 * 6.57142857)}{3502 - (7 * 21.1428571^2)}$					

La temperatura y el número de cucarachas representan las variables *x* y *y*, las cuales pueden ajustarse a un modelo lineal (regresión lineal) utilizando fórmulas de cálculo diferencial, a saber:

1. $b = \frac{\sum_t^n = 1(x_i * y_i) - (n * \bar{x} * \bar{y})}{\sum_t^n = 1(x^2) - (n * \bar{x}^2)}$

Entonces:

$$b = \frac{1214 - (7 * 21.1428571 * 6.57142857)}{3502 - (7 * 21.1428571^2)}$$

$$b = \frac{1214 - 972.571}{3502 - 3129.14} = \frac{241.42857}{372.85714} = 0.6475096$$

2. $a = \bar{y} - (b * \bar{x})$

$$a = 6.57142857 - (0.6475096 * 21.1428571) = -7.118774$$

$f(x) = \hat{y} = (b * x_1) + a \rightarrow$ Ecuación de la recta

$$\hat{y}_1 = (0.6475096 * 12) + (-7.118774) = 0.651341$$
$$\hat{y}_2 = (0.6475096 * 11) + (-7.118774) = 0.0038314$$
$$\hat{y}_3 = (0.6475096 * 18) + (-7.118774) = 4.5363985$$
$$\hat{y}_4 = (0.6475096 * 24) + (-7.118774 = 8.4214559$$
$$\hat{y}_5 = (0.6475096 * 23) + (-7.118774) = 7.7739464$$
$$\hat{y}_6 = (0.6475096 * 28) + (-7.118774) = 11.011494$$
$$\hat{y}_7 = (0.6475096 * 32) + (-7.118774) = 13.601533$$

Donde:

$\sum_{i=1}^{n} x_i$ expresa la suma de todos los valores de **x**, siendo que **i** define la etiqueta para cada valor de **x**. En este sentido si **i = 1** se refiere al primer valor de **x**, si **i = 2** refiere al segundo valor de **x**,
$\bar{x}$ es el promedio de x
$\bar{y}$ es el promedio de y
$\hat{y}$ es el valor calculado de y, para la línea central en conjunto con x_i
n es la cantidad de datos distintos (i)

Todos los valores obtenidos en el modelo se pueden graficar de la siguiente manera:

Gráfica de correlación positiva



A mayor temperatura, mayor número de cucarachas se observarán en los alrededores de las casas.

Los puntos naranjas son los valores reales (x_i, y_i), mientras que los puntos blancos son los valores con y calculada $(x_i, \hat{y}_i)$

Ejemplo 2.

Ahora bien, podemos cambiar la comparación de las variables (x, y) y ver la relación que tienen las abundancias de dos especies en lugar del ejemplo anterior, en el cual se relacionan la abundancia y la temperatura. Ahora imaginemos que los gatos en las casas son depredadores potenciales de las cucarachas, lo cual significaría que estas encantadoras mascotas podrían consumirlas cuando las vean. Con la lógica anterior podríamos esperar que, si incrementamos el número de gatos en la ciudad, disminuirá la cantidad de cucarachas visibles en la época de mayor temperatura. Esto también lo podemos graficar si tomamos en cuenta única y exclusivamente las abundancias de ambas especies, resultando en una tabla y una gráfica como se muestra a continuación:

Glosario

Una variable es una magnitud que puede tener un valor cualquiera de los comprendidos en un conjunto o rango probable. Por ejemplo, los valores de temperatura en el centro ciudad definida se van a mantener con mayor probabilidad dentro del mínimo (temperatura más baja registrada) y máximo (temperatura más alta registrada) histórico, aunque cada medición realizada durante el tiempo va a mostrar un valor distinto dentro de este rango.

Etiqueta de Muestra (i)	Gatos °C (x)	Cucarachas (y)	x * y	y^2	x^2	Y Calculada
1	4	4	16	16	16	4.73529412
2	3	7	21	49	9	6.38235294
3	4	5	20	25	16	4.73529412
4	2	8	16	64	4	8.02941176
5	2	9	18	81	4	8.02941176
6	3	6	18	36	9	6.38235294
7	1	10	10	100	1	9.67647059
8	1	8	8	64	1	9.67647059
9	1	9	9	81	1	9.67647059

10	1	11	11	121	1	9.67647059
Sumatorias	22	77	147	637	62	—
Promedios	2.2	7.7	n = 10			
	$f(x)=b=\frac{147-(10*2.2*7.7)}{62-(10*2.2^2)}$					

Entonces:

$$f(x)=b=\frac{147-(10*2.2*7.7)}{62-(10*2.2^2)}=\frac{147-169.4}{62-48.4}=\frac{-22.4}{13.6}=-1.64705882$$

$$a=7.7-(-1.64705882*2.2)=11.3235294$$

$$\hat{y}_1=(-1.64705882*4)+(11.3235294)=4.735294118$$
$$\hat{y}_2=(-1.64705882*3)+(11.3235294)=6.382352941$$
$$\hat{y}_3=(-1.64705882*4)+(11.3235294)=4.735294118$$
$$\hat{y}_4=(-1.64705882*2)+(11.3235294)=8.029411765$$
$$\hat{y}_5=(-1.64705882*2)+(11.3235294)=8.029411765$$
$$\hat{y}_6=(-1.64705882*3)+(11.3235294)=6.382352941$$
$$\hat{y}_7=(-1.64705882*1)+(11.3235294)=9.676470588$$
$$\hat{y}_8=(-1.64705882*1)+(11.3235294)=9.676470588$$
$$\hat{y}_9=(-1.64705882*1)+(11.3235294)=9.676470588$$
$$\hat{y}_{10}=(-1.64705882*1)+(11.3235294)=9.676470588$$

Con esto puedo calcular el número de gatos necesarios para mantener controladas a las cucarachas en la casa, solo hay que despejar la fórmula de $\hat{y}_i=(b*x_i)+a$, o en su caso probar un valor de x que con la formula anterior se obtenga un valor cercano a 0, lo que refleja la intersección de x.

Por lo que

$$\hat{x}=\frac{\boldsymbol{y_i-a}}{\boldsymbol{b}}$$



Como se muestra en la imagen, conocer los interceptos nos permite conocer los límites de la relación de las variables reales. En el entendido que son aproximaciones numéricas que nos explican procesos ecológicos reales que son variantes.

Finalmente podemos graficar los resultados de la siguiente manera:

Gráfica de correlación negativa



A mayor número de gatos, menor número de cucarachas se observarán en los alrededores de las casas.

Los puntos azules son los valores reales (x_i y y_i), mientras que los puntos rojos son los valores con y calculada (x_i y $\hat{y}_i$).

Los patrones que se pueden observar al relacionar dos o más variables pueden ser lineales o curvilíneas, igual que las distintas funciones que se pueden graficar en tu curso de cálculo diferencial, lo cual lleva interpretaciones de los fenómenos naturales en constantes numéricas, que pueden ser lineales [$f(x) = b * x + a$] o curvilíneas como logarítmicas [$f(x) = b * ln.x + a$] y exponenciales [$f(x) = a * e^{b*x}$].

Los patrones de relación pueden ser lineales o curvilíneos, igual que las distintas funciones que se pueden graficar en tu curso de cálculo diferencial (interpretaciones del cambio en constantes, lineales, cuadráticas, cúbicas, polinomiales, racionales e irracionales). De hecho, muchas de estas funciones son la base de los modelos matemáticos en Ecología, con un poco de estadística y bastante análisis interpretativo de los datos.

Para curiosos

La **correlación positiva** o negativa se vincula a un cálculo matemático que arroja un valor entre –1 y 1, como el coeficiente de correlación de Pearson o el de Spearman.

Por su parte, los modelos suelen aplicarse en la explicación de dos variables, una de las cuales es **dependiente** (también llamada variable de respuesta) de la otra. La dependencia se refiere a que el valor de una de las variables cambia en la medida que cambia la otra variable, llamada **independiente**. En este sentido, podemos tomar el ejemplo de las cucarachas y la temperatura, donde esta última es la variable independiente, ya que las cucarachas no la afectan a la temperatura, pero esta sí las afecta, y son la variable dependiente (también llamada variable de respuesta).

Estas comparaciones pueden tener dos sentidos: positivo o negativo. Entonces, cuando al aumentar una variable la otra disminuye, se le llama **correlación negativa**. Siguiendo con la misma lógica, si cuando se incrementa la magnitud de una variable la otra también lo hace, se le llama **correlación positiva**.



Con lo anterior, existe un ajuste matemático llamado correlación de Pearson, la cual intenta evidenciar la magnitud de la relación o asociación basada en una escala que va de −1 hasta +1. La cual permite conocer, además, el valor de ajuste del modelo si se eleva al cuadrado, basado en los valores residuales (la distancia entre el modelo y los valores reales). El coeficiente de Pearson, desarrollado por Karl Pearson en 1895 con base en los trabajos de Galton, es muy utilizado en diversos campos de la investigación dentro de los cuales también se encuentra la ecología (Lalinde et al., 2018).

El modelo de correlación se expresa con:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i * y_i) - (n * \bar{x} * \bar{y})}{\sqrt{\left[\left(\Sigma x_i^2 - (n * \bar{x}^2)\right) * \left(\Sigma y_i^2 - (n * \bar{y}^2)\right)\right]}}$$

Para curiosos

Las **escalas espaciales** en Ecología se ordenan en sentido contrario a las escalas cartográficas en los mapas. Entonces, se habla de escala pequeña cuando el área espacial de estudio es pequeña; mientras que, en cartografía, ampliar la escala significa menos metros representados por centímetro lineal en una hoja.

Esto es solo una pequeña muestra de la amplitud temática que ha llegado a tener la Ecología en la actualidad, lo que ha llevado al reconocimiento de múltiples subdisciplinas (ramas) que, entre lo más general, se definieron inicialmente por la **escala espacial** que estudiaban (puntual, local, regional, continental, global); aunque en los últimos años han sido nombradas un sin fin de ramas híbridas que han complicado mucho encontrar los límites de esta ciencia. Es difícil saber cuáles de todas estas ramas han sido o serán aceptadas "*sensu stricto*" (en sentido estricto) como parte de la ciencia Ecología (o sea, por la comunidad científica), pero podemos generalizar las ramas que comúnmente son enlistadas por algunos estudios de esta ciencia (Dodds, 2009; Egerton, 2019; Rodríguez, et al., 2013; Smith y Smith, 2007; Wikipedia, 2021):

Glosario

Sensu stricto: estricto, ajustado enteramente a la necesidad o a la ley y que no admite interpretación.

Actividad de aprendizaje 2

En un río existe la liberación de un contaminante que afecta directamente sobre la supervivencia de especies de peces de agua dulce. Las especies del río se ven afectadas en diferentes partes del río según la cantidad vertida del contaminante y la distancia existente a las fuentes del contaminante. De esta manera se realiza un muestreo en diferentes partes del río para conocer cuantas especies pueden sobrevivir a las diferentes concentraciones del contaminante, de la cual se obtiene la siguiente información.

# de Muestra	Concentración del contaminante (%) (x)	Número de especies encontradas en esa parte del río. (y)
1	4.1	2
2	3.2	5
3	4	3
4	2.1	13
5	2	12

La pregunta que se tiene sobre esta relación de variables es **¿A qué concentración del contaminante no habrá especies?** R.- A una concentración de 4.4689 del contaminante ya no habrá especies de peces.

Id	x	Y	x*y	x2	Y calculada
1	4.1	2	8.2	16.81	1.859483615
2	3.2	5	16.0	10.24	6.395233366
3	4	3	12.0	16	2.363455809
4	2.1	13	27.3	4.41	11.93892751

5	2	12	24.0	4	12.4428997
N=5	Media = 3.08	Media = 7	SUMA= 87.5	SUMA= 51.46	—
¿Cuál es el valor de x para que y sea igual a 0?	4.46896551724137	0			

Recuerda que, para contestar la pregunta anterior se tiene que calcular el valor de "x" que, con base en la pendiente del modelo lineal, el valor de "y" es igual a 0. Por lo que solo tiene que encontrar el valor de intersección en *x*, basado en la formula $\hat{x} = \frac{y_i - a}{b}$ anteriormente mostrada.

Ramas de la Ecología

Lo abordado anteriormente es sólo una pequeña muestra de la amplitud temática que ha llegado a tener la ecología en la actualidad, lo que ha llevado al reconocimiento de múltiples subdisciplinas (ramas) que, entre lo más general, se definieron inicialmente por la **escala espacial**[1] que estudiaban (puntual, local, regional, continental, global), aunque en los últimos años han sido nombradas un sin fin de ramas híbridas que han complicado mucho encontrar los límites de esta ciencia. Es difícil saber cuáles de todas estas ramas han sido o serán aceptadas "*sensu stricto*" (en sentido estricto) como parte de la ciencia ecología (o sea, por la comunidad científica), pero podemos generalizar las ramas que comúnmente son en listadas por algunos estudios de esta ciencia (Dodds, 2009; Egerton, 2019; Rodríguez Martínez et al., 2013; Smith & Smith, 2007; Wikipedia, 2021)

Recurso digital

Escanea el siguiente código para revisar las publicaciones de Frank Egerton's History of Ecological Sciences, sobre algunas de las ramas de la Ecología.

Ramas de la ecología con base en la relación de escala espacial y estructura biológica

- Ecología global o ecología de la biosfera (ecología a nivel planetario)
- Biogeografía (ecología a nivel de ecosistemas regionales)
- Ecología del paisaje (ecología a nivel de ecosistemas locales)
- Ecología de ecosistemas (estudia los procesos naturales de los ecosistemas)
- Ecología de comunidades (estudia los procesos naturales de las comunidades)
- Ecología de poblaciones (estudia los procesos naturales de las poblaciones)

Ramas de la ecología definidas por una variable de estudio fija

- Ecología urbana (centros urbanos como variable central)

1 Las escalas espaciales en ecología se ordenan en sentido contrario a las escalas cartográficas en los mapas. Entonces en ecología se habla de escala pequeña cuando el área espacial de estudio e

- Ecología de la conservación (estado de conservación como variable central)
- Ecología evolutiva (los distintos procesos evolutivos como variable explicativa)
- Ecología microbiana (microorganismos como variable biológica central)
- Ecología del suelo (el suelo como variable central)

Ramas de la ecología definidas por la fusión con otras disciplinas

- Ecología cuantitativa (desarrollo y aplicación de modelos matemáticos)
- Ecología política (estudio de las leyes y estrategias políticas que inciden en la protección, conservación o restauración de los procesos ecológicos, desde las bases científicas más relevantes)
- Ecología social (estudio de los procesos sociales encaminados al desarrollo sustentable)
- Ecología química (estudio de las bases químicas que explican los procesos ecológicos)
- Ecología cultural (estudio de los procesos culturales relacionados con procesos ecológicos)

Para curiosos

Desde el inicio de la era industrial, las actividades humanas se han desarrollado y distribuido por casi todo el mundo sin límites, hasta la aparición de las Áreas Naturales Protegidas o Parques Naturales.

Muchas de estas ramas se han desprendido por la inmensidad de **temas**, **métodos**, **técnicas** y **tecnologías utilizadas** (basadas en el método científico), que se han llegado a presentar durante las vastas investigaciones realizadas a la fecha en nombre de la ciencia **"Ecología"**; muchas han sido replicadas innumerables veces y posteriormente aceptadas por la comunidad científica junto al establecimiento de metodologías propias de la inicialmente llamada rama de la Biología; de esta manera, la Ecología pasó de rama a ciencia formalmente establecida (Cheshmehsohrabi, 2019). Es importante resaltar que las **metodologías científicas** siguen siendo el motor central de las investigaciones de la Ecología, la cual sigue intentando ser predictiva por medio de los científicos que la respaldan y la siguen desarrollando.

Recurso digital

Escanea el siguiente código para conocer los Parques Nacionales de nuestro país.

En este punto, muchas de las investigaciones realizadas han notado un **factor** o **variable** muy relevante durante los trabajos de recolección de datos (experimentos o muestreos) que era imprescindible en muchos de estos estudios: la **actividad humana.** Puesto que gran cantidad de nuestras actividades generan cambios muy significativos, fue necesario entender los procesos ecológicos desde una perspectiva más realista, donde se pudo observar cómo las actividades humanas generaban fuertes cambios funcionales y estructurales en los ecosistemas (Vergara, et al., 2009).

Un ejemplo frecuente es la contaminación de los ríos por desechos tóxicos, donde podemos realizar estudios de correlación entre contaminante y biodiversidad. Se pueden hacer predicciones adecuadas para las concentraciones de elementos tóxicos en ríos, poniendo énfasis en cuál es la cantidad disuelta del contaminante por litro de agua y la tasa de supervivencia de las especies en relación con la cantidad obtenida. Estos datos sirven para crear leyes en políticas públicas que establezcan niveles de tolerancia que permitan proponer acciones legales contra las empresas que desechan sustancias tóxicas a ríos y suelos.

El anterior ejemplo lo hipotetizamos en la siguientes tabla y gráfica, con un ajuste curvilíneo logarítmico donde se podría definir un límite de concentración del contaminante tóxico cuando los valores se relacionen a grandes pérdidas de especies, es decir, donde la concentración del contaminante muestre una mayor afectación.

Etiqueta de datos (i)	Contaminante (x)	Especies (y)	Etiqueta de datos (i)	Contaminante (x)	Especies (y)
1	4.1	2	10	0.9	23
2	3.2	6	11	0.8	21
3	4	1	12	0.6	39
4	2.1	13	13	2	14
5	2.3	12	14	2.1	11
6	2.2	10	15	0.5	48
7	1.3	12	16	0.9	30
8	1	31	17	1.3	17
9	0.7	25	18	1.7	16
$b=\frac{n^*\Sigma(\ln x^*y)-(\Sigma\ln x^*\Sigma y)}{n^*\Sigma(\ln x^2)-(\Sigma\ln x)^2}$		$a=\hat{y}+(b^*\overline{\ln x})$		$\hat{y}=a+(b^*\ln x)$	

Contaminante *vs.* especies



Actividad de aprendizaje 3

Se sabe que una empresa mexicana de textiles está descargando residuos directamente a un río que descarga su afluente a una represa de la región, donde se tienen actividades de pesca para alimentación regional. Para conocer los impactos del río sobre la presa se midió la concentración de los contaminantes a diferentes alturas del río y se contó el número de especies de artrópodos en cada sitio medido, para conocer el impacto sobre la biodiversidad. Construye un modelo con base logaritmo natural y calcula a qué concentración se afecta al 25% de la biodiversidad de artrópodos del río para definir como una medida de contaminación máxima permitida.

i	Concentración de contaminante (x)	No. de especies. (y)	$ln\ x_i$	$(ln\ x_i)^2$	$(ln\ x_i)*y$	x^2	$\hat{y}$
1	7.1	4	1.960095	3.841972	7.840379	50.41	
2	6.4	8	1.856298	3.445842	14.850384	40.96	
3	7.4	2	2.001480	4.005922	4.002960	54.76	
4	3.9	13	1.360977	1.852257	17.692695	15.21	
5	4.2	14	1.435085	2.059468	20.091183	17.64	
6	4.4	29	1.481605	2.195152	42.966532	19.36	
7	2.6	24	0.955511	0.913002	22.932275	6.76	
8	2.2	62	0.788457	0.621665	48.884356	4.84	
9	1.4	49	0.336472	0.113214	16.487140	1.96	
10	2.1	46	0.741937	0.550471	34.129118	4.41	
11	1.6	42	0.470004	0.220903	19.740152	2.56	
12	0.9	76	−0.105361	0.011101	−8.007399	0.81	
13	5.1	11	1.629241	2.654425	17.921646	26.01	
14	4.1	28	1.410987	1.990884	39.507635	16.81	
15	0.5	69	−0.693147	0.480453	−47.827155	0.25	
16	1.8	62	0.587787	0.345493	36.442773	3.24	
17	2.6	39	0.955511	0.913002	37.264946	6.76	
18	3.4	22	1.223775	1.497626	26.923059	11.56	
SUMATORIA							
MEDIA							
MEDIAS ^ 2							

$$b=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(\ln x_i * y_i\right)-\left(n*\overline{\ln x}*\overline{y}\right)}{\sum_{i=1}^{n}\left(\ln x_i^{\,2}\right)-\left(n*\overline{\ln x}^{\,2}\right)} \qquad a=\overline{y}-\left(b*\overline{\ln x}\right) \qquad f(x)=\hat{y}=a+\left(b*\ln x_i\right)$$

Cálculos. Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántas especies representan el 25 % si el total registrado fue de 53 especies de artrópodos?

   _____

   _____

2. ¿A qué concentración de los contaminantes se afecta al 25 % de las especies?

   _____

   _____

3. ¿A qué concentración se afectaría al total de las especies?

   _____

   _____

4. ¿De qué manera pueden ayudar este tipo de herramientas numéricas para la legislación ambiental?

   _____

   _____

5. Grafica los valores de de *x* con y con tinta azul, además de *x* con $\hat{y}$ con tinta roja.

   _____

   _____



Patrones en la biodiversidad

En otros tipos de estudios comparativos realizados por ecólogos de comunidades se han encontrado infinidad de patrones en la biodiversidad que se localiza en sitios modificados por actividades humanas en comparación con los ecosistemas similares más conservados o naturales. En general, se han percatado de que aumentan las abundancias(variables medibles) de las especies generalistas (que usualmente se convierten en plaga) y se reduce el número de especies (Macip-Ríos, et al., 2013; Rivas-Arancibia, et al., 2015), resultado de las relaciones ecológicas entre las diversas especies (algunas de ellas llamadas **especies clave**). Estos **patrones ambientales** que se repiten durante muchas investigaciones ayudan a los ecólogos a establecer **modelos predictivos** que nos dan una idea de lo que vamos a encontrar y si existen daños severos por las actividades humanas.

Los **patrones ambientales** se pueden percibir con tan solo **dos variables** (como el caso de las cucarachas y la temperatura), pero las relaciones pueden llevarse a estudios tan complejos en los que se incluyan decenas o cientos de variables (tanto ambientales como biológicas). Imagina que incluyeras tres variables en lugar de dos en el ejemplo de las cucarachas, donde las abundancias de estos insectos se relacionaran, además de con la temperatura, con la abundancia de gatos. Esto haría que la abundancia de la cucaracha estuviera manejada tanto por los gatos (por depredación) como por la temperatura (condiciones ambientales adecuadas). Finalmente, imagina la locura de incluir a un modelo explicativo **más de tres variables independientes**.

Aunque se creería que incluir muchas variables ayudaría a entender el sistema en su inmensa complejidad, se ha percatado que muchas variables dificultan la capacidad de reconocer el efecto de cada variable en la totalidad de la naturaleza, aunque existen herramientas numéricas que nos ayudan en estas tareas, llamada **inferencia multi-modelo** (Aho, et al., 2014). Por tal motivo, es de mucha ayuda segmentar los sistemas naturales en partes más manejables que nos permitan ir comprendiendo cada uno de los procesos involucrados y cómo van encajando en esa totalidad ambiental.

Por otra parte, podemos percibir patrones comunes en la estructura y funcionamiento de las comunidades con tan solo medir las abundancias de cada especie (Córdova-Tapia y Zambrano, 2015; Herrera, 2011), donde es posible percatarnos de los cambios de la biodiversidad en sitios con distinta intensidad de impactos humanos (también llamado disturbio antrópico, los cuales abordaremos en la tercera unidad). En este caso, los estudios dirigidos a conocer los efectos de los disturbios antropogénicos (humanos) han demostrado que, en general, se espera que las abundancias de cada especie presente en el ecosistema cambien de cierta manera cuando de pronto ocurra un evento que modifique las condiciones naturales. Estos factores de cambio se llaman **agentes de disturbio**.

Observa y analiza la siguiente tabla y las gráficas que se muestran después:

Sitio con actividades humanas (perturbados)		**Sitio con mayor grado de conservación (más naturales)**
	Con actividad humana	**Sin actividad humana**
Especie	**Abundancia**	**Abundancia**
sp1	79	35

sp2	9	22
sp3	5	12
sp4	4	9
sp5	2	6
sp6	0	5
sp7	0	4
sp8	0	3
sp9	1	2
sp10	0	2

Abundancias en medio modificado *vs.* medio natural



Menor diversidad de especies (una o dos especies generalistas)	Mayor diversidad de especies (abundancias mejor distribuidas)
Ejemplo de una gráfica de abundancia que se esperaría obtener en un sitio perturbado por actividades humanas.	Ejemplo de una gráfica de abundancia esperada en un sitio con un buen grado de conservación o con bajo grado de impacto humano.
En casos extremos, las especies con baja abundancia tienden a ser desplazadas hacia las áreas circundantes. En casos aún más extremos, esas especies se extinguen del área (puede ocurrir una extinción local o total).	En ambientes naturales que por sus principales características se encuentra el bajo número de especies, es más notable la extinción de especies, sea local o total, según el caso.

Este tipo de resultados ha llevado a los científicos internacionales a buscar estrategias que eviten la pérdida de la biodiversidad, pues esto ocurre en casi todos los tipos de ecosistemas, desde los acuáticos hasta los terrestres, esta situación es muy evidente cuando se analizan los cambios de cobertura vegetal a nivel nacional a través del tiempo (Challenger y Dirzo, 2009). Sumado a estos cambios,

investigaciones a escalas mayores (**ecología global**) han demostrado cambios ambientales más significativos que han generado alteraciones a nivel regional y global, que amenazan con la estabilidad de los distintos biomas del planeta (Khalid, et al., 2017; Latif, et al., 2019).

Actividad de aprendizaje 4

Escanea el siguiente QR para conocer más de las evidencias que existen sobre el calentamiento global por efecto de la concentración de CO_2 en el planeta:

Ahora contesta las preguntas:

1. La temperatura media de la Tierra se ha disparado en los últimos:

   a. 1 000 años b. 500 años c. 150 años d. 50 años

2. El incremento en la proporción de CO_2 en la atmósfera comenzó a ocurrir al mismo tiempo que los seres humanos iniciaron con la Revolución Industrial la quema de combustibles fósiles.

   a. Verdadero b. Falso

3. Si dos cosas cambian de la misma manera, ¿están relacionadas?

   a. Sí, siempre
   b. No siempre, hay que buscar más evidencias
   c. No, nunca

4. La variación de la temperatura media y la proporción de dióxido de carbono en la atmósfera a lo largo de miles de millones de años, han demostrado estar relacionados.

   a. Verdadero b. Falso

5. Este compuesto no tiene la capacidad físicoquímica de absorber la radiación infrarroja que emite la Tierra:

   a. Dióxido de carbono
   b. Metano
   c. Vapor de agua
   d. Nitrógeno

6. Nuestros océanos son capaces de reducir los efectos de las tormentas solares.

   a. Verdadero b. Falso

7. La actividad solar ha bajado los últimos 150 años, lo que ha mermado los efectos del calentamiento global.

   a. Verdadero b. Falso

8. Los distintos tipos de movimientos de la Tierra han causado un aumento de la proporción de CO_2 por encima de las 300 ppm, lo que los hace responsables del calentamiento global.

   a. Verdadero b. Falso

9. Es el isótopo de carbono más abundante en la atmósfera:

   a. Carbono 12 b. Carbono 13 c. Carbono 14 d. Carbono 15

10. Es el carbono que se encuentra con mayor abundancia en los seres vivos:

    a. Carbono 11 b. Carbono 12 c. Carbono 13 d. Carbono 14

11. Todas las evidencias demuestran que nuestras actividades industriales con la quema de combustibles fósiles son las culpables del incremento de CO_2 en la atmósfera.

    a. Verdadero b. Falso

Actividad de aprendizaje 5

Escanea el siguiente código para acceder al video y discute con tus compañeros el tema de las emisiones de CO_2 a nivel mundial. Posteriormente, escribe un análisis del tema.

Registro histórico del dióxido de carbono atmosférico e n el planeta (*Carbon dioxide pumphandle*).

2021 - CarbonTracker

La gráfica muestra en el eje de y la cantidad de CO_2 atmosférico en partes por millón (400 ppm es igual 0.04 %), a lo largo del video se muestra que en los registros históricos (incluyen registros por medios indirectos) nunca se había superado el 0.04 %.

Sustentabilidad y desarrollo sustentable como entorno de debate

Una de las problemáticas ambientales más importantes en la que se basa todo el diálogo sobre el desarrollo sustentable es el **cambio climático**, provocado por el calentamiento del planeta que al final es provocado por nuestras emisiones de CO_2. Sin embargo, el cambio climático es un proceso de tal complejidad que se encuentra manejado principalmente por las emisiones de distintos gases de efecto invernadero (GI), como lo vimos en la actividad anterior.

Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4), óxido nitroso (N_2O), Ozono (O_3) y Clorofluorocarbonos (CFCs) (Keating, 2007; Kweku et al., 2018; Pawar et al., 2016). Una de las respuestas o consecuencias a las emisiones de CO_2, por ejemplo, es la desoxigenación progresiva de la atmosfera terrestre. Este proceso es preocupante principalmente por nuestra dependencia al oxigeno molecular disuelto en el aire, que para nuestro caso necesita mantenerse por encima de cierto porcentaje para no morir asfixiados (Martin et al., 2017). El estudio de Martín y colaboradores (2017) muestran un excelente ejemplo de la utilidad de los modelos matemáticos para predecir eventos futuros, siempre que tengamos claros los supuestos que esto significa, ya que el modelo podría cumplirse ***si y solo si las variables que manejan el fenómeno natural se mantienen igual en el futuro***, tomando como base los datos de referencia con que se construye el modelo.



Imagen tomada de Martin y Livia (2017)

(a) Se muestra el cambio en la concentración de oxígeno, registrado desde 1990 hasta 2014 en la estación de Alerta, Canadá, con un ajuste de una curva parabólica (modelo curvilíneo).

(b) Proyección hacia el futuro del modelo curvilíneo, basado en la caída del oxígeno registrada, considerando una caída constante bajo las mismas condiciones fisicoquímicas. La línea roja señala el límite de concentración de oxígeno más bajo tolerado por los humanos. El margen gris muestra los límites del error probabilístico, hacia arriba y hacia abajo del modelo predictivo.

A pesar de que las emisiones de carbono a la atmosfera representan la problemática más conocida y de mayor importancia para nuestra supervivencia, existen una enorme lista de cambios climáticos provocados por otras actividades humanas. Tan solo la deforestación de áreas de bosques para el cultivo de alimentos afecta el clima a escala local, regional y global, **cambiando la forma en que se realiza el intercambio de gases atmosféricos y modificando los patrones espaciotemporales de lluvias a escala local (este tema lo retomaremos en la unidad 2 y 3).**

Estas son consecuencias de nuestras actividades y tienen que ser comprendidas para poder mitigar o reducir el grado de impacto ambiental negativo que significa mantener viva a la especie humana. Los primeros pasos dados que fueron reconocidos mundialmente sobre el tema del cambio climático a niveles político-social internacionales se realizaron con el informe titulado **"Nuestro futuro común"** en 1987, presentado por la **"Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo".** En dicho informe se define por primera vez el concepto de "desarrollo sustentable", además de permitir el desarrollo posterior de la llamada **"Cumbre mundial sobre el Desarrollo Sustentable"** que fue realizada en Río de Janeiro. Encabezadas todas las cumbres posteriores por la ONU, se reconocen las siguientes:



Sin embargo, existen otras reuniones y podemos encontrar todos los documentos de referencia a cada reunión en las páginas de las Naciones Unidas, donde todos podemos tener acceso a ellos.

Naciones Unidas | Conferencias | Medio ambiente y desarrollo sostenible

Desarrollo sostenible: 2020 y más allá

El año 2020 marcó el inicio de la Decenio de Acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Es un período crítico para promover una visión compartida de nuestro futuro y acelerar las respuestas a los principales desafíos que enfrenta el mundo, desde eliminar

la pobreza y el hambre hasta revertir el cambio climático. Sin embargo, en un corto plazo, el nuevo coronavirus ha creado una crisis internacional sin precedentes, cambiando el mundo tal como lo conocemos.

El Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020 presenta un panorama general de los progresos realizados para cumplir con los ODS antes de que comenzara la pandemia, pero también examina algunos de los devastadores efectos iniciales de la COVID-19 en objetivos y metas específicos. La precipitada propagación del coronavirus rápidamente convirtió una emergencia de salud pública en la peor crisis mundial de nuestras vidas. El informe fue preparado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en colaboración con más de 200 expertos de más de 40 organismos internacionales, utilizando los últimos datos y estimaciones disponibles.

Cinco años después de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Informe de 2020 señala que se han logrado avances en algunas áreas, como mejorar la salud materno infantil, ampliar el acceso a la electricidad y aumentar la representación de las mujeres en el gobierno. Sin embargo, incluso estos avances se vieron afectados en otros lugares por la creciente inseguridad alimentaria, el deterioro del medio ambiente natural y las desigualdades persistentes y generalizadas..."

Texto tomado directamente de la página de las Naciones Unidas, revisada el 27 de febrero de 2023.

Los tres ámbitos de la sustentabilidad

En este momento nace la necesidad de una Ecología enfocada en los efectos de las actividades humanas sobre los ecosistemas. Para ello, esta ciencia se ha visto en la necesidad de interactuar con ideologías y modelos de otras disciplinas como la economía y la sociología; pues es claro que, para desarrollar estrategias adecuadas para la conservación de los ecosistemas planetarios, se debe trabajar con las personas y su forma de vida. Es aquí donde nacen la **ecología de la conservación** y la **ecología de la sustentabilidad**, las cuales tienen como objetivo principal el estudio de los procesos ecosistémicos que están siendo afectados por las actividades humanas.

En muchos estudios del tema se ha resaltado la importancia de los distintos ámbitos de la sustentabilidad, los cuales forman parte de las sociedades humanas: **1) ámbito ecológico o ambiental**, el cual representa, entre lo más general, los procesos naturales que mantienen una estabilidad del ecosistema en donde se encuentra inmerso un grupo de personas (sociedad humana); **2) ámbito social**, el cual representa la estructura y dinámica socio-cultural del grupo de personas del cual se tiene referencia; y, **3) ámbito económico**, que representa el sistema productivo que permite al grupo de personas subsistir dentro del sistema económico local, regional o global.

Por este motivo, estos tres ámbitos son reconocidos como los pilares de la sustentabilidad y, a menudo, se representan con un diagrama de Venn, donde la intersección de los tres ámbitos representa el **desarrollo sustentable**. En este sentido, sí es probable que una o más comunidades tengan desarrollados e implementados solo dos de los tres ámbitos (intersecciones de los mismos), lo que las hace **equitativas**, **viables** o **soportables** (vivibles según la imagen).



MOMENTO STEAM

Investigación documental.

En parejas o equipos pequeños (4 personas) realicen los siguiente:

1. Una investigación sobre las reuniones internacionales (investiga si hay otras reuniones internacionales de interés) y los acuerdos que se realizaron en cada una de ellas, además revisar el número de países que participaron en ellas y que porcentaje del total de países representa. https://bit.ly/47DPghy
2. Con la información anterior realicen una línea del tiempo en su cuaderno en forma de serpientes y escaleras.
3. Posteriormente investiguen quién fue la persona que acuñó el concepto de Desarrollo sustentable y cómo se llama el documento donde lo plasmó.
4. Enseguida revisen cada uno de los objetivos para el desarrollo sustentable de la agenda 2030 (ODS) y clasifíquenlos según los pilares del desarrollo sustentable (ambiental, social y económico), utilicen un diagrama de Venn para hacer la clasificación.
5. Finalmente, investiguen qué se ha realizado en México, en su estado o municipio para cumplir con la agenda 2030.

Actividad en clase

Con los datos de la investigación anterior y siguiendo las indicaciones de su docente realicen lo siguiente:

1. Reúnanse 3 de los equipos de la investigación anterior (12 personas) para compartir los resultados de su investigación.
2. Con los porcentajes de participación realicen una gráfica de barras, conectadas con una línea al centro de cada barra.
3. Realicen un análisis sobre los avances en los acuerdos de las reuniones y en qué medida se han cumplido en México y en su localidad.
4. Realicen una lista de acciones con las que puedan ayudar.

Realiza aquí tu gráfica.

Objetivos del desarrollo sostenible.
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible

Acuerdos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Para curiosos

Escanea el siguiente código para conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la Asamblea General de la ONU.

Con toda la evidencia que existe acerca del cambio climático, los dirigentes de la ONU, en conjunto con representantes de los ámbitos científico y académico, establecieron acuerdos de índole político-administrativo para reducir los impactos ambientales generados por la humanidad. Estos acuerdos, incluidos en la agenda 2030 por la Asamblea General para el desarrollo sostenible, se establecieron para "poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí al 2030; combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos; a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas; a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales".

Gracias a muchas reuniones internacionales se ha logrado entender que el Desarrollo debería atender la idea de mantener los recursos naturales durante muchos años más, por siempre, de ser posible. Es aquí donde nace la importancia de la palabra **sostenibilidad** y el concepto de **desarrollo sustentable**. Una vez visto lo anterior, no hay forma de no darse una idea de lo que significan, pero, en general, hacen referencia a "la capacidad de satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas" (World Commission on Environment and Development, 1987).

Algunos de los datos más importantes que podemos rescatar del informe de los objetivos de Desarrollo sustentable 2020, enfatizando los correspondientes al medio ambiente son:

La continua acidificación de los océanos amenaza el medio marino y los servicios derivados del ecosistema

DELTA LEARNING

El océano es el mayor sumidero de carbono del planeta ya que absorbe alrededor del 23% de las emisiones anuales de CO2 generadas por la actividad humana y ayuda a mitigar los efectos del cambio climático.

Sin embargo, el CO_2 que absorbe ha hecho que el agua de mar se vuelva más ácida, lo que se evidencia en un descenso del 26% en los niveles de pH desde la época preindustrial. La acidificación de los océanos pone en riesgo los arrecifes de coral y otras especies clave que son la base de la cadena alimentaria marina y tiene efectos negativos en los servicios derivados de los ecosistemas marinos, como la pesca y la acuicultura, la protección de las costas, el transporte y el turismo. Cuanto más ácido se vuelve el océano, menor es su capacidad de absorber el CO_2 de la atmósfera y moderar el cambio climático. La información extraída de un nuevo portal de datos sobre la acidificación de los océanos muestra un aumento de la variabilidad del pH (de hasta 10% a 30% en los últimos cinco años) y de la acidez de los océanos. Para finales de este siglo, se prevé un aumento de la acidez del 100% al 150%, lo que afectará a la mitad de toda la vida marina.

Valores calculados del pH de la superficie del océano (mínimo, medio y máximo) para el período comprendido entre el 1° de enero de 2010 y el 8 de enero de 2020, a partir de mediciones mundiales



Tomado de: https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/-The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Spanish.pdf

Imagen y texto tomado del documento "informe de los objetivos de Desarrollo sustentable 2020"

La pregunta que hay que hacer ahora es: ¿vamos por buen camino? Aunque aún queda mucho por andar, según la revista GACETA UNAM, medio de divulgación en electrónico presentado por la UNAM el 9 de octubre de 2023, se explica que a la fecha sólo se ha avanzado en el 12 % de los objetivos y son los únicos que probablemente se cumplan a la fecha propuesta. Del resto de objetivos, alrededor del 30 % no presenta avance alguno a la fecha de esta publicación, por lo que se tienen muchas oportunidades para mejorar (Paz & Chávez, 2023).

Con lo que se sabe, es necesario que la población sea más participativa en temas ambientales y de gestión ambiental, debido las situaciones de sequías vividas en los últimos años.

Investigación experimental, investigación por muestreo y empleo de modelos matemáticos en Ecología

En las ramas de la Ecología se pueden aplicar diferentes metodologías de investigación, las cuales están estandarizadas a las condiciones y necesidades de cada estudio. Por tal motivo, es necesario describir, de manera general, la forma en que estas metodologías se clasifican, pues todas se estructuran bajo supuestos matemáticos que les permitan ser puestas a prueba una y otra vez.

Existen dos formas generales: aquellas metodologías que implican el **control extremo de variables** y en las que, por carecer de formas de control, es necesario diseñar un **muestreo de datos**. Se tiene que entender que el control de las variables es o no **factible según el objeto de estudio**, pues si queremos estudiar plántulas de frijol, basta con un pequeño invernadero para controlar las variables básicas, como agua, luz, aire, suelo, bacterias y hongos del suelo, entre otras variables posibles. Sin embargo, no es lo mismo si quieres estudiar los efectos que tienen los huracanes sobre las poblaciones de venado cola blanca en la Huasteca, pues es imposible controlar un huracán, por lo que tienes que buscar la forma de acoplarte a los eventos meteorológicos predichos con los registros históricos y realizar toda tu investigación esperando que las condiciones se den.

El anterior es un ejemplo algo extremo, aunque sí se han realizado este tipo de estudios en la isla de Cozumel, en el Caribe mexicano, con especies de aves (Gómez, et.al., 2022; Perdomo-Velázquez, et al., 2017). Entonces, hasta este punto tenemos los experimentos (**control de variables**) y los muestreos (**control del muestreo**). Sin embargo, existen investigaciones que se pueden clasificar en ambos tipos de muestreos, donde una parte de variables ambientales no se pueden controlar, pero otras sí, a estas metodologías las llamaremos **muestreos experimentales** (control de muestreo y de algunas variables).

Experimentos

En un experimento **puedes controlar las variables** y hacer repeticiones de todas las formas de exposición al objeto de estudio, el cual te permitirá medir una **variable de respuesta**. Por ejemplo: tomemos como referencia a las plántulas de frijol e imaginemos que queremos verificar la supuesta afirmación que las plantas ocupan la luz solar como fuente de energía. En este caso tenemos claro que hay una **variable de influencia** o **independiente** (la luz solar), cuyo efecto o influencia sobre el objeto de estudio nos interesa saber, pero debemos definir la **variable de respuesta** o **dependiente** (las plántulas de frijol). El efecto esperado es que el crecimiento o la germinación sean modificados por la presencia

o ausencia de luz. En este punto ya es posible hacer un experimento con dos formas opuestas de la variable que podrán ayudar a saber si las plantas necesitan de la luz para crecer, por lo que el diseño del experimento sería más o menos el siguiente:

Variable 1 (Luz)	***Repeticiones*** *NOTA: cada planta es un ejemplar diferente, por lo que cada uno podrá presentar una respuesta diferente, por este motivo es que se realizan las repeticiones, por el mismo motivo se controlan todas las variables que pueden afectar la respuesta de crecimiento, como la cantidad de agua, el tipo de suelo, la procedencia de las semillas, la especie de las semillas, la cantidad de luz que cada planta recibe al día, el tipo de agua con el que se riega, entre muchas otras más variables.*								
Con luz	Planta 1	Planta 2	Planta 3	Planta 4	Planta 5	Planta 6	Planta 7	Planta 8	Planta 9
Sin luz	Planta 10	Planta 11	Planta 12	Planta 13	Planta 14	Planta 15	Planta 16	Planta 17	Planta 18

En este caso solo se muestra **una sola variable de estudio** en dos estados o tratamientos (presente y ausente), con una sola variable de respuesta. Sin embargo, existen investigaciones con más de dos variables de estudio y más de dos variables de respuesta, lo que complica muchas veces la interpretación y los análisis de los datos. Las cantidades de datos necesarios que se tomarán pueden variar según la necesidad y objetivos de cada experimento, pues en el ejemplo anterior con dos variables y 18 repeticiones tendríamos que tomar dos tipos de datos: 1) el porcentaje de germinación y 2) la tasa de crecimiento diario o por período (según sea el caso).

Tendríamos una tabla de datos como la que se muestra a continuación:

Variables independientes		**Variables dependientes**								
Tratamiento	**Repetición**	**¿Germinó?**	**Medición de altura de las plántulas**							
			Día 1	**Día 2**	**Día 3**	**Día 4**	**Día 5**	**Día 6**	**Día 7**	**Día *n*...**
Con luz	Planta 1	Sí	—	—	—	0 cm	0.2 cm	0.5 cm	0.9 cm	—
Con luz	Planta 2	Sí	—	—	0 cm	0.1 cm	0.3 cm	0.9 cm	1.5 cm	—
Con luz	Plantas 3 a 9	...	—	—	—	—	—	—	—	—
Sin luz	Planta 10	No	—	---	—	—	—	—	—	—
Sin luz	Planta 11	Sí	—	---	—	—	—	0.1 cm	0.3 cm	—
Sin luz	Plantas 12 a 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Con estos datos se obtienen gráficas y valores que nos permiten describir los resultados del experimento. El objetivo de graficar es que tus resultados sean más claros y comprensibles al momento de compartirlos con los demás. La siguiente gráfica es un ejemplo de lo que se puede hacer, aunque puede ser tan compleja como sea necesario para los datos que se buscan obtener.



Un ejemplo más de graficación a partir de datos obtenidos en experimento:

Tabla N. Matriz hipotética de un experimento con dos tratamientos (plantas con luz y plantas sin luz) y cinco repeticiones por tratamiento. Los datos fueron inventados sobre lo que esperaríamos que pasará tomando en cuenta la afirmación de que "las plantas realizan fotosíntesis para producir su alimento", por lo que, si no hay luz, no hay alimento.

Tratamiento	Con luz	Con luz	Con luz	Con luz	Con luz
Repetición	Planta 1	Planta 2	Planta 3	Planta 4	Planta 5
¿Germinó?	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Día 1	0	0	0	0	0
Día 2	0	0	0	0	0
Día 3	0	0	0	0	0
Día 4	0	0.1	0.2	0.1	0
Día 5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.1
Día 6	0.5	0.9	0.7	0.6	0.4
Día 7	0.9	1.5	1	0.8	0.7
Día 8	1.2	1.9	1.3	1.1	1

Día 9	1.6	2.1	1.6	1.4	1.4
Día 10	2.1	2.4	1.9	1.6	1.8
Tratamiento	**Sin Luz**	**Sin Luz**	**Sin Luz**	**Sin Luz**	**Sin Luz**
Repetición	**Planta 6**	**Planta 7**	**Planta 8**	**Planta 9**	**Planta 10**
¿Germinó?	No	Sí	No	Sí	Sí
Día 1	0	0	0	0	0
Día 2	0	0	0	0	0
Día 3	0	0	0	0	0
Día 4	0	0	0	0	0.1
Día 5	0	0	0	0.1	0.2
Día 6	0	0.1	0	0.2	0.4
Día 7	0	0.3	0	0.5	0.6
Día 8	0	0.4	0	0.8	0.8
Día 9	0	0.4	0	1	0.8
Día 10	0	0.5	0	1	1

De los valores anteriores podemos calcular la media de los valores de crecimiento de cada planta, los cuales podrían obtenerse únicamente calculando el promedio de todos los datos, incluidos los días que registramos cero.

Para calcular los promedios puedes utilizar la siguiente formula: $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{N}$

Lo anterior nos daría la siguiente tabla:

Tratamiento	Repetición	¿Germinó?	Media de crecimiento
Con luz	Planta 1	Sí	0.65
Con luz	Planta 2	Sí	0.92
Con luz	Planta 3	Sí	0.72
Con luz	Planta 4	Sí	0.6
Con luz	Planta 5	Sí	0.54
Sin Luz	Planta 6	No	0
Sin Luz	Planta 7	Sí	0.17
Sin Luz	Planta 8	No	0
Sin Luz	Planta 9	Sí	0.36
Sin Luz	Planta 10	Sí	0.39

Con las cantidades podemos calcular los valores máximos, mínimos y cuartiles de cada tratamiento, con los cuales se pueden construir gráficas de caja que nos ayudan a visualizar que tan similares son los rangos de datos. Estas gráficas utilizan métodos estadísticos que se pueden emplear para comparar diferentes rangos de valores, para saber qué tan distintos son y qué tipo de distribución presenta ese conjunto de datos.



Actividad de aprendizaje 6

Actividad práctica

Tú puedes hacer un experimento bastante simple para que practiques estas metodologías. Vamos a seguir con el ejemplo de la luz y agreguemos una variable más, iniciando con la siguiente pregunta: "¿cómo afecta la luz y la cantidad de agua en el suelo a las plantas?". Con esta idea vas a establecer tu diseño experimental, el cual deberá contener un tratamiento control que hace referencia a repeticiones sin exposición a la variable de estudio, con el fin de que se pueda comparar el resultado. Con esto, podríamos ver cómo sería el diseño experimental:

Variable 1 (contaminante)	**Repeticiones** **NOTA: recuerda que tienes que controlar todas las variables que puedan afectar a la variable de respuesta.**								
Condiciones normales **CONTROL**	Planta 1	Planta 2	Planta 3	Planta 4	Planta 5	Planta 6	Planta 7	Planta 8	Planta 9
Con luz	Planta 10	Planta 11	Planta 12	Planta 13	Planta 14	Planta 15	Planta 16	Planta 17	Planta 18
Sin luz	Planta 19	Planta 20	Planta 21	Planta 22	Planta 23	Planta 24	Planta 25	Planta 26	Planta 27
Con riego	Planta 28	Planta 29	Planta 30	Planta 31	Planta 32	Planta 33	Planta 34	Planta 35	Planta 36
Sin riego	Planta 37	Planta 38	Planta 39	Planta 40	Planta 41	Planta 42	Planta 43	Planta 44	Planta 45

- Finalmente, hay que poner manos a la obra y realizar el experimento.
- Utiliza materiales reciclados para realizar este experimento.
- Germina semillas de frijol en estas diferentes condiciones según el diseño que hayas elegido y registra el crecimiento de cada planta durante el tiempo que tu definas (realiza un registro fotográfico, siempre es importante hacerlo).
- Al finalizar, grafica tus datos para que veas las diferencias y saques tus conclusiones.
- Una vez concluido, realiza el reporte de práctica en tu cuaderno e incluye evidencia fotográfica de tu trabajo.

Características de un reporte de práctica

- **Introducción:** breve explicación de lo aprendido (con tus palabras, no copies información) sobre los diseños de muestreo y su forma de implementación.
- **Materiales y métodos:** materiales utilizados y una breve explicación de tu diseño experimental (puedes hacer dibujos y diagramas para complementar tu diseño).
- **Resultados:** una o varias tablas donde se resuman tus resultados, así como gráficas que los proyecten. También deben ir acompañados por un texto que explicativo que incluya las problemáticas abordadas durante el desarrollo del experimento.
- **Conclusiones: son** enunciados breves sobre los resultados obtenidos y los objetivos cumplidos.
- **Bibliografía:** si crees necesario utilizar bibliografía (revistas científicas o libros digitales), registra los datos bibliográficos.
- ***Anexos fotográficos:** nunca olvides tomar todos los datos y evidencias necesarias para probar tus resultados a cualquier persona que lo solicite, ya que de esto se trata el método científico.

Muestreos

Por su parte, un **diseño de muestreo** se caracteriza por la **falta de control de las variables**, por lo que se enfocan en que el muestreo sea capaz de captar las variantes necesarias para dar respuesta a la pregunta de investigación.

El ejemplo de la contaminación de suelos se puede realizar como un **experimento de laboratorio** y como un **diseño de muestreo** si establecemos el contexto adecuado. Podemos probar la contaminación en un gradiente de concentración en suelo (volumen de contaminante sobre volumen de suelo), esto se puede representar en un experimento controlado o buscar sitios contaminados que cumplan con las características necesarias y tomar datos relevantes.

Para un muestreo hay que tomar muestras de suelo y analizarla para conocer el volumen de contaminante que encontramos por volumen de tierra colectado. En ambos casos podemos medir la tasa de germinación, abundancia vegetal o de cobertura del follaje, contabilizar el número de especies en cada sitio y saber la identidad de las especies que pueden subsistir en un sitio o en otro, según el grado de contaminación de los suelos. Un ejemplo de este tipo de estudios lo puedes ver en el trabajo realizado por García López y cols. (2006).

En muchas subdisciplinas de la ecología (ecología de poblaciones, ecología de comunidades, ecología de paisaje) es importante que los muestreos se diseñen correctamente para el adecuado análisis de

los datos. Los resultados pueden ser de utilidad para muchos fines, tales como otras investigaciones o gestión política del medio ambiente.

Actividad de aprendizaje 7

Observa los videos y contesta las preguntas.

Analizando patrones en la sabana africana | HHMI BioInteractive Video

"Este video exhibe el trabajo de Corina Tarnita, matemática y bióloga, quien utiliza métodos cuantitativos para comprender la función de los termiteros en el ecosistema de la sabana.

Los termiteros son puntos biológicos focales que concentran nutrientes y agua en los ecosistemas semiáridos de la sabana. Vistos desde arriba, los termiteros forman un patrón de puntos asombrosamente regular. Tarnita utiliza modelos matemáticos para explicar la regularidad de este patrón, cómo surge y cómo los termiteros mejoran la estabilidad del ecosistema.

La "Hoja de trabajo para el estudiante" permite a los estudiantes explorar los conceptos y la información presentados en el video." https://www.biointeractive.org/es

Después de ver el video y tomar tus apuntes, contesta los siguiente:

- ¿Qué tipo de investigación está realizando? Experimental o muestral, explica por qué.
- Anota 3 ejemplos de patrones presentes en la naturaleza.
- Los modelos de cambio climático predicen el estrés hídrico de algunos ecosistemas de sabana. Indica dos motivos por los que se deban realizar tareas de conservación para preservar las poblaciones de termitas.
- Si formaras parte del equipo de investigación del video, ¿qué nuevo interrogante científico te gustaría tratar de responder?

Diferenciación de Nichos y Coexistencia de las Especies | HHMI BioInteractive Video

El investigador Robert Pringle describe el moderno método de "metabarcoding" de ADN, usado para revelar cómo especies similares de animales comparten recursos.

https://bit.ly/46yreTG

Después de ver el video y tomar tus apuntes, contesta los siguiente:

- ¿Qué tipo de investigación está realizando? Experimental o muestral, explica por qué.
- ¿Cuántas repeticiones por especie establecieron en el proyecto?
- ¿Qué elementos de un ecosistema se estudiaron?
- ¿Cuál es la relación de las termitas con los antílopes del Gorongosa?

Steve Palumbi y Megan Morikawa estudian el daño a los arrecifes de coral en la Samoa Americana | HHMI BioInteractive Video

Este video describe el trabajo de los biólogos Steve Palumbi y Megan Morikawa, quienes utilizan experimentos de campo y de laboratorio para comprender los mecanismos que permiten a algunos corales resistir una mayor intensidad de estrés térmico que otros corales.

Steve Palumbi ha estudiado durante años los corales alrededor de la Isla Ofu, en la Samoa Americana. En Ofu, algunos corales viven en pozas de marea expuestas a temperaturas que normalmente provocan estrés térmico y que pueden conducir al blanqueamiento y la muerte del coral. Palumbi utiliza trasplantes y experimentos controlados de laboratorio para investigar cómo la adaptación y la aclimatación contribuyen a la resistencia de estos corales. Junto con la estudiante de postgrado Megan Morikawa, Palumbi evalúa si los corales resistentes al calor pueden ser trasplantados para ayudar a restaurar arrecifes que han sido dañados o destruidos.

https://www.biointeractive.org/es

Después de ver el video y tomar tus apuntes, contesta los siguiente:

- ¿Qué tipo de investigación está realizando? Experimental o muestral, explica por qué.
- Algunos corales en las pozas cálidas de los alrededores de la isla de Ofu pueden resistir temperaturas de entre 32° y 34°C sin blanquearse. Los investigadores hicieron un experimento controlado en el laboratorio para tratar de determinar por qué estos corales sobreviven a tal calor excesivo. Con respecto al diseño experimental, proporciona dos razones por las que el Dr. Palumbi creó una prueba estandarizada para los corales.

El Gran censo de elefantes | Video HHMI BioInteractive

Este video muestra el trabajo de los científicos que dirigen el primer censo de elefantes africanos de sabana realizado en más de 40 años y los métodos que utilizan para obtener números precisos y actualizados de todo el continente.

Los elefantes africanos están amenazados por la pérdida de su hábitat y la caza furtiva relacionada con el mercado de marfil. Algunos grupos de conservación estiman[2] que cada día se llegan a cazar hasta 100 elefantes, por lo que es muy importante determinar cuántos quedan y dónde se encuentran. Los científicos involucrados en el proyecto del Gran censo de elefantes (fundado y administrado por el filántropo Paul G. Allen) realizan estudios aéreos sobre millones de kilómetros cuadrados para obtener datos precisos del censo de elefantes. Este video describe el método de muestreo por transecto que utilizan y la manera en la que se cuentan los elefantes. ¿Qué tipo de investigación están realizando?

2 Una estimación es un cálculo numérico, que se realiza para predecir eventos del futuro o conocer poblaciones grandes, según las tendencias numéricas a partir de una muestra representativa.

Después de ver el video y tomar tus apuntes, contesta los siguiente:

1. ¿Qué complicaciones se presentan al contabilizar los transectos?
2. ¿Qué es un conteo total?
3. ¿Qué es un conteo por muestra?
4. ¿Cómo se estima el total de elefantes a partir de una muestra?
5. ¿Por qué los animales por fuera de la banda no se cuentan?
6. ¿Por qué se toma fotografía y se graba el conteo?
7. ¿Qué se hace con los resultados del censo y que importancia tienen los gestores y políticos?

Ley de tolerancia y el mínimo de Liebig (factores limitantes)

Todos los organismos se distribuyen a través del tiempo y el espacio en función de la interacción de las características biológicas y fisicoquímicas del medio. En este sentido, los organismos necesitan de características ideales de temperatura, humedad, luz, nutrientes, pH, CO_2, O_2, entre otras, las cuales serán clave para su distribución a través del tiempo y el espacio (limitando su capacidad productiva). Esto se conoce como **ley del factor limitante** o **del mínimo de Liebig**, y se refiere a la pérdida de productividad de biomasa de cada sistema biológico en cuestión.

Según la lógica de los muestreos y los experimentos, estos se pueden utilizar para conocer el comportamiento de la distribución de las especies a través del **espacio** y el **tiempo**. Este comportamiento se puede conocer mediante el análisis de datos tomados tanto en experimentos como en muestreos, por lo que podemos verlo como ejemplo en la concentración de contaminantes en suelo (mL de aceite/kg de suelo).

La ley del mínimo de Liebig afirma que hay un mínimo necesario en la cantidad de nutrientes que un organismo necesita tener disponible para seguir vivo y fue propuesto por Justus Liebig en 1840 (Erofeeva, 2021). Lo anterior puede ejemplificarse con la enfermedad de los piratas o también llamado escorbuto, una enfermedad ocasionada por niveles excesivamente bajos de vitamina C en el cuerpo, ocasionada por el bajo consumo de este nutriente.

Por su parte la **ley de tolerancia de Shelford** asegura que todas las especies soporta no solo un mínimo, sino que es capaz de soportar dentro de un rango de las variables físicas del medio ambiente (Erofeeva, 2021; Lynch & Gabriel, 1987). Esto también se puede ejemplificar en los rangos de temperatura que soportan algunas especies (Erofeeva, 2021; Fischer & Vasconcellos-Neto, 2003), ya que hay plantas que pueden soportar climas más fríos o climas más cálidos, como es el caso del café, las manzanas, las papas, el ajo, que son especies que necesitan de temperaturas bajas para poder sobrevivir y producir.

Los datos expresados en la ley de tolerancia suelen expresarse en modelos de distribución normal, también llamada de gauss o gaussiana. La cual se expresa con la función de distribución siguiente:

$$\Phi_{\mu\sigma^2}(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}} du$$

Donde:

μ es la media.

σ es la desviación estándar.

σ^2 es la varianza.

Pensamiento matemático en ecología

Para abordar mejor la ley de tolerancia de Shelford, tomemos nuevamente el ejemplo de las cucarachas y la temperatura, pero ahora imaginemos que la temperatura pudiera superar los 70°C en una casa cerrada completamente hermética. Entonces, ¿las cucarachas podrían sobrevivir a temperaturas tan altas?, este es el mismo cuestionamiento que se ha realizado sobre los modelos lineales, puesto que, si extendemos las relaciones hacia el infinito, la mayoría de estas relaciones no se mantienen por mucho tiempo.

Es por lo que, si realizáramos un experimento para conocer la temperatura máxima y mínima que pueden soportar las cucarachas, tendríamos que someterlas a temperaturas extremas. Entonces imaginen que tenemos suficientes terrarios con termostatos para controlar la temperatura dentro de ellos, donde colocamos 100 cucarachas en cada uno de ellos. Finalmente, cada terrario lo ajustamos a diferentes temperaturas entre 20°C y 80°C, de manera que tenemos terrarios a 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70° y 80°C, experimento que repetimos cinco veces.

Imagina los datos de este experimento y responde: ¿Qué tipo de comportamiento veríamos en los datos de **supervivencia** de cucarachas?, si solo registráramos la tasa de mortalidad ¿de qué forma se vería la gráfica de datos de **mortalidad**?

Realiza las dos gráficas de los datos esperados para natalidad y mortalidad

Vamos a seguir bajo el supuesto de que algunas plantas no soportan suelos contaminados y que, a mayor contaminante en suelo, menor será el número de plantas (especies) que vamos a encontrar. Con lo anterior esperaríamos tener una relación **diversidad-contaminante** en suelos con diferentes concentraciones de sustancias tóxicas. Por lo tanto, si aumenta la cantidad de contaminante en suelo,

disminuirá la presencia de plantas. Con tanta redundancia, es mejor ir a los números, para lo cual se ejemplifica de la siguiente manera:

Concentración de contaminante (ml por kg de tierra)	Número de plantas herbáceas por m²
400	10
350	20
300	30
250	40
200	50
150	60
100	70
50	80
0	90

Lo anterior se grafica de la siguiente manera:



También puede reflejarse en la **productividad de biomasa**, un tema que veremos más adelante, pero por lo pronto podemos trabajar con otro ejemplo experimental. Imaginemos que queremos conocer cuál es el efecto de los cambios en la proporción de oxígeno en el aire (21 % en nuestra atmosfera) sobre las poblaciones de insectos, por lo que partiremos del supuesto que cambiamos las concentraciones de oxígeno por el ingreso de gas nitrógeno, hasta tener concentraciones de 10, 5 y 1 % de oxígeno (Kandel, et al., 2021).

Entonces tenemos:

Porcentaje de oxígeno	%	Supervivencia de insecto (hipotético)
Concentración normal	21 %	Sí
Concentración media	10 %	72 a 144 horas
Concentración baja	5 %	48 a 72 horas
Concentración muy baja	1 %	Menos de 48 horas

En este sentido, la falta del O_2 molecular puede limitar la actividad metabólica de los insectos, reduciendo así su capacidad de realizar las diferentes reacciones metabólicas, lo cual incapacita la absorción de nutrientes.

TRANSVERSALIDAD

Patrones y simulación de modelos en ecología computacional

En ecología, se refiere a los patrones como el tipo de **estructuras no aleatorias** del ecosistema en una escala espaciotemporal, **estructura manejada por múltiples procesos ecológicos** (sean relacionados a un organismo, de una población o una comunidad). Reconocer los patrones en Ecología es importante para identificar y revelar la complicada relación existente entre patrones y procesos ecológicos, **objetivo central de la materia**. Un ecosistema se encuentra manejado por múltiples procesos ambientales, los cuales se exhiben como estructuras espaciales y temporales, gracias a la toma directa de datos sobre el ecosistema que se estudia, los cuales pueden utilizarse para modelar cambios y calcular tendencias numéricas (Han, Gao, et al., 2015).

Los patrones se describen en Ecología desde los años de 1940, por diferentes ecólogos y en diversos campos de la materia. Los patrones no aleatorios se describen en todos los dominios de esta ciencia, desde la ecología de poblaciones, de comunidades, del paisaje, hasta escalas globales (Han, Gao, et al., 2015).

No hay un método universal, pero, en general, se utilizan métricas simples o distribuciones estadísticas de datos, tales como cladogramas (también llamados árboles de distancias o filogenéticos), distribuciones de abundancias de especies en comunidades ecológicas, correlaciones espaciales de distribución de especies, arquitectura de las redes ecológicas y una diversidad de indicadores de la biodiversidad o ambientales (Han, Huang, et al., 2015; Minoarivelo et al., 2015; Ochiaga & Hui, 2015; Zhang & Gao, 2015).

Para comprender cómo funcionan los mecanismos y procesos ecológicos, la simulación en computadoras es usualmente utilizada para resolver preguntas específicas y complejas. Gracias a los avances tecnológicos en procesadores y supercomputadoras, es posible simular complicados sistemas ecológicos con gran detalle dando la posibilidad para modelar, conocer y explicar relaciones entre procesos biológicos (de la fisiología de los organismos), ambientales (características fisicoquímicas) y ecológicas (de las poblaciones y comunidades) (Han, Gao, et al., 2015).

Lo anterior ha generado una rama de la Ecología conocida como *Ecología computacional*, encargada del desarrollo, optimización y aplicación de simulaciones por computadora para modelar procesos ecológicos.

Realiza tu propia simulación computacional en la plataforma de https://cienciascontic.github.io/, donde podrás agregar nubes, Co_2 y modelar la temperatura atmosférica según la cantidad de partículas de efecto invernadero (https://cienciascontic.github.io/simuladores/cambio-climatico.html).



La gráfica muestra histogramas (graficas de barras de datos por clases) y un ajuste con un modelo lineal (línea azul), en una comparación de diferentes muestreos de árboles (k). Tomado de (Lu et al., 2015)



Estas gráficas de puntos, muestras tres distintos tipos patrones de distribución espacial de metapoblaciones. Tomada de (Han, Huang, et al., 2015)

Actividad de aprendizaje 8

Realiza la simulación con ayuda de una computadora o de tu celular si este es compatible con la página https://cienciascontic.github.io/simuladores/cambio-climatico.html (Wilensky, 1999).

1. En la página para el modelaje sobre el efecto invernadero modifica los valores de:

   - Brillo-sol (intensidad de rayos)
   - Albedo (color del suelo)
   - Nubes
   - CO_2

Realiza lo siguiente y contesta las preguntas:

I. Jugar un poco con el modelo, cambia el albedo y ejecutar la simulación. Agrega nubes y CO_2 al modelo y sigue un rayo. ¿Cuál es la temperatura más alta de la Tierra que logran producir?
II. Ejecuta el modelo con sol brillante, pero sin nubes ni CO_2. ¿Qué sucede entonces con la temperatura? Debería subir rápidamente y luego oscilar alrededor de los 37 grados. ¿Por qué deja de aumentar? ¿Por qué sigue fluctuando entre ciertos valores? Recordar que la temperatura depende de la cantidad de puntos rojos en la Tierra. Cuando la temperatura es constante, hay tantos rayos que entran como radiación IR que sale. ¿Por qué?
III. Explorar el efecto del albedo manteniendo las demás variables constantes. El incrementar el albedo, ¿aumenta o disminuye la temperatura? Cuando hagan el experimento, asegúrense de ejecutar el modelo durante suficiente tiempo hasta que la temperatura se estabilice.
IV. Explorar el efecto de las nubes manteniendo lo demás constante.
V. Explorar el efecto de agregar 100 moléculas de CO_2. ¿A qué se debe el cambio observado? Seguir un rayo solar.

2. Posterior a esto prueba con el modelo de depredador y presa (lobos y ovejas) de la siguiente liga https://cienciascontic.github.io/simuladores/lobos-ovejas-ES.html, observa la relación que muestran las abundancias de ambas poblaciones, modificando los valores iniciales de:

   - pasto (tiempo de renovación = tiempo-pasto-nuevo; valores bajos renovación rápida, valores altos representa lento crecimiento)
   - ovejas.
   - lobos.
   - https://cienciascontic.github.io/simuladores/lobos-ovejas-ES.html

Realiza lo necesario según las siguientes preguntas:

I. ¿Qué pasa con los lobos si bajas o incrementas el valor de renovación del pasto? prueba valores de 5, 10, 20, 40, 80 y observa lo que pasa con la gráfica a través del tiempo.

II. ¿Qué pasa si modificas el porcentaje de reproducción de los lobos? Observa lo que pasa y has tus observaciones.
III. ¿Qué pasa si eliminas el pasto?
IV. Prueben cambios en los valores en distintas circunstancias. ¿Cuán sensible es la estabilidad del modelo a un tipo particular de parámetros?
V. ¿Pueden encontrar valores para el modelo que generen un ecosistema estable que incluya solamente lobos y ovejas (sin pasto)?
VI. Prueben a poner PASTO en ON, pero setear CANT-INICIAL-LOBOS en 0. Esto da como resultado un ecosistema estable sólo con ovejas y pasto. ¿Por qué este ecosistema es estable, pero con ovejas y lobos solos no lo es?
VII. Observen que, bajo determinadas circunstancias, la población tiende a variar a un ritmo predecible. ¿Pueden encontrar algún parámetro que acelere o retrase este proceso?
VIII. Prueben cambiar las reglas de reproducción, por ejemplo, ¿qué pasaría si la reproducción dependiera de la energía en vez de estar determinada por un valor de probabilidad fijo?

Captura gráficas e imágenes para anexarlas a tus respuestas de los cambios que realizas al modelo y manda tu evidencia en PDF.



EVALUACIÓN DEL BLOQUE

1. ¿Qué es la Ecología?

    a. Una rama
    b. Una ciencia
    c. Un movimiento
    d. El medio ambiente

2. ¿Cuál es el objeto de estudio de la Ecología?

    a. El cuidado del medio ambiente
    b. Las relaciones entre los seres vivos y de cada uno de ellos con su medio
    c. Proteger a las plantas y animales
    d. Mejorar las condiciones de la naturaleza

3. Se establece como un cambio completo de paradigma, asegurando que para proteger el medio ambiente se necesita de un cambio radical en los actuales sistemas de producción y consumo, lo que necesita de cambios fuertes en los sistemas políticos y legales de los países:

    a. Ecología
    b. Ecologismo
    c. Ambientalismo
    d. Ecológico

4. Se encuentra relacionado a las políticas y leyes nacionales, dado de manera única en cierta estabilidad económica local, regional o nacional y en un nivel educativo generalizado adecuado. Este movimiento asegura que los grupos sociales pueden dirigir esfuerzos a temas medioambientales para mejorar su calidad de vida, ya que la estabilidad económica lo permite:

    a. Ecologismo
    b. Ecológico
    c. Ambientalismo
    d. Ecología

5. Según los argumentos dados durante el bloque, este sería una característica necesaria para que la ecología se establezca como una ciencia:

    a. Capacidad de protección ambiental
    b. Capacidad de reforestación
    c. Capacidad de predicción de procesos ambientales
    d. Capacidad de gestión ambiental

6. Representa una herramienta de gran importancia para la explicación de las relaciones entre las especies y con su medio ambiente:

   a. Las leyes ambientales
   b. Los movimientos ambientalistas
   c. Los modelos matemáticos
   d. Los movimientos ecologistas

7. Se lo conoce como "la capacidad de satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas":

   a. Sustentable
   b. Desarrollo sustentable
   c. Desarrollo ecológico
   d. Cuidado de la ecología

8. Lee las siguientes situaciones y relaciona a que tipo de investigación es, observacional o experimental:

   a. El Doctor en Ciencias Ambientales estudia la dinámica poblacional de los jaguares de la reserva del Abra-Tanchipa, para ello coloca una serie de cámaras trampa, que le ayudan a contabilizar los ejemplares existentes. Cada año contabiliza las crías que aparecen en las cámaras y a través de cadáveres encontrados calcula la tasa de mortalidad. Con esto se ayuda para calcular la tasa de supervivencia, mortalidad y natalidad de los ejemplares.
   b. El doctor en ciencia forestales se encuentra probando el efecto de los hongos micorrícicos en las interacciones planta-hongo, con el objetivo de conocer la tasa de desarrollo de las plantas con y sin interacciones micorrícicas. Para esto sembró semillas en suelos inoculados con micorrizas y suelos limpios, y midió el porcentaje de germinación y la tasa de crecimiento de las plantas.

9. Explica que un organismo puede o no existir en un lugar o tiempo definido, según la disponibilidad de nutrientes y la necesidad mínima de consumo para la supervivencia de ese organismo:

   a. Ley de Shelford
   b. Ley de Liebig
   c. Teoría de islas
   d. Ley de tolerancia.

REFERENCIAS

Aguilar-Correa, C. (2012). Los conceptos estructurantes de ecología como fundamento conceptual y metodológico de la educación ambiental. UMCE Extramuros, 67–84.

Aho, K., Derryberry, D., & Peterson, T. (2014). Model selection for ecologists: The worldviews of AIC and BIC. In Ecology (Vol. 95, Issue 3, pp. 631–636). Ecological Society of America. https://doi.org/10.1890/13-1452.1

Arias-Gómez, J., Villasís-Keever, M. Á., & Miranda-Novales, M. G. (2016). El protocolo de investigación III: la población de estudio. Rev Alerg Méx, 63(2), 201–206. www.nietoeditores.com.mx

Bucchi, M. (2002). Science in Society: An Introduction to Social Studies of Science. Routledge.

Challenger, A., & Dirzo, R. (2009). Tendencias de cambio y estado de la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios. In A. Flores Martínez & M. González-Espinosa (Eds.), Capital natural de México: Estado de conservación y tendencias de cambio (pp.185-245): Vol. II (CONABIO, pp. 205–210). Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

Cheshmehsohrabi, M. (2019). "Science", how is it formed? https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac

Córdova-Tapia, F., & Zambrano, L. (2015). La diversidad funcional en la ecología de comunidades. Ecosistemas, 24(3), 78–87. https://doi.org/10.7818/ecos.2015.24-3.10

Dodds, W. K. (2009). Laws, Theories, and Patterns in Ecology (1st ed.). University of California Press. http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1pn96n

Egerton, F. N. (2019). History of Ecological Sciences, Part 63: Biosphere Ecology. The Bulletin of the Ecological Society of America, 100(3). https://doi.org/10.1002/BES2.1568

Erofeeva, E. A. (2021). Plant hormesis and Shelford's tolerance law curve. In Journal of Forestry Research (Vol. 32, Issue 5, pp. 1789–1802). Northeast Forestry University. https://doi.org/10.1007/s11676-021-01312-0

Fernández-Manzanal, R., & Casal Jiménez, M. (1995). La enseñanza de la ecología. Un objetivo de la educación ambiental. Enseñanza de Las Ciencias, 13(3), 295–311.

Fischer, M. L., & Vasconcellos-Neto, J. (2003). Determination of the maximum and minimum lethal temperatures (LT 50) for Loxosceles intermedia Mello-Leitão, 1934 and L. laeta (Nicolet, 1849) (Araneae, Sicariidae). Journal of Thermal Biology, 28(8), 563–570. https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2003.07.002

Flores Salgado, J. (2010). Crecimiento y desarrollo económico de México. Unidersidad Autónoma Metropolitana.

García-López, E., Zavala-Cruz, J., & Palma-López, D. J. (2006). Caracterización de las comunidades vegetales en un área afectada por derrames de hidrocarburos Characterization of Plant

Communities in an Area Affected by Hydrocarbon Spill. Terra Latinoamericana, 24(1), 17–26. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57311494003 %0A

Gómez, I., Silva, R., Lithgow, D., Rodríguez, J., Banaszak, A. T., & Tussenbroek, B. van. (2022). A Review of Disturbances to the Ecosystems of the Mexican Caribbean, Their Causes and Consequences. In Journal of Marine Science and Engineering (Vol. 10, Issue 5). MDPI. https://doi.org/10.3390/jmse10050644

Han, X., Gao, M., & Hui, C. (2015). Pattern recognition and simulation in ecology. In Computational Ecology and Software (Vol. 5, Issue 4). www.iaees.orgArticle

Han, X., Huang, Y., & Hui, C. (2015). Spatial distributions of niche-constructing populations. In Computational Ecology and Software (Vol. 5, Issue 4). www.iaees.org

Herrera, J. M. (2011). El papel de la matriz en el mantenimiento de la biodiversidad en hábitats fragmentados. De la teoría ecológica al desarrollo de estrategias de conservación. Ecosistemas, 20(2), 21–34. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54022121003

Isaac-Márquez, R., Salavarría, O. O., Eastmond, A., Ayala, M. E., Arteaga, M. A., Isaac-Márquez, A. P., Sandoval-Valladares, J. L., & Manzanero-Acevedo, L. A. (2011). Cultura ambiental en estudiantes de bachillerato. Estudio de caso de la educación ambiental en el nivel medio superior de Campeche. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 13(2), 83–98. http://redie.uabc.mx/vol13no2/contenido-isaacmarquezetal.html

Kandel, P., Scharf, M. E., Mason, L. J., & Baributsa, D. (2021). Effect of hypoxia on the lethal mortality time of adult sitophilus oryzae L. Insects, 12(10). https://doi.org/10.3390/insects12100952

Keating, C. F. (2007). A Simple Experiment to Demonstrate the Effects of Greenhouse Gases. The Physics Teacher, 45(6), 376–378. https://doi.org/10.1119/1.2768699

Khalid, S., Azad, S., Naz, A., Ur Rahman, Z., & Iqbal, A. (2017). Climate Change: A Review of the Current Trends and Major Environmental. Science, Technology and Development, 36(3), 160:176. https://doi.org/10.3923/std.2017.160.176

Kweku, D., Bismark, O., Maxwell, A., Desmond, K., Danso, K., Oti-Mensah, E., Quachie, A., & Adormaa, B. (2018). Greenhouse Effect: Greenhouse Gases and Their Impact on Global Warming. Journal of Scientific Research and Reports, 17(6), 1–9. https://doi.org/10.9734/jsrr/2017/39630

Lalinde, H., Diego, J., Castro, E., Rangel, C., Gerardo, J., Sierra, T., Andrés, C., Torrado, A., Karina, M., Sierra, C., Milena, S., Pirela, B., & José, V. (2018). Sobre el uso adecuado del coeficiente de correlación de Pearson: definición, propiedades y suposiciones. https://www.redalyc.org/articulo.oa?

Latif, A., Ilyas, S., Zhang, Y., Xin, Y., Zhou, L., & Zhou, Q. (2019). Review on global change status and its impacts on the Tibetan Plateau environment. Journal of Plant Ecology, 12(6), 917–930. https://doi.org/10.1093/jpe/rtz038

Luke, T. W. (2009). An apparatus of answers? Ecologism as ideology in the 21st century. New Political Science, 31(4), 487–498. https://doi.org/10.1080/07393140903322562

Lynch, M., & Gabriel, W. (1987). Environmental tolerance. The American Naturalist, 129(2), 283–303.

Macip-Ríos, R., López-Alcaide, S., & Muñoz-Alonso, A. (2013). Abundancia, uso de hábitat, microhábitat y hora de actividad de Ameiva undulata (Squamata: Teidae) en un paisaje fragmentado del Soconusco chiapaneco. Revista Mexicana de Biodiversidad, 84(2), 622–629. https://doi.org/10.7550/rmb.31752

Martin, D., McKenna, H., & Livina, V. (2017). The human physiological impact of global deoxygenation. In Journal of Physiological Sciences (Vol. 67, Issue 1, pp. 97–106). Springer Tokyo. https://doi.org/10.1007/s12576-016-0501-0

Matthiopoulos, Jason. (2011). How to be a quantitative ecologist: the "A to R" of green mathematics and statistics. Wiley.

Minoarivelo, H. O., Diedericks, G., & Hui, C. (2015). An introduction to phylogenetic analyses and modelling in ecology. In Computational Ecology and Software (Vol. 5, Issue 4). www.iaees.orgArticle

Ochiaga, E. O., & Hui, C. (2015). Forms and genesis of species abundance distributions. In Computational Ecology and Software (Vol. 5, Issue 4). www.iaees.org

Pawar, P., Latake, P. T., & Ranveer, A. C. (2016). The Greenhouse Effect and Its Impacts on Environment. 333. https://www.researchgate.net/publication/302899977

Paz, R., & Chávez, P. (2023, October 9). El balance es sombrío ¿Debe replantearse la Agenda 2030? GACETA UNAM, 8–10.

Perdomo-Velázquez, H., Andresen, E., Vega, E., Schondube, J. E., & Cuarón, A. D. (2017). Effects of Hurricanes on the Understory Forest Birds of Cozumel Island. Tropical Conservation Science, 10. https://doi.org/10.1177/1940082917737759

Reyes Ruiz, F. J., & Castro Rosales, E. A. (2017). México y el decenio de la educación para el desarrollo sustentable de la UNESCO. XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa, 1–12. http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/seccion4.htm

Rivas-Arancibia, S. P., Bello-Cervantes, E., Carrillo-Ruiz, H., Andrés-Hernández, A., Figueroa-castro, D. M., & Guzmán-Jiménez Escuela, S. (2015). Variaciones de la comunidad de visitadores florales de Bursera copallifera (Burseraceae) a lo largo de un gradiente de perturbación antropogénica. 86, 178–187.

Rodríguez Aboytes, J. G., & Nieto Caraveo, L. M. (2017). Evaluación de competencias para la sustentabilidad en Educación Media Superior. XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa. http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/seccion4.htm

Rodríguez Martínez, J., Blanco Martín, J. M., & Rodríguez Martínez, V. (2013). Ecología (3a ed.). EDICIONES PIRÁMIDE.

Smith, T. M., & Smith, R. L. (2007). Ecología (Sexta). Pearson. Addison Wesley.

Turrubiate Coronado, C. A., Rebolledo Pérez, J., & Hernández Díaz, T. (2017). Asignatura Ecología. (p. 87). http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12615/5/images/BT_TIC.pdf

Vergara, P. M., Rivera-Hutinel, A., Farías, A. A., Cofré, H., Samaniego, H., & Hahn, I. J. (2009). ¿Cómo Responden los Animales del Bosque a las Perturbaciones Antropogénicas? In C. Donoso, M.E. Gonzalez, A. Lara (editores). Ecología Forestal: Bases para el Manejo Sustentable y Conservación de los Bosques Nativos de Chile. (Issue September, pp. 235–254). Ediciones Universidad Austral de Chile. http://www.ecoinformatica.cl/site/sites/default/files/cap6-2.pdf

Wikipedia. (2021). Ecología. Ecología. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecología&oldid=133329766

Wilensky, U. (1999). NetLogo. Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL.

World Commission on Environment and Development. (1987). The Brundtland Report: "Our Common Future" (Vol. 4, Issue 1). https://doi.org/10.1080/07488008808408783

Zhang, H., & Gao, M. (2015). Effect of spatial structure on the evolution of cooperation based on game models. In Computational Ecology and Software (Vol. 5, Issue 4). www.iaees.org

UNIDAD 2

Estructura, propiedades y función de los elementos que integran a los ecosistemas

Eje

Explica la estructura y organización de los componentes naturales del Planeta.

Componente

Estructura, propiedades y función de los elementos que integran a los ecosistemas.

Contenido central

El ecosistema donde vivo.

Contenido específico

- **¿Cuáles son los componentes de un ecosistema?**
- **¿Qué sucede si se modifican alguno o varios componentes de un ecosistema?**
- **¿Cuáles son las diferencias entre los ecosistemas natural, rural y urbano?**
- **¿Cuáles son los componentes del ecosistema donde vivo?**
- **¿Qué sucede con un ecosistema que ha sido talado o destruido por un fenómeno natural?**
- **Producción primaria y transferencia de energía.**
- **Homeostasis del ecosistema.**
- **Características generales y flujos de materia y energía en los ecosistemas natural, rural y urbano.**
- **Sucesión primaria y secundaria.**

Aprendizaje esperado

- **Examina la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas.**
- **Caracteriza un ecosistema indicando tipo, abundancia y distribución de los organismos que lo habitan. Asimismo, establece el flujo de materia y energía, y relaciones tróficas del mismo.**
- **Explica las consecuencias de la alteración de los ecosistemas.**
- **Identifica técnicas y elementos de matemáticas aplicables a los procesos de cuantificación de los recursos bióticos.**

Productos esperados

Texto individual sobre: ¿qué puedo hacer para que mis hijos tengan un ambiente sano, alimentos y recursos naturales suficientes?



Presentación de la unidad

En esta unidad analizaremos los factores ambientales del lugar donde vivimos. Hablaremos de los ecosistemas y sus componentes con sus características. Un ecosistema es una comunidad que incluye organismos vivos, como plantas, animales y microorganismos, y elementos no vivos, como el suelo, el agua y el aire; y pueden variar en tamaño desde un pequeño charco hasta el planeta entero.

Por lo tanto, los factores ambientales del lugar donde vives pueden incluir: el clima, el suelo, la vegetación, la topografía, la disponibilidad de agua, la presencia de contaminación y la proximidad a recursos naturales, esto hace necesario identificar el funcionamiento y la productividad de los ecosistemas.

También incluye las relaciones e interacciones entre estos componentes, como la alimentación, la reproducción y la competencia. En esta unidad analizaremos los componentes de un ecosistema, sus poblaciones y comunidades, así como las consecuencias en el ambiente si algún componente cambia.

Evaluación Diagnóstica

Una de las partes más complicadas en Ecología, es conocer exactamente qué es un ecosistema. Para iniciar, contesta las siguientes preguntas en parejas o equipos de no más de cuatro personas. Después de contestar las preguntas en equipos, realicen una mesa redonda o discusión grupal con las respuestas para plasmar la mejor conclusión a cada pregunta. Recuerda, que la discusión entre pares es la mejor herramienta para generar nuevos conocimientos.

1. ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema?

2. ¿Qué sucede si se modifican alguno o varios componentes de un ecosistema?

3. ¿Cuáles son las diferencias entre los ecosistemas natural, rural y urbano?

4. ¿Cuáles son los componentes del ecosistema donde vivo?

5. ¿Qué sucede con un ecosistema que ha sido talado o destruido por un fenómeno natural?





6. ¿Qué es producción primaria y transferencia de energía?

7. ¿ En qué se diferencia la homeostasis de un organismo a la homeostasis de un ecosistema?

8. ¿Qué significa el flujo de energía y el ciclo de materia para los ecosistemas?

9. ¿Cómo cambian los ecosistemas a través del tiempo?

Conclusión

Proyecto
Intégrate

Parte 1

¿Por qué las hojas son verdes?	
Parte 1	**Parte 2**
Escanea el siguiente código Minuto de la Tierra - 16 mar 2013 Realiza anotaciones del video y contesta las preguntas.	Escanea el siguiente código Minuto de la Tierra - 25 mar 2013 Realiza anotaciones del video y contesta las preguntas.

Después de ver los videos y tomar tus apuntes, contesta lo siguiente:

1. ¿Qué porcentaje de la biomasa de la biosfera (materia viva) se encuentra sustentada por los organismos fotosintéticos oxigénicos?

   _____

2. Investiga qué otras fotosíntesis existen, escribe las reacciones generales para comparar y describe sus diferencias.

   _____
   _____
   _____
   _____
   _____

3. ¿Qué diferencia existe entre la maquinaria bioquímica verde y la maquinaria bioquímica morada?

   _____
   _____
   _____
   _____

4. Explica por qué sería mejor el negro a un verde, en relación con la absorción de energía lumínica.

   _____
   _____
   _____
   _____

5. Investiga sobre las reacciones dependientes de la luz (la reacción lineal y cíclica) y las reacciones independientes de la luz. Realiza un diagrama general de cada una de estas reacciones e identifica la ganancia o pérdida de ATP en cada una de ellas.

El ecosistema donde vivo

En cada parte del planeta en donde te encuentres, tú y tu familia interactúan con una serie de características ambientales definidas por eventos evolutivos, ecológicos y geológicos circunstanciales. Es claro que la posición planetaria influye en gran medida, de igual manera lo hacen las características **orográficas** y biológicas. Por tal motivo, iniciaremos primero con la parte biológica del ecosistema, posteriormente la parte fisicoquímica. En este entendido, es necesario anticipar que las distintas formas de abordar a cada ecosistema dividen a la Ecología en dos enfoques: *ecología estructural* y *ecología funcional* (Córdova-Tapia y Zambrano, 2015), los cuales pueden resumirse en el siguiente diagrama (Tomado y modificado de Mass y Martínez, 1990):

Glosario

Orografía. Según la Real Academia Española, la **orografía** es la geografía física que describe a las montañas, por lo que refiere al conjunto de pliegues montañosos de una región.

Estructural

- Comunidad
- Población
- Individuo

Función y estructura

- Productores
- Consumidores
- Descomponedores

Funcional

- Captura de energía
- Retención de nutrientes
- Tasas de regulación

Modificado de Mass y Martínez, 1990.

La manera en la que los ecólogos fragmentan un ecosistema depende de los enfoques anteriores, los cuales han servido para reafirmarlos como unidades funcionales, aunque los límites de estos no sean claros ni fáciles de definir en la mayoría de los casos (Armenteras, et al., 2016; Maass y Martínez-Yrízar, 1990).

Además de lo anterior, también se ha encontrado la necesidad de analizar y definir las escalas **espaciotemporales**, ya que los **patrones numéricos** observados en la unidad anterior se expresan en fragmentos del continuo del tiempo y el espacio. Es fácil comprender que la Ciudad de México no es igual a la ciudad de Monterrey en Nuevo León, por lo que cada zona urbana interactúa con distintas características ambientales (humedad ambiental, altura sobre el nivel del mar, temporadas de lluvias, frecuencia de tormentas invernales, etc.). Por otra parte, no es igual la ciudad de Monterrey actual a la de hace 100 años, pues con cada gestión municipal, estatal y federal se realizan proyectos de infraestructura y demás actividades socioculturales que impactan directamente en la forma y aspecto de la ciudad.

Glosario

Espaciotemporal. Tamaño o proporción en que se desarrolla un plan o idea. Igualmente es comparable con la escala utilizada en un plano o mapa.
Patrón numérico. Modelos o regularidades numéricas que permiten predecir futuros resultados.

Tal como se expresa en el párrafo anterior, los ecosistemas tienen una variabilidad en la estructura y función a distintas escalas temporales y espaciales, mostrando patrones característicos con relación a procesos naturales (p. ej., atmosféricos, geológicos y biológicos), así como procesos antrópicos (p. ej., económicos, sociales y culturales) que impactan directamente en las condiciones de los procesos naturales.

Para curiosos

Si quieres saber más sobre mutaciones, escanea el siguiente código y mira el video, *Selección natural y adaptación*, de HHMI BioInteractive en español.

¿Cuáles son los componentes de un ecosistema?

Los ecosistemas están estructurados de una forma muy compleja, pues su correcto funcionamiento se encuentra definido por todas las partes que lo componen y la manera en que esas partes interactúan. En la actualidad están bien definidas y tenemos una idea bastante completa del cómo funcionan, ya que **los individuos de la misma especie se agrupan en estructuras poblacionales más o menos definidas genéticamente** (esto debido a la velocidad en que se dan las **mutaciones**) y, además, dependen de las características de los grupos biológicos, pues no es lo mismo hablar de plantas, insectos, aves o jaguares. Así, podemos definir de forma bastante adecuada que una **población ecológica** está constituida por un grupo local de individuos de una misma especie que se encuentra distribuida en un espacio y tiempo definido, donde también aparece y reconoce el concepto de **metapoblación** para comprender la dinámica entre poblaciones (Khan, 2018; Maciel-Mata, et al., 2015).

Glosario

Mutaciones. son cambios aleatorios en el ADN de cada especie, que pueden o no ser fijadas por características externas o internas de la población. Tal es el caso del **pavo real**, donde la selección realizada por las hembras en los machos con cola más grande y vistosa define la característica.
Metapoblación. es un conjunto de poblaciones próximas que intercambian individuos (de la misma especie), de manera que actúan como una gran población fragmentada, dividida en parches que contienen *subpoblaciones*.

Por su parte, al **conjunto de poblaciones ecológicas dentro de un espacio definido por el observador** se le llamará **comunidades ecológicas**. Lo anterior refleja lo complicado que es limitar a una comunidad, ya que, en la naturaleza, todas las poblaciones se traslapan de forma aleatoria, lo que produce

una infinidad de combinaciones en las interacciones ecológicas que, si las siguiéramos y ligáramos en su totalidad, terminaríamos por definir una sola comunidad ecológica planetaria.

Población

Individuos geneticamente similares (especie) en un espacio y tiempo definido

Comunidad

Suma de poblaciones en un espacio y tiempo definido por el observador

Ecosistema

"Conjunto de organismos y su medio físico interactuando en un lugar"

Finalmente, el **ecosistema** (en términos conceptuales) engloba todos las partes bióticas y abióticas, por lo que los estudios de ecosistemas serán siempre más difíciles de realizarse por la gran inmensidad de factores a estudiar. En términos conceptuales, es complicado definir a un ecosistema en un sentido estricto, pues se refiere a sistemas abiertos compuesto por entidades de muy variadas características. Sin embargo, tomando en cuenta la revisión de Armenteras y cols. (2016), los ecosistemas representan un **"conjunto de organismos y su medio físico interactuando en un lugar"**, dejando bastante claro lo complicado que es limitarlo en el espacio y el tiempo, permitiendo con este concepto la flexibilidad conceptual para su aplicabilidad y comprensión.



Las poblaciones y sus características generales

Todos los individuos de una misma especie se distribuyen en un área geográfica tal, que se conoce gracias a los registros que realizamos al momento en que nosotros observamos a un individuo de una especie en cualquier lugar. Por ende, el área de distribución de una especie es una fracción de espacio geográfico en donde muestra un patrón de distribución y que se encuentra finalmente manejada por características demográficas también llamadas densodependientes (Galiana, 2001; Khan, 2018; Maciel-Mata, et al., 2015). Es posible imaginar fácilmente lo anterior y representarlo también si arrojamos un puñado de 100 canicas en una charola cuadrada de 50 cm², donde podrá verse que las canicas constituirán distintas formas de agrupación; en el caso de organismos, la mayoría tienden a concentrarse en lugares definidos por ellos mismos.

Gráfica de distribución normal y sus referentes matemáticos



Distribución y su comparación espacial en puntos distribuidos en un espacio plano



En este sentido, las **poblaciones ecológicas** muestran organizaciones espaciales muy variadas, pero una de las más comunes y notables para entender la generalización de todas las poblaciones es la "distribución normal", una distribución que matemáticamente tiene relevancia por su aplicabilidad, pero visualmente se puede apreciar de la siguiente manera:

Dentro de esta distribución espacial, se van a agrupar en subgrupos poblacionales a los cuales se les han llamado **metapoblaciones**, término introducido por Levnis en 1969 (Yuttham et al., 2003). Las metapoblaciones tienen un papel importante en el intercambio genético para el mantenimiento de la biodiversidad, la conservación y la restauración de ecosistemas (van Nouhuys, 2016; Yuttham, et al., 2003), incluso es útil para entender algunos contextos evolutivos, lo analizaremos más adelante, ¡si nos alcanza el tiempo! Sin embargo, el crecimiento poblacional y la dinámica de las metapoblaciones son parámetros densodependientes, y se explican como la tasa intrínseca de crecimiento por individuo y en un estado de equilibrio dinámico por los movimientos entre metapoblaciones.

Lo anterior se explica bajo dos modelos matemáticos complementarios, representados por las siguientes fórmulas:

Tasa intrínseca de crecimiento poblacional por individuo

La tasa de crecimiento de poblaciones se desarrolla gracias a los estudios poblacionales humanos y se traslada a la ecología de una forma muy similar. Sin embargo, cambian algunos aspectos por las

particularidades que algunas de las poblaciones de animales presentaban, como las estrategias reproductivas. En lo general, la fórmula matemática del crecimiento poblacional se desarrolla así:

$$\frac{dN}{dt} = ((n-m)N)(1-\frac{N}{K}) \rightarrow \frac{dN}{dt} = r*N(1-\frac{N}{K})$$

- Donde ***dN*** representa el cambio en la abundancia.
- Donde ***dt*** representa un intervalo de tiempo corto.
- Donde ***n*** y ***m*** (***r = n – m***) son igual a natalidad y mortalidad respectivamente.
- Donde *N* representa el total de la población del intervalo de tiempo medido.
- Donde ***K*** representa a la capacidad de carga ambiental.

Aquí es muy simple desarrollar una simulación de datos para comprender la formula anterior. La tasa intrínseca de crecimiento poblacional depende de la relación entre natalidad y la mortalidad, donde podemos entender que la permanencia de la población depende del equilibrio de ambas características poblacionales.

Vamos a los números, si de 100 individuos de jaguares de una reserva tenemos una distribución de sexos constante de 1:1 (hembras: machos) y cada hembra da a luz a 1 individuo por temporada reproductiva, entonces tenemos un crecimiento poblacional del 50 % para cada temporada, lo que representa un valor de "r" del 0.5 si se considera una mortalidad de 0 individuos. Entonces, para saber la constante de crecimiento durante las siguientes 5 temporadas sólo se tiene que multiplicar el total de la población por 0.5 para saber cuánto crecerá la población para la siguiente temporada reproductiva.

Ahora bien, si consideramos que la mortalidad siempre será una característica presente, entonces podemos definir una mortalidad del 50 % para las temporadas posteriores (t6 a t7) con el fin de conocer el comportamiento de la población.

Tabla 1. Ejemplo de una población ficticia con tres valores diferentes de mortalidad a través del tiempo y como estos afectan a la totalidad de los individuos (To).

Tiempo	HEMBRAS	MACHOS	n	m	r	To=N
t1	50.00	50.00	50.00	0.00	0.5	100.00
t2	75.00	75.00	75.00	0.00	0.5	150.00
t3	112.50	112.50	112.50	0.00	0.5	225.00
t4	168.75	168.75	168.75	0.00	0.5	337.50
t5	253.13	253.13	253.13	0.00	0.5	506.25
t6	379.69	379.69	379.69	379.69	0	759.38
t7	379.69	379.69	379.69	379.69	0	759.38
t8	379.69	379.69	379.69	379.69	0	759.38
t9	379.69	379.69	379.69	379.69	0	759.38
t10	379.69	379.69	379.69	379.69	0	759.38

t11	379.69	379.69	379.69	759.38	-0.5	**759.38**
t12	189.84	189.84	189.84	379.69	-0.5	**379.69**
t13	94.92	94.92	94.92	189.84	-0.5	**189.84**
t14	47.46	47.46	47.46	94.92	-0.5	**94.92**
t15	23.73	23.73	23.73	47.46	-0.5	**47.46**



Como la tasa de mortalidad es la misma que la tasa de mortalidad (50 %), la población total (To) al finalizar cada temporada reproductiva deja de crecer a partir de la temporada 6 (t6). Este punto de igualdad entre la natalidad y la mortalidad se le conoce como equilibrio poblacional, equilibrio que se visualiza en la realidad como una tendencia general de la suma de todas las fluctuaciones totales de la población a través del tiempo, por lo que una población solamente será estables si la suma de todas esas fluctuaciones es igual a 0.

En este sentido, una población puede presentar valores de r negativos cuando los números mostrados en cada tiempo medido evidencian una pérdida de individuos, tal y como se muestra en la tabla anterior. Las tres situaciones poblacionales con respecto a los posibles valores de r se muestran en las gráficas siguientes, según lo expuesto por Rodríguez Martínez (2013):



Las gráficas tomadas y modificadas de Rodríguez-Martínez (2013), muestran tres ejemplos de cambios poblacionales, una en crecimiento (r = 0.22), una estacionaria (r = 0) y una en decremento (r = -0.18) (Rodríguez Martínez, 2013).

Hay distintos métodos de muestreo para conocer a las poblaciones, algunos de los cuales pueden ser invasivos o no invasivos. Sin embargo, muchos tienen el objetivo de medir **parámetros poblacionales que dependen de la población misma**, llamados **parámetros densodependientes (como la natalidad, la mortalidad y la proporción entre hembras y machos),** por verse afectados por los cambios en la población (Rodríguez Martínez et al., 2013). Por ejemplo, la tasa de natalidad en una población se verá afectada por la proporción **hembras:machos**, pues si en una población de 100 individuos tenemos una proporción 1:1, y consideramos que las camadas son de 2 crías, tendríamos una natalidad máxima estimada para el primer ciclo reproductivo de 100 individuos nuevos.

O sea que:	Proporción hembras:machos (valor real en una población de 100 individuos)	Tasa de natalidad estimada para el primer ciclo reproductivo
Población hipotética 1	1:1 (50 hembras:50 machos)	100 ejemplares nuevos
Población hipotética 2	1:3 (25 hembras:75 machos)	50 ejemplares nuevos
Población hipotética 3	3:1 (75 hembras:25 machos)	150 ejemplares nuevos

NOTA: esto lo entendemos por el número de individuos por camada, ya que, si hay 25 hebras, cada una podrá tener dos crías, estimando el nacimiento de 50 crías en el primer ciclo reproductivo. Sin embargo, si hubiera 75 hembras, el máximo de crías probables en el primer ciclo reproductivo será de 150 crías (dos por cada hembra).

Equilibrio dinámico entre las tasas de inmigración (*I*) y emigración (*E*):

Los parámetros anteriores no son los únicos que pueden afectar a la dinámica poblacional, puesto que posteriormente se integró las bases de la teoría de islas a las poblaciones, generando lo que se conoce como teoría de meta poblaciones. La fórmula del equilibrio dinámico es la siguiente:

$$\frac{dp}{dt} = I(p^*) - E(p^*) = 0$$

- Donde ***dp*** representa el cambio en la abundancia en las parcelas (meta poblaciones).
- Donde ***dt*** representa un intervalo de tiempo corto.
- Donde ***I*** y ***E*** son igual a inmigración y emigración respectivamente.

Este modelo se basa en la capacidad de las poblaciones de colonizar o recolonizar sitios disponibles, así como las posibilidades de verse desplazadas de otros sitios en los cuales ya se encuentran presentes. Es claro que este modelo es una generalización de la tasa intrínseca de crecimiento, puesto que en cada sitio por colonizar o colonizado será manejado por la natalidad, la mortalidad y la proporción de hembras y machos.

Tomando lo anterior podemos imaginarnos una situación particular, donde una población de una especie de escarabajos (taladradores) tiene la posibilidad de colonizar un área de cultivo forestal maderable recién instalado, pero por razones exclusivas del sitio (la distancia) sólo pueden migrar los machos. Entonces tenemos un área colonizada con puros ejemplares machos que no podrán reproducirse por la ausencia de hembras, así que en esa área tendríamos valores de natalidad igual a cero y valores de mortalidad mayores a cero, lo que representaría un valor de r negativo. Esta nueva subpoblación de

puros machos está destinada a la extinción, a menos que se mantenga un ingreso de ejemplares constante a través del tiempo. A estos subgrupos de las poblaciones se les conoce como meta poblaciones y la conectividad entre ellas es importante para la supervivencia de todas las metas poblaciones.

Los parámetros **denso-dependientes** más evidentes son natalidad, mortalidad y migración, aunque éste último tiene dos variantes (inmigración y emigración), según el sitio observado. La mortalidad es considerada como todas aquellas causas naturales de muerte (por vejes o enfermedad, propia de la homeostasis de cada organismo), las cuales son valores dependientes de la densidad y sus intercambios genéticos. Por su parte tenemos al tercer parámetro, la migración, la cual tiene dos variantes que se expresan desde la meta población de referencia o de observación.

Por su parte, tenemos al tercer parámetro, la migración, la cual tiene dos variantes que se expresan desde la subpoblación de referencia (o también llamada **metapoblación**). Pero para entender esto, primero vamos a ejemplificar la **teoría de metapoblaciones**, suponiendo que hablamos de la especie humana, en este contexto vamos a considerar como **población ecológica completa de humanos** a todos los individuos de nuestra especie que existen en el mundo, mientras que cada agrupación de personas sea rural o urbana será considerada como un subgrupo llamado **metapoblación**.

Estas metapoblaciones se encuentran ligadas por un intercambio de recursos tanto de supervivencia como genéticos (**intercambio de individuos**), a estos últimos se les llama **migración**. Esta puede darse en dos direcciones según la comunidad humana o metapoblación de la que se hable, por lo que, si hablamos de Ciudad Valles, todos aquellos individuos que sean movidos desde otra metapoblación (sea comunidad rural o urbana) hacia dentro de Ciudad Valles serán considerados como **inmigración**. Por otro lado, los que sean movidos fuera serán considerados como **emigración**.



Hasta este punto, todo es bastante claro, ahora falta por comprender la importancia que tienen estas entradas o salidas para la metapoblación de referencia, pues la **tasa de natalidad** (individuos que nacen en un tiempo determinado) van a sumar al total de la **metapoblación (+)**, mientras que la **tasa de mortalidad** va a restar **individuos (–)** a ese total. Por su parte, la **tasa de inmigración** va a sumar **individuos (+)**, mientras que la **tasa de emigración** va a restar **individuos (–).**

En este punto tenemos que el equilibrio de una población va a depender de los parámetros densodependientes de natalidad, mortalidad, inmigración y emigración. Ello resulta en una ecuación simple de razonamiento matemático:

Equilibrio metapoblacional = (Natalidad – Mortalidad) + (Inmigración – Emigración)

$$Eq = (N - M) + (I - E)$$



Distintas metapoblaciones interconectadas, algunas con equilibrio mayor a 0 (fuente), otras con el equilibrio menor que 0 (sumidero)



Tomada de *Maciel-Mata et al., 2015.*

Las metapoblaciones pueden tener distintos grados de conexión entre ellas a través del tiempo, lo cual puede ser por medios naturales o por intervención del hombre. **A** representa una población con complicadas conexiones entre sus meta-poblaciones; **B**, una población con pocas conexiones entre sus meta-poblaciones; **C**, una población con dos grupos de meta-poblaciones aislados

Con este razonamiento simple, si el equilibrio es igual a 0 (cero) durante un tiempo de mediciones considerable, la **metapoblación** se considera **estable**. Sin embargo, podemos tener un equilibrio mayor que 0 (cero), como es el caso de las metapoblaciones humanas, que se encuentra en un **crecimiento constante**. Por lo contrario, se pueden encontrar equilibrios menores que 0 (cero), lo que nos indica **metapoblaciones decadentes**.

En este punto es claro que podemos tener metapoblaciones decadentes y metapoblaciones crecientes, las cuales toman su nombre según la capacidad de aportar individuos a la población completa o de eliminarlos. Estas metapoblaciones se denominan **fuente** o **sumidero** según su capacidad de aportar o eliminar individuos al total de la población.

Para la evaluación de las poblaciones se tienen que realizar mediciones de los parámetros de manera periódica con el fin de poder proyectar su comportamiento, por eso las fórmulas del crecimiento intrínseco de poblaciones y la del equilibrio dinámico se expresan en igualdad a $\frac{dp}{dt}$, que se refiere a la densidad poblacional en el tiempo de referencia. Lo anterior revela el inmenso trabajo que se realiza para el estudio de las poblaciones, lo cual evidencia la falta de información para muchas de las poblaciones de especies en peligro de extinción o amenazadas. Digamos que, si definimos al año como tiempo de medición para una meta población x de estudio, entonces tendríamos que tomar datos cada año.

Año 1.												Año 2.												Año 3.											
Ni												Ni+1												Ni+n											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
n= todos los nacimientos del t_1												n= todos los nacimientos del t_2												n= todos los nacimientos del t_n											
m= todas las muertes del t_1												m= todas las muertes del t_2												m= todas las muertes del t_n											
I= todas las inmigraciones del t_1												I= todas las inmigraciones del t_2												I= todas las inmigraciones del t_n											
E= todas las emigraciones del t_1												E= todas las emigraciones del t_2												E= todas las emigraciones del t_n											

Ejemplo:

Tenemos una población inicial de 1 200 conejos en un criadero cuya capacidad es de 2 500. El encargado del criadero hace un monitoreo de la población de conejos cada mes para controlar el crecimiento (contabiliza los conejos nacidos, los muertos y los vendidos), y con eso poder calcular cual es la cantidad de conejos que necesita extraer mensualmente para mantener una población que ronde los 2 000 conejos. Además, es necesario que ingrese ejemplares de otros criaderos para mantener una correcta dinámica de la genética de sus conejos con el fin de mantener sana su población de conejos, los cuales también registra cuidadosamente.

Finalmente, elabora una tabla que le permite visualizar cada registro que realiza, con el fin de poder mantener el control de su población de conejos. Casi al finalizar el año, obtiene la siguiente tabla:

Metapoblación inicial 1 200 (N_0)*	Enero N_0	Febrero N_1	Marzo N_2	Abril N_3	Mayo N_4	Junio N_5	Julio N_6	Agosto N_7	Septiembre N_8	Medias
$N_{i+1} = N_i + Eq_{Ni}$	1 200	1 261	1 245	1 305	1 330	1 321	1 384	1 416	1 357	1 313.2*
Tasa de natalidad (n)	126	89	138	97	108	76	83	106	146	107.67
Tasa de mortalidad (m)	4	8	6	16	5	8	12	9	7	8.33
Extracción por venta (E = Emigración)	86	117	92	76	132	25	59	176	156	102.1
Compra para mantener diversidad genética (I = Inmigración)	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20.55
Eq. = (n - m) + (I – E)	61	–16	60	25	-9	63	32	-59	3	17.77
Tasa de crecimiento TC = Eq. / N****	5.08 %	–1.27 %	4.82 %	1.92 %	–0.68 %	4.77 %	2.31 %	–4.17 %	0.22 %	1.45 %

**** La tasa de crecimiento es un porcentaje obtenido de la división entre Eq. y N del mismo tiempo medido.

Las mediciones siempre serán por muestreo, y es importante toda la información que nos puede proporcionar. Para el caso de cada una de las características podemos calcular su tasa media con respecto a la población inicial o su tasa media con respecto a la población anterior. Se puede jugar con los datos para ver qué tanta información nos puede proporcionar.

Para obtener la **media** del equilibrio poblacional, de la mortalidad, de la natalidad, la emigración y la emigración, las cuales se expresan por medio de mediciones en un intervalo de tiempo definido (un año, 10 años, etc.), solo tenemos que aplicar la siguiente fórmula:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n} = \frac{\Sigma x_i}{n}$$

Esto se toma como la suma total de todos los datos entre el número de datos existentes. Con esto podremos obtener una media de cada parámetro poblacional densodependiente para poder calcular la **tasa media** de cada uno de ellos.

En seguida se presentan las **fórmulas** para calcular las tasas medias de cada parámetro:

Tasa de natalidad media va a utilizar la natalidad dada por la media de un periodo definido, expresadas en porcentaje con respecto a la población total.

$$Tasa\ de\ natalidad\ media = \frac{Media\ de\ natalidad(N)}{Media\ de\ los\ totales\ de\ la\ metapoblación} \times 100$$

Con los datos en el ejemplo de los conejos quedaría así:

$$Tasa\ de\ natalidad\ media = \frac{107.67}{1313.2} \times 100$$

En esta misma lógica, se pueden calcular la **tasa de mortalidad media**, la **tasa de inmigración media**, la **tasa de emigración media** y la **tasa de crecimiento** (utilizando el valor de equilibrio para calcular la tasa de crecimiento), **solo se sustituye el valor de natalidad** por el que se quiera calcular.

$$Media\ de\ la\ tasa\ de\ mortalidad = \frac{Media\ de\ mortalidad(m)}{Media\ de\ los\ totales\ de\ la\ metapoblación} \times 100 = \frac{8.33}{1313.2} \times 100$$

$$Media\ de\ la\ tasa\ de\ migración = \frac{Media\ de\ migración(E\ o\ I)}{Media\ de\ los\ totales\ de\ la\ metapoblación} \times 100 = \frac{102.11}{1313.2} \times 100 \text{ o } \frac{20.54}{1313.2} \times 100$$

$$Media\ de\ la\ tasa\ de\ crecimiento = \frac{Media\ de\ equilibrio(Eq)}{Media\ de\ los\ totales\ de\ la\ metapoblación} \times 100 = \frac{17.78}{1313.2} \times 100$$

Finalmente, los valores serán referentes numéricos para tener una adecuada comprensión de nuestra metapoblación, que nos pueden servir para diferentes objetivos.

En caso de poblaciones naturales, nos ayudaría a predecir qué pasaría si dividimos dos metapoblaciones conocidas por la construcción de una megaautopista. En el caso de criaderos de mamíferos, peces o aves, nos ayudaría a realizar un aprovechamiento sustentable.

Gráficas para los datos

Los datos obtenidos de la dinámica de la metapoblación pueden ser graficados de manera muy simple: en el eje de las Y, como variable cuantitativa, tenemos al número de individuos (tamaño total mensual de la metapoblación), por lo que el eje de las X expresará la variable cualitativa ordinal de los meses (tienen un orden natural definido).



Otros parámetros denso-dependientes que usualmente se usan en poblaciones humanas.

Aunque los parámetros denso-dependientes anteriormente abordados son los más comunes y evidentes, también la distribución de edades puede ser un factor importante, ya que la fertilidad está relacionada a la edad y según los ciclos específicos de cada especie podía afectar en sus tasas de crecimiento. En las poblaciones humanas a parte de la capacidad reproductiva, también la productividad del individuo se ve afectada, por lo que los censos de poblaciones son importantes en los países para establecer estrategias adecuadas para el desarrollo económico y social. Una distribución natural de edades debería tener mayor número de individuos jóvenes, como lo muestra la imagen 1.



Imagen 1. Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

Existiendo pocas personas de mayor edad, es fácil que la población en edad productiva pueda mantener las pensiones de los individuos de edades mayores.

Sin embargo, en las poblaciones humanas tenemos modificaciones importantes en esta distribución gracias a los avances en salud y educación, lo cual hace que la esperanza de vida sea mayor para la mayoría de la población y que la tasa de natalidad se reduzca por un aumento en la educación. Esto hace que la distribución de edades cambia hacia una mayor cantidad de adultos en relación con los jóvenes, resultando en gráficas como la imagen 2.



Imagen 2. Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

Esto representa una problemática importante que tarde o temprano se verá reflejada en la tasa intrínseca de crecimiento poblacional, así como la falta individuos en edad productiva en los sistemas industriales. Por ende, la productividad y la economía podría colapsar a falta de estrategias que prevengan dichos efectos.

Para el caso de países con poblaciones estabilizadas, los diferentes grupos de edades se distribuyen de manera más homogénea. Esto se da gracias a que la mortalidad y la natalidad son estables y equiparables, lo que resulta en una distribución de edades con bajas fluctuaciones, lo cual mostraría una gráfica como en la imagen 3.



Imagen 3. Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

Cabe mencionar que para que una población humana muestre este tipo de patrón en la distribución de sexos y edades, tendrían que existir muchos controles, desde la natalidad (educación de planificación familiar) y mortalidad (sistemas de salud eficientes), así como estrategias económicas y socioculturales que mantengan a los individuos (reducción de la emigración) y un control sobre el ingreso de nuevos individuos provenientes de otros países (control de inmigrantes).

Todas estas herramientas descriptivas y numéricas nos permiten desarrollar predicciones cada vez más precisas, que nos ayudan en el desarrollo de estrategias de acción en concordancia con la especie con la que se trabaje, seamos nosotros o cualquier otra especie existente en este planeta.

Actividad de aprendizaje 9

¿Qué sucede si se modifica alguno o varios de los componentes de un ecosistema? Poblaciones

Se va a realizar la construcción de una súper avenida de seis carriles de ancho que atravesará un parque arbolado de alrededor de 800 hectáreas, las cuales quedarán divididas en dos secciones, una de alrededor de 200 hectáreas y otra de casi 600 hectáreas. Se estudiaron dos metapoblaciones de ardillas rojas, las cuales van a quedar fragmentadas por la avenida cuando sea terminada, con el fin de predecir cual será el destino de dichas metapoblaciones cuando se divida el parque.

Las metodologías utilizadas fueron las siguientes:

Los datos de mortalidad fueron calculados con conteos mensuales de cadáveres dentro y en las periferias del parque, mientras que la natalidad se calculó con el conteo de nidos

durante la temporada de anidación, tomando la media para calcular la natalidad y el conteo de juveniles para ajustar el cálculo. Para calcular los movimientos entre metapoblaciones se emplearon cámaras trampa colocadas en sitios que son atravesados por las rutas de migración más utilizadas.

Datos obtenidos de los muestreos

Se obtuvieron los siguientes datos en un estudio poblacional de 6 años, puesto que el ciclo de las ardillas es anual con un tamaño de camada de uno a tres crías (anualmente). Se obtuvieron las siguientes dos tablas:

Metapoblación 1 (predio de 200 hectáreas)

Metapoblación inicial censada: 286	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Media	Tasa
$N_{i+1} = N_i + Eq_{Ni}$	N_0	N_1	N_2	N_3	N_4	N_5		
Total de individuos (N_i)								
Natalidad (n)	90	85	93	81	99	91		
Mortalidad (m)	117	108	95	103	118	118		
Emigración (E)	23	35	29	32	19	28		
Inmigración (I)	68	58	52	53	47	52		
Eq. = (n – m) + (I – E)								
Tasa de crecimiento $TC = Eq_{Ni/Ni}$								

Metapoblación 2 (el predio de 600 hectáreas)

Metapoblación inicial censada: 536	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Media	Tasa
$N_{i+1} = N_i + Eq_{Ni}$	N_0	N_1	N_2	N_3	N_4	N_5		
Total de individuos (N_i)								
Natalidad (n)	335	328	302	349	299	312		
Mortalidad (m)	263	219	223	197	234	253		

Emigración (E)	68	58	52	53	47	52		
Inmigración (I)	***23***	***35***	***29***	***32***	***19***	***28***		
Eq. = (n – m) + (I – E)								
Tasa de crecimiento TC = $Eq_{Ni/Ni}$								

Realiza los cálculos necesarios y grafica los resultados para realizar las comparaciones necesarias.

Una vez calculados los datos de natalidad, mortalidad, emigración, inmigración, equilibrio y tamaño de la metapoblación, contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el destino más probable que tendrán las dos metapoblaciones cuando la avenida esté terminada, eliminando el flujo entre ellas? Realiza los cálculos necesarios para sustentar tu respuesta.

	Meta población 1				**Meta población 2**			
Año	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
N	**N_6**	**N_7**	**N_8**	**N_9**	**N_6**	**N_7**	**N_8**	**N_9**
(N_i)								
(n)								
(m)								
(E)								
(I)								
Eq. = (n – m) + (I – E)								

Gráfica para comparar ambas meta-poblaciones.

2. ¿Crees que una de las metapoblaciones esté funcionando como fuente o sumidero?

3. ¿Qué estrategia sería viable para evitar los posibles escenarios que te permiten predecir los datos obtenidos?

4. Finalmente, realiza un análisis de la problemática generada por todas las vías de comunicación existentes en México, enfatizando el problema que genera sobre las poblaciones de especies (puedes utilizar ejemplos locales o regionales que conozcas) y realiza una propuesta de acción a la mitigación de estos impactos.

Las comunidades y sus características generales

Una vez comprendida la estructura de una población ecológica y abordado algo de la dinámica dentro de ellas, se puede ir más allá. Recordemos que la población se basa en el conjunto de individuos de una sola especie, mientras que en un ecosistema encontramos un conjunto de poblaciones interactuando entre sí, lo que llamamos comunidad.

El estudio de las **comunidades ecológicas** también incluye la necesidad de predicción, para lo que es necesario conocer cómo es que interactúan todos los elementos que conforman a una comunidad ecológica para saber qué pasaría si se incluyera una especie nueva o se eliminara una especie que ha existido ahí por mucho tiempo. Según Halffter y Moreno, para inicios del siglo existían dos enfoques de estudio, un enfoque mecanicista y otro evolutivo, en ambos casos es necesario describir la estructura y composición con base en el número de individuos por especie existente (Halffter et al., 2005).

Glosario

Comunidad ecológica. Es un conjunto de seres vivos de distintas especies que se desarrollan e interactúan en un mismo lugar o lugar definido por el observador.

Para los ecólogos es difícil estudiar las comunidades completas (todos los individuos de todas las especies presentes en un área definida), por lo que en la mayoría de los casos (si no es que en todos) se estudia una comunidad o un conjunto pequeño de especies y relacionado de alguna forma (todos los artrópodos, todas las plantas, todas las aves, todos los artrópodos del suelo, todos los artrópodos voladores, etc.). Por esta situación, Magurran (2004) analiza y reafirma algunos conceptos para referir

secciones de la comunidad según el alcance de los estudios ecológicos que se realizaban, los cuales tienden a estar enfocados en escalas espaciales según la factibilidad de los estudios.

Magurran (2004) aclara categóricamente el uso de los términos gremios, ensamblaje, ensamble y comunidad, los cuales facilitan la forma de entender las partes que se estudian de una comunidad según su relación **filogenética** (**evolutiva**), **geográfica** o **de recursos** (Ramírez y Gutiérrez-Fonseca, 2016). Los **ensamblajes** refieren a grupos de especies taxonómicamente relacionadas, o sea, se toma en cuenta la relación evolutiva (solo las plantas, solo los caracoles, solo las arañas, solo los insectos, etc.).

Cuando un grupo de especies (sin estar relacionados filogenéticamente) comparten los mismos recursos, se les llama **gremios**, por lo que si estudiamos todas las especies que se alimentan de cultivos de maíz (especies plaga del maíz), se aplica este concepto. Pero si el grupo estudiado se encuentra relacionado por el recurso y su descendencia filogenética, entonces hablamos de **ensambles**, por lo que si estudiamos los escarabajos que son plagas del maíz, estamos estudiando un ensamble (Magurran, 2004; Ramírez y Gutiérrez-Fonseca, 2016).

Es claro que cada especie ocupa un lugar dentro de la dinámica general de la comunidad, por lo que es necesario conocer la importancia que cada una tiene con respecto a TODO el ecosistema en el que se encuentran. Por tal motivo, los ecólogos han desarrollado distintas estrategias de estudio de comunidades, una de las más simples y relevante al momento de analizar distintas condiciones medioambientales, es **la estructura de las comunidades en un tiempo y espacio definido (enfoque mecanicista)**. La estructura va a reflejar dos características principales, **la riqueza de especies y las abundancias de las especies**, por lo que esto nos da una idea de cómo se estructuran las comunidades.

En un estudio de lombrices se hace la comparación del número de especies (riqueza) exóticas o nativas que se encuentran en distintos tipos de ecosistemas (naturales y modificados por el hombre), evidenciando una relación entre el número de especies exóticas generalistas con el grado de disturbio de un ecosistema (Fragoso y Rojas, 2014). Es decir, entre más modificaciones tenga un ecosistema, más especies exóticas generalistas podrán subsistir al ser introducidas, por lo que la cantidad de especies exóticas aumenta en ambientes humanos con mucha actividad, incluidas las comunidades rurales (cultivos de maíz, soja, sorgo, etc.).



Grafica 3. Los datos fueron tomados de la publicación, se obtuvo la suma de especies por cada condición para la mostrar cómo las especies exóticas generalistas tienen mayor presencia en ambientes modificados por el hombre (Fragoso y Rojas, 2014).

En el ejemplo anterior solo se toma en cuenta la **riqueza de especies**, pero también la **abundancia** (**número de individuos por especie**) nos puede dar más información de las características de los ensamblajes. Un estudio de las abundancias de una especie de lagartija en distintos tipos de ecosistemas con diferente grado de modificaciones por el hombre arroja una relación de la abundancia hacia cierto grado de desmonte; aquellas zonas con desmontes intermedios favorecían la abundancia de la lagartija (Macip-Ríos et al., 2013), como lo muestra la siguiente gráfica:



Grafica 4. Los datos fueron tomados de la publicación, para graficar y modificar los descriptores con fin didáctico (Macip-Ríos et al., 2013).

Sin embargo, en el estudio de comunidades ecológicas es común que se trabaje con ensambles o ensamblajes, por lo que las abundancias de más de dos especies nos hacen enfrentar problemas con el análisis de los datos brutos, por lo que se hace uso de herramientas matemáticas para simplificar los datos a valores que representen mejor los cambios estructurales. Es entonces cuando aparecen cálculos como frecuencia relativa, abundancia relativa, dominancia relativa, índice de equidad, índice de diversidad (alfa, beta o gamma), índices de similitud, entre otros (Balsega y Gómez-Rodríguez, 2019; Halffter et al., 2005).

El cálculo de la abundancia relativa ayuda a conocer cuáles especies son **abundantes**, **comunes**, **frecuentes**, **ocasionales** y **raras**, lo cual nos ayuda a reconocer a las **especies generalistas** y las **especialistas**. Hay factores que se deben tener en cuenta al momento de realizar estas afirmaciones, como el método de muestreo con el que se obtienen los datos, pero en general estas características dadas por su representación numérica nos son de mucha utilidad al momento de modelar la estructura de los ecosistemas.

La **abundancia relativa** es un valor que nos dice el porcentaje que representa una especie con respecto a la totalidad de las abundancias de las especies, considerando la totalidad del muestreo. Por ejemplo, en un estudio de escarabajos de un cerro en Puebla mostró las abundancias de la tabla 1, de las cuales se obtiene la abundancia relativa al dividir la abundancia de cada especie entre el total de ejemplares colectados.

$$AR = \frac{x_i}{N_t} \times 100$$

Donde X_i es la abundancia que presenta cada especie y N_t es la suma de todas las abundancias.

Observa el primer ejemplo de la siguiente tabla y calcula las demás abundancias relativas.

Familia Scarabaeidae	Abundancia (x)	Abundancia relativa (AR)
Onthophagus mexicanus	857	(857/1079) = 0.79425 * 100 = 79.4%
Onthophagus durangoensis	150	(150/1079) = 0.13902 * 100 = 13.9%
Onthophagus lecontei	37	
Planolinellus vittatus	16	
Canthon (Canthon) humectus	7	
Phaneus quadridens	7	
Euoniticellus intermedius	2	
Blackburneus saylorea	2	
Agrylinus aztecus	1	
Total	1 079	**100%**

Las abundancias se grafican de la siguiente manera:



Mientras que las abundancias relativas se pueden graficar como se muestra a continuación:



En la gráfica de abundancias relativas podemos notar que hay una especie muy dominante con respecto a las demás, que está representada por el 79.4 % del total de individuos observados durante todo el muestreo anual, con una considerable cantidad de especies raras. Pero, ¿cómo definimos raras y ocasionales? Es simple, pues solo es cuestión de establecer rangos sobre el 100 %. Si tenemos cinco clasificaciones de representatividad, podemos dividirlas de la siguiente manera:

Abundantes o dominantes	Más del 80 %
Comunes	Del 61 al 80 %
Frecuentes	Del 41 al 60 %
Ocasionales	Del 21 al 40 %
Raras	Menos del 21 %

De esta manera podemos empezar a entender la estructura de los **ensambles**, **ensamblajes** o **gremios** que logramos estudiar dentro de las **comunidades ecológicas**.

Índices de biodiversidad como aproximaciones matemáticas

Existen descripciones numéricas llamadas **índices de biodiversidad**, que muestran características de cada sitio con respecto a la distribución de las abundancias y la estructura de especies. Para esto existen varios modelos propuestos, para lo cual solo abordaremos dos de los más utilizado comúnmente para describir la dominancia e igualdad de especies de cada sitio, el índice de Simpson y el índice de Shannon. Ambos índices intentan reflejar la probabilidad "de colectar o no" en un segundo muestreo, "la misma" especie colectada en un primer muestreo.

El índice de Simpson también llamado índice de dominancia se calcula de la siguiente manera:

$$D = \frac{\sum n_i (n_i - 1)}{N(N-1)}$$

Donde:

n_i = la abundancia de cada especie

$N = \sum n_i$ la sumatoria de las abundancias

Con base en el ejemplo anterior, podemos hacer los siguientes cálculos:

Familia Scarabaeidae	**Abundancia (x)**	$n_i(n_i-1)$	$n_i(n_i-1)$
Onthophagus mexicanus	857	**857** × **(857 – 1)**	733 592
Onthophagus durangoensis	150	150 × (150 – 1)	22 350
Onthophagus lecontei	37	37 × (37 – 1)	1332

Planolinellus vittatus	16	16 * (16 – 1)	240
Canthon (Canthon) humectus	7	7 × (7 – 1)	42
Phaneus quadridens	7	7 × (7 – 1)	42
Euoniticellus intermedius	2	2 × (2 – 1)	2
Blackburneus saylorea	2	2 × (2 – 1)	2
Agrylinus aztecus	1	1 × (1 – 1)	0
N =	1 079	Sumatoria =	757 602
D =	$\frac{757\,602}{N(N-1)} =$	$\frac{757\,602}{1\,079(1\,079-1)} =$	$\frac{757\,602}{1\,079(1\,079-1)} = 0.6513$

Los valores del índice de dominancia varían entre 0 y 1, por lo que los valores cercanos a 1 implican grandes diferencias entre las abundancias (fuertes dominancias), mientras que los valores cercanos al cero refieren a una distribución más homogénea. El ejemplo anterior significa que, si tomáramos al azar un ejemplar en un primer muestreo, existe una probabilidad del 65% de encontrar la misma especie si tomáramos un ejemplar al azar en un segundo muestreo.

Por su parte, el índice de Shannon-Weaver refleja lo opuesto al índice de Simpson, ya que refleja la probabilidad de obtener una especie diferente en un segundo muestreo. Su aproximación matemática es la siguiente:

$$H = -\sum p_i * log2_{pi}$$

Donde:

p_i = La **abundancia relativa** (AR) de cada especie.

$\sum_{pi} = 1$

Si usamos el mismo ejemplo anterior, se realizaría lo siguiente:

Familia Scarabaeidae	Abundancia (x)	p_i	$Log_2\ p_i$	$pi * log_2\ p_i$
Onthophagus mexicanus	857	0.79425394	−0.332327755375517	−0.263952629
Onthophagus durangoensis	150	0.13901761	−2.84666045899214	−0.39573593

Onthophagus lecontei	37	0.03429101	−4.86602578385907	−0.16686094
Planolinellus vittatus	16	0.01482854	−6.07547914948802	−0.090090516
Canthon (Canthon) humectus	7	0.00648749	−7.26812422743041	−0.047151872
Phaneus quadridens	7	0.00648749	−7.26812422743041	−0.047151872
Euoniticellus intermedius	2	0.00185357	−9.07547914948802	−0.016822019
Blackburneus saylorea	2	0.00185357	−9.07547914948802	−0.016822019
Agrylinus aztecus	1	0.00092678	−10.075479149488	−0.009337793
N =	1079	1		∑ = −1.053925589
H=1.053925589				

En este caso el valor significa que, si tomáramos al azar un ejemplar en un primer muestreo, existe una probabilidad del 0.1% de encontrar una especie distinta si tomáramos un ejemplar al azar en un segundo muestreo.

Estas son solo dos de las muchas más aproximaciones matemáticas que se han desarrollado durante el siglo pasado (Margalef, 1977). Sin embargo, a finales del siglo e inicios de este se han desarrollado y descrito de forma más eficiente la diversidad, el área a la que Halftter y Moreno llaman "Ciencia de la Biodiversidad" (Halffter et al., 2005).

Diversidad Alfa, Beta y Gamma

En una comunidad **se pueden describir los valores de biodiversidad alfa, beta y gamma** con relativa facilidad, pues las formas más básicas de calcularlos no conllevan procedimientos elaborados, solo hay que tener en cuenta que se necesita conocer la estructura de más de dos sitios del mismo ecosistema. Se reconocen al menos tres diferentes tipos de diversidad alfa, 1) la *diversidad alfa puntual* que representa el total de especies de un sitio determinado, 2) la *diversidad alfa promedio* que representa una media de la riqueza de dos o más sitios cercanos y similares, 3) y la *diversidad alfa acumulada* que representa a la sumatoria de especies de dos o más muestreos (en diferentes tiempos) del mismo sitio. Para la diversidad beta, que representa la diferencia de riqueza de especies entre dos o más sitios, se conocen al menos veintiuno aproximaciones matemáticas hasta inicios del siglo. Finalmente, la diversidad gamma representa el total de especies existentes en todo un ecosistema aparentemente homogéneo (normalmente definidos por la vegetación), el cual normalmente se calcula sumando el total de especies diferentes presentes en un conjunto muestreos de un mismo paisaje (Halffter et al., 2005).

Tomando como referencia la publicación de Balsega y Gómez (2019), podemos calcular la **diversidad alfa** como el promedio de todas las riquezas de especies de cada sitio sometido a muestreo. La

diversidad gamma es el total de especies diferentes que se encontraron en todos los sitios sometidos a muestreo. Mientras que la **diversidad beta** va a referir a un valor entre la relación del total de especies (diversidad gamma) y la diversidad alfa, a la cual muchos ecólogos la llaman el "**recambio de especies entre sitios**" (Figura siguiente). Existen más de 20 diferentes aproximaciones matemáticas que simplifican y describen alguna característica relacionada con la biodiversidad, pero en este curso solo veremos las aproximaciones utilizadas y explicadas por Balsega y Gómez (2019).

Diversidad alfa promedio	Diversidad beta	Diversidad gamma		
$\bar{\alpha} = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_n}{N}$	$\beta_w = \frac{\gamma}{\bar{\alpha}}$	Para dos sitios $\rightarrow \gamma = S = a + \mathbf{b} + \mathbf{c}$ *Para tres sitios $\rightarrow \gamma = S = a + b + \mathbf{c} + \mathbf{d} + \mathbf{e}$ **Para cuatro sitios $\rightarrow \gamma = S = a + b + c + d + \mathbf{e} + \mathbf{f} + \mathbf{g} + \mathbf{h}$		
Donde: α = riqueza de especies		Donde: a = Especies en ambos sitios b = Especies en sitio 1 c = Especies en sitio 2	a = Especies en los tres sitios b = Especies en dos sitios c = Especies en sitio 1 d = Especies en sitio 2 e = Especies en sitio 3	a = Especies en los cuatro sitios b = Especies en tres sitios c = Especies en dos sitios d, f, g y h = Especies en sitio 1, 2, 3 y 4 respectivamente



Figura 2: Imagen tomada de Balsega, A., & Gómez-Rodríguez, C. (2019). Se ejemplifica el cálculo de la diversidad alfa promedio, diversidad beta de Whittaker y diversidad gamma, en un escenario hipotético con tres sitios.

Cuando los valores de beta se encuentran más cercanos a gamma, entonces sabemos que el intercambio de especies es alto, lo que resulta en una gran cantidad de especies diferentes entre sitios (sitios diferentes con respecto en la biodiversidad). Mientras que valores cercanos a 1 representan áreas homogéneas, sitios casi iguales con respecto a su biodiversidad.

Actividad de aprendizaje 10

¿Qué sucede si se modifica alguno o varios de los componentes de un ecosistema? Comunidades

Se quiere describir el efecto que tiene la contaminación de hidrocarburos sobre la estructura de las selvas en el estado de Tabasco (García-López et al., 2006), ya que existe una considerable cantidad de derrames de petróleo crudo alrededor de los pozos petroleros; aunque se tienen las medidas necesarias para contener los derrames, no siempre se logra contener la totalidad de los derrames. Para hacerlo, se contabilizaron los ejemplares de árboles que se encuentran alrededor de 60 pozos de actividad petrolera, seleccionados entre más de 200 pozos por contener las características de concentración de hidrocarburos y de vegetación en suelo que se querían estudiar. Se obtuvo la siguiente tabla:

Especies	SITIO 1		SITIO 2		SITIO 3	
	Contaminación pesada	Abundancia relativa	Contaminación media	Abundancia relativa	Contaminación ligera	Abundancia relativa
Amaranthus hybridus	235		59		18	
Pluchea purpurascens	186		78		16	
Pachira aquatica	0		24		159	
Annona glabra	4		4		16	
Dalbergia browneii	0		2		36	
Pithecellobium lanceolatum	0		0		19	
TOTAL (N)		1		1		1
Índice de dominancia	D =		D =		D =	
Diversidad Alfa		Diversidad Alfa		Diversidad Alfa		
Diversidad Gamma:			Diversidad Beta			

1. Realiza los siguientes cálculos y contestas las preguntas:

   a. Calcula la abundancia relativa de cada situación de contaminación.

   b. Calcula el índice de biodiversidad de Simpson (índice de dominancia) para cada sitio.

   c. Calcula la diversidad alfa, beta y gamma.

d. Realiza una gráfica comparativa de las abundancias.

2. Contesta las siguientes preguntas.

a. ¿Hay algún efecto por la contaminación de hidrocarburos que pueda ser observado en los datos?

b. ¿Qué efecto es el más relevante?

c. ¿Cuántas especies aparentemente se ven afectadas por el grado de contaminación el suelo? ¿Por qué?

3. Realiza un análisis sobre la contaminación por hidrocarburos que generan los talleres mecánicos que conoces. ¿Crees que tienen algún efecto sobre las especies de árboles en la ciudad? ¿Piensas que tienen algún efecto sobre algo más que solo la vegetación? ¿Cómo harías un estudio para probar si hay efectos negativos de los derrames de los talleres mecánicos sobre la vegetación de la ciudad? ¿Cómo probarías la existencia de efectos adversos al medio ambiente? Escribe un análisis y diseña una forma para probar el efecto de esta contaminación.

Proyecto
Intégrate

Biodiversidad de árboles de tu escuela o tu comunidad (actividad práctica)

Con ayuda de tu docente, organicen el salón en cuatro grupos para hacer un muestreo de las especies de árboles y arbustos de tu escuela.

Introducción a la práctica

Los parámetros de las comunidades sirven para describir la estructura de las especies dentro de un ecosistema, gracias a estas técnicas numéricas se pueden conocer de forma bastante general y adecuada los cambios que ocurren en las comunidades a través del tiempo y el espacio, además de ser útiles al momento de evaluar condiciones antrópicas particulares. El índice de Simpson y Shannon son valores probabilísticos opuestos que permiten conocer a bien la dominancia o la equitatividad de abundancias que se encuentra entre las especies, cuando cada ejemplar representa una cantidad finita de materia (biomasa) dentro de un sistema ambiental.

Objetivo

Conocer las especies de árboles presentes en tu plantel u otros sitios de tu comunidad, y con sus abundancias hacer cálculos de índices de biodiversidad alfa, beta y gamma. Además de clasificar las especies según su lugar de origen (invasora, exótica, nativa o endémica) y su estatus de riesgo en México para las especies nativas (amenazadas, en peligro de extinción).

Materiales y métodos

Realiza un conteo de ejemplares por especies de árboles en cuatro sitios diferentes (puede ser tu plantel dividido en cuadrantes, en caso de no poder hacerlo fuera de la escuela), te recomendamos que sea en parques o plazas urbanas (hay que medir el área muestreada en metros cuadrados de cada sitio), aunque también puedes hacerlo en predios familiares. Con cuaderno y lápiz realiza el conteo en una bitácora de campo y toma fotos de cada especie de árbol para que las identifiques con ayuda de la aplicación Naturalista (la puedes descargar de la App store). Para evitar contar los mismos árboles dos veces, puedes marcarlos con agua con cal.

Pasa en limpio los datos obtenidos y, posteriormente, calcular los índices de dominancia (Simpson) y heterogeneidad (Shannon), además de calcular la diversidad alfa promedio, diversidad beta de Whittaker y la diversidad gamma. Para cada especie encontrada e identificada investiga su centro de origen (país de origen) y el estatus de riesgo en México para las especies nativas.

Finalmente, con los resultados obtenidos realiza un reporte científico.

Características del reporte final de práctica

- Título
- Autores
- Resumen/Abstract

- **Introducción:** breve explicación de lo aprendido (con tus palabras, no copies información) sobre los índices de biodiversidad y la diversidad de árboles en las zonas urbanas y rurales, además de la importancia del conocimiento y control de especies invasoras en México .[1]
- **Materiales y métodos:** recursos utilizados, una breve explicación de tu diseño muestral (puedes hacer dibujos y diagramas para complementar el diseño) y descripción de todos lo realizado para cumplir con el objetivo de la práctica.
- **Resultados:** una o varias tablas donde se resuman tus resultados y gráficas que los muestren de forma explicativa. También debe de ir acompañado con un texto explicativo de los resultados y problemáticas abordadas durante el desarrollo del muestreo.
- **Discusión y conclusión:** deben ser breves sobre los resultados obtenidos y los objetivos cumplidos. Recuerda que una discusión expresa una comparativa entre tus resultados y los obtenidos en otros estudios publicados en revistas científicas.
- **Bibliografía utilizada:** Es necesario utilizar bibliografía (revistas científicas o libros digitales), registra los datos bibliográficos.
- **Anexos fotográficos:** nunca olvides tomar todos los datos y evidencias necesarias para probar tus resultados a cualquier persona que lo solicite, ya que de esto se trata el método científico.

Manejo de los datos

Una vez contado todos los ejemplares de cada especie y anotado en las bitácoras, revisen que no haya nombres repetidos y especies anotadas con nombres diferentes entre las bitácoras de cada cuadrante, así como también habrá que anotar los nombres de las especies que no se encontraron en algunos de los cuadrantes, y organicen las abundancias de mayor a menor en una sola tabla donde se concentre todos los datos.

Tabla 1. Propuesta de bitácora de campo.

# de sitio		
Especie	**Abundancia**	**A.R.**

1 Se enlistan algunas publicaciones relacionadas al tema: ***A)*** Bernal Grijalva, María Magdalena, Navarro Navarro, Luis Alan, & Moreno Vázquez, José Luis. (2019). Adopción de especies nativas en la gestión de espacios verdes públicos sostenibles: El caso de Hermosillo. *Frontera norte*, 31. (https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722019000100115); ***B)*** Ortega Rosas, C. I., Martínez Salido, J., Sánchez Duarte, N. E., y Morales Romero, D. (2022). Cobertura y composición arbórea en las áreas verdes de Hermosillo, Sonora: aportaciones al urbanismo sustentable. región y sociedad, 34 (https://www.redalyc.org/journal/102/10270068031/html/); ***C)*** Domínguez Liévano, Alexis. (2023). Diversidad de árboles y arbustos en los parques urbanos de la ciudad de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, México. *Revista Cubana de Ciencias Forestales*, 11(1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2310-34692023000100004&lng=es&tlng=es.

TOTAL		1 = 100 %

Tabla 2. Propuesta de tabla para el vaciado y cálculo de índices de biodiversidad.

Especie	CUAD. 1	CUAD. 2	CUAD. 3	CUAD. 4	ABUNDANCIA TOTAL POR ESPECIE
Especie 1					
Especie 2					
Especie 3					
ABUNDANCIA TOTAL POR CUADRANTE	∑=	∑=	∑=	∑=	∑=
DIVERSIDAD ALFA					DIVERSIDAD ALFA PROMEDIO _____ DIVERSIDAD GAMMA _____ DIVERSIDAD BETA _____

Teniendo los datos completos, calcula los índices de biodiversidad de cuadrante y realiza gráficas de barras o de pastel para expresar de la mejor manera tus resultados.

Funcionamiento y productividad de los ecosistemas

Los ecosistemas funcionan gracias a los elementos que los componen, los elementos que soportan el funcionamiento de todos los ecosistemas y la energía que se absorbe del medido circundante. Estos elementos que constituyen a un ecosistema están representados por características físicas, químicas y biológicas, los cuales pueden englobarse en esas mismas tres partes o componentes funcionales conocidos como **ciclo de nutrientes** (**sustento químico**), **flujo de energía** (**sustento físico**) y **redes tróficas** (**sustento biológico**). Estos componentes funcionales representan y mantienen la **productividad** de los ecosistemas, la cual se cuantifica en forma de **biomasa** constituida por tiempo y espacio definido. Esta biomasa representa la energía tomada del medio físico (luz o calor) por medio de una estructura química (ciclos biogeoquímicos) que viajan a través de sistemas biológicos (redes tróficas).

Flujo de energía (productividad y soporte del sistema)

El flujo inicial de energía se encuentra encabezado por un grupo de organismos biológicos muy particulares, ya que representa la posibilidad de obtención energética del medio fisicoquímico para el mantenimiento de un **sistema biológico en extremo complejo**. En este sentido, todos los **sistemas autotróficos** representan la productividad primaria (ingreso de la energía del medio a los sistemas biológicos) de toda la biomasa del planeta, pues gracias a ellos es factible el flujo de energía entre los sistemas biológicos. Los sistemas autotróficos se pueden dividir si se basa en la manera en la que se obtiene energía, ya que puede aprovecharse energía solar (**fotoautótrofos**) o energía química (**quimioautótrofos**) (Cerón-Rincón & Aristizábal-Gutiérrez, 2012; Piché-Choquette y Constant, 2019; Rodríguez Martínez et al., 2013).

La energía solar se utiliza mediante la fotosíntesis:

Fórmula general:

$$H_2O + E_{solar} + CO_2 \xrightarrow{\text{produce}} C_6H_{12}O_6 + O_2$$

Reacciones dependientes de la luz:

$$H_2O + E_{solar} + P_i + ADP + NAD^+ \xrightarrow{\text{produce}} H^+ + ATP + NADPH + O_2$$

Reacciones independientes de la luz:

$$CO_2 + H_2O + ATP + NADPH \xrightarrow{\text{produce}} C_3H_6O_3$$

Gracias a los organismos fotosintéticos (plantas, algas y bacterias verdes) se realiza un ingreso del 99.9 % de la energía contenida en toda la biomasa del planeta, obteniendo electrones del H_2O (agua), usando al sol como fuente de energía de calor. Sin embargo, además de la fotosíntesis oxigénica, también se presenta la fotosíntesis no oxigénica, cuya fórmula general es la siguiente:

Fórmula general:

$$H_2S + E_{solar} + CO_2 \xrightarrow{\text{produce}} C_6H_{12}O_6 + S_2$$

La **diferencia** de ambos sistemas fotosintéticos radica en la **molécula de la cual se extraen los electrones**, siendo el agua en una (H_2O) y el ácido sulfhídrico en otra (H_2S). Pero también existen otros medios de ingreso de energía, los **quimioautótrofos**. Algunos ejemplos de estos organismos son las bacterias oxidantes del hidrógeno que obtienen energía directamente del hidrógeno, como se muestra en las siguientes fórmulas generales:

$$N_2 + 4H_2 \xrightarrow{produce} 2NH_3 + H_2$$

$$H_2 + O_2 + CO_2 \xrightarrow{produce} C_6H_{12}O_6 + H_2O$$

Igualmente encontramos a las bacterias nitrificantes, importantes para la fijación del nitrógeno inorgánico. Estas bacterias, como el caso de las *Nitrosomonas* y *Nitrobacter*, llevan a cabo reacciones en cadena que se pueden resumir con las siguientes ecuaciones:

$$NH_4^+ + O_2 + CO_2 \xrightarrow{yields} C_6H_{12}O_6 + NO_2^-$$

$$NO_2^+ + O_2 + CO_2 \xrightarrow{yields} C_6H_{12}O_6 + NO_3^-$$

Otro caso bastante sorprendente son las bacterias quimiolitoautótrofas, que usan oxígeno para reducir moléculas para la obtención de energía (*Acidithiobacillus ferrooxidans*), las cuales llevan a cabo rutas metabólicas que se resumen en la siguiente reacción general:

$$Fe^{2+} + O_2 + H^+ \xrightarrow{Produce} Fe^{3+} + H_2O + energía$$

Con todo lo anterior, el ingreso de energía a los sistemas biológicos puede expresarse de forma muy general, de manera que el flujo de energía puede simplificarse con el siguiente modelo matemático:

$$E_{input} = E_w + E_s + E_{output}$$

Donde E_{input} refiere al ingreso de energía total por medios bioquímicos; E_w representa la energía disipada en forma de calor, debido a que ningún organismo es 100 % eficiente fisiológicamente hablando; E_s expresa la energía contenida en todos los procesos metabólicos, la energía utilizada después de la disipación; E_{output} representa la energía transportada fuera del sistema, contenida en el consumo directo de partes de un organismo, productos o subproductos biológicos.

Finalmente, el mantenimiento de los organismos vivos depende de la energía contenida en todo el sistema completo:

$$E_{total\ de\ mantenimiento} = E_{input} + E_w + E_s + E_{output}$$

Finalmente tenemos una relación de productividad de biomasa a partir de la energía lumínica convertida a energía química contenida en la materia (biomasa), donde la productividad de biomasa de los ecosistemas se puede referir de la siguiente manera (Rodríguez Martínez et al., 2013):

$$Producción = \frac{\Delta Biomasa}{\Delta Tiempo} + pérdidas$$

En esta fórmula, la biomasa hace referencia a toda la materia contenida en los sistemas biológicos, la cual es integrada a partir materia en estado inorgánico, un proceso llamado **productividad primaria**. A partir de esta idea se establecen métodos de medición que han permitido el cálculo de la productividad primara neta de cada tipo de ecosistema terrestre o acuático conocido.





Biomasa total (gigatoneladas de peso seco), producción neta total (gigatoneladas año–1) y productividad (índice P/B, año–1) de los diferentes ecosistemas. Los círculos representan la suma total de cada propiedad en los ecosistemas terrestres, acuáticos epicontinentales y marinos (elaborada a partir de datos de [15]) (Rodríguez et al, 2013).

A partir de esta idea, se han realizado estudios con aproximaciones que definen una producción primaria neta aproximada de sistemas terrestres del 50 % frente a el restante 50 % de la producción en cuerpos de agua, principalmente oceánica. Gracias a estos cálculos sabemos que la mayor productividad primaria neta del océano es realizada por el plancton, alrededor del 40 %.

Ciclos de nutrientes (ciclos biogeoquímicos)

El ciclo de nutriente implica la existencia de un motor bioquímico (materia) que permita la posibilidad de ingresar energía a los sistemas biológicos, los cuales fueron establecidos y facilitados por condiciones atmosféricas planetarias y su dinámica con el entorno interestelar desde la formación del sistema solar (Maruyama y Ebisuzaki, 2017). Por ello, se les llaman **ciclos biogeoquímicos**, pues las concentraciones de los elementos necesarios para la vida (C, H, O, N, S, P) dependen de que los ciclos a nivel planetario se encuentren funcionando adecuadamente para la correcta dispersión y mantenimiento de estos elementos clave, lo que permite se integren dentro de las rutas metabólicas de los sistemas biológicos.

> Recordemos todo lo que implica la fotosíntesis y la respiración oxigénica para la formación de ATP y compuestos altamente energéticos (glucosa) y los subsecuentes procesos de síntesis de biomoléculas necesarias para el mantenimiento de la vida (aminoácidos, proteínas y lípidos).

Todas las rutas metabólicas dependen de que cada uno de los elementos que las integran se encuentren disponibles en el ambiente en las proporciones adecuadas. Por ejemplo, para que nosotros respiremos (absorción pulmonar del oxígeno), es necesario que en el aire se encuentre al menos una proporción del 15 % de oxígeno, puesto que, si la concentración está por debajo del 15 %, no se puede hacer un correcto intercambio pulmonar, provocando la asfixia. Entonces la **ley del mínimo de Liebig** y la **ley de tolerancia de Shelford** cobran sentido, pues la permanencia de ciertas rutas metabólicas depende de las adecuadas condiciones ambientales, las cuales se encuentran reguladas por ciclos planetarios complejos. Por lo tanto, la materia se mantiene en los sistemas biológicos de la siguiente manera (Dodds, 2009):

$$\textit{Biomasa total en un organismo} = M_{total} = M_{input} + M_s + M_{output}$$

Los ciclos biogeoquímicos se dividen en dos grandes grupos, los **exógenos**, a los cuales se les encuentra tanto en la geosfera como en la atmósfera, y los **endógenos**, que solo se encuentran en la geosfera (como en el ciclo del fósforo, donde no se conocen compuestos estables gaseosos a temperatura y presión actuales en la tierra).

Finalmente podemos seccionar al planeta para entender estos grandes compartimentos: geosfera, atmósfera, hidrósfera y biosfera. Cada ciclo biogeoquímico se encuentra en diferentes proporciones en cada compartimento planetario, por lo que el nitrógeno se encuentra en su mayoría en forma gaseosa en la atmosfera (alrededor del 78 %), mientras que el oxígeno se encuentra distribuido en su mayoría en la hidrósfera en forma de H_2O, parte en la atmósfera (O_2 y CO_2) y la geosfera (como **óxidos metálicos** y **no metálicos**).

Estos últimos dos grandes compartimentos (geosfera e hidrósfera) son responsables de la mayor movilidad y deposición de elementos en toda la superficie del planeta, por lo que podemos recalcar la importancia de conocer en lo general las grandes corrientes de masa de gases y de agua que se encargan del tránsito de elementos a través del planeta.

Las corrientes marinas y atmosféricas son promovidas por un ingreso de calor aportado por la energía lumínica del sol, por lo que generan un movimiento de convección en las zonas donde la incidencia del sol es directa (en un ángulo de 90°). Tanto en términos físicos como químicos, los átomos y las

moléculas que contienen más calor tienen un radio mayor, lo que resulta en una densidad por unidad de área mayor en comparación con los átomos y moléculas con menor energía. De esta manera, los átomos y moléculas menos densas serán empujadas hacia arriba por los átomos y moléculas con mayor densidad, generando un gradiente de presión (GP) que forma corrientes verticales que interactúan con otra fuerza planetaria, la fuerza Coriolis (FC).

Todo lo anterior resulta en un sistema de corrientes oceánicas y atmosféricas particulares, que se pueden visualizar en las siguientes imágenes.



Circulación profunda de los océanos, donde se puede observar la corriente cálida superficial (amarillo) y la corriente fría profunda (morado). A lo largo de todas las corrientes existen sumideros y afloramientos de aguas que permiten el transporte de sedimentos a través de toda la masa oceánica. El agua sube en los afloramientos (puntos rojos) y se hunde en los círculos "*source*".



Cambios en la zona de convergencia intertropical que ocasionan estaciones lluviosas y secas. Advierta que, como la distancia desde el Ecuador se incrementa, la estación seca es más larga y hay menos lluvias. Estas oscilaciones son el resultado de las diferencias en la altitud del sol entre los equinoccios y los solsticios. Imagen tomada de Smith y Smith (2007).

Ciclo del hidrógeno (Piché-Choquette & Constant, 2019)

El hidrógeno se encuentra distribuido en todo el planeta y es el elemento más abundante del universo. En la evolución de la atmosfera terrestre, se tiene evidencia que los compuestos inicialmente más abundantes fueron el hidrógeno molecular (H_2), el monóxido de carbono (CO) y el metano (CH_4). Por tal motivo, se tiene como hipótesis que el H_2 fue la primera molécula donadora de electrones en las posibles rutas metabólicas primitivas, donde interactuaba con el sulfuro de hierro (FeS) de manera similar a las enzimas actuales. Se encuentran fuentes y sumideros de H_2 en casi todos los ecosistemas (tanto oxigénicos como anóxicos), desde humedales de agua dulce hasta océanos, incluso en tractos digestivos de los animales.

En los sumideros anóxicos encontramos ecosistemas bacterias acetogénicas, metanogénicas, sulfato-reductoras, hierro-óxido reductoras y nitrato-reductoras, mientras que en ambientes oxigénicos encontramos bacterias fijadoras de nitrógeno ($N_2 + 8H^+ + 8e^- \overset{produce}{\rightarrow} 2NH_3 + H_2$) y bacterias oxidantes del hidrógeno (autótrofas capaces de obtener electrones del H_2) (Piché-Choquette y Constant, 2019).

Ciclo del carbono

El carbono, el hidrógeno y el oxígeno se encuentran fuertemente entrelazados en los procesos planetarios de intercambio atómico, puesto que se pueden encontrar mezclados en muchos compuestos importantes, tales como el dióxido y monóxido de carbono (CO_2 y CO), el ácido carbónico (H_2CO_3), los bicarbonatos (HCO_3-), entre otros. Muchos de estos compuestos son importantes en lo que se denomina: **1) bomba oceánica de carbono** y **2) bomba biológica del carbono** (Pelegri et al., 2019), procesos importantes en la regulación planetaria del dióxido de carbono y el arrastre de nutrientes del fondo de los océanos (Rodríguez Martínez et al., 2013). Con tan solo 400 partes por millón en la atmosfera en la actualidad, el dióxido de carbono es el encargado de mantener cálida a la atmósfera. Entender la complejidad del ciclo de este elemento es primordial para definir acciones adecuadas de conservación ambiental, encaminadas en la reducción de las emisiones de carbono (fuentes) y aumentar los proyectos enfocados en aumentar la captura de carbono (sumideros).

Ciclo del oxígeno

El oxígeno es uno de los elementos más abundantes del planeta, con aproximadamente el 30 % del total de la masa terrestre (Allégre et al., 1995; Morgan & Anders, 1980). Por tal motivo, se encuentra formando una gran variedad de compuestos en todas las capas terrestres (compuestos sólidos, gaseosos y líquidos) como el agua (H_2O), el oxígeno molecular (O_2), el ozono (O_3), el dióxido de carbono (CO_2) y toda la familia de carbonatos (CO_3^{2}-), algunos de los compuestos que forma y en los cuales radica su importancia para la evolución de la vida dentro del planeta (Pelegri *et. al*., 2019; Piché-Choquette y Constant, 2019; Rodríguez Martínez et al., 2013). La presencia o ausencia de este elemento marca una gran diferencia en el proceso de establecimiento de comunidades, llegando a manejar las características de la diversidad existente en un sitio.

Ciclo del nitrógeno

El nitrógeno forma parte de las biomoléculas más importantes para la replicación de la vida (ácidos nucleicos) y se considera un elemento limitante para cualquier tipo de vida terrestre. Es claro que todos los organismos dependen de los procesos de fijación del nitrógeno inorgánico atmosférico (N_2), el cual representa aproximadamente el 78 % de los gases que se encuentran en el aire (en la atmosfera).

Existe una gran diversidad de bacterias diazótrofas que utilizan el nitrógeno atmosférico (N_2) en sus rutas metabólicas, que posteriormente liberan compuestos nitrogenados en estado orgánico (NOx, NHx y N orgánico) y compuestos disponibles para que sea absorbido por los demás organismos (Cerón-Rincón y Aristizábal-Gutiérrez, 2012; García-Velázquez y Gallardo, 2017).



Relaciones entre el ciclo del nitrógeno y los compartimentos orgánicos y minerales. Los cuadros negros son las entradas al sistema, los grises las fracciones disponibles; sin recuadro procesos y factores que tienen influencia en la disponibilidad de nitrógeno (MO: Materia orgánica). Imagen obtenida de Cerón-Rincón y Aristizábal-Gutiérrez (2012).

Ciclo del fosforo

Para este elemento, considerado como de ciclo endógeno, no se conocen compuestos estables en estado gaseoso. Por tal motivo, la disponibilidad depende de los yacimientos liberados por procesos geológicos largos, algunos de los cuales podemos incluir a la actividad tectónica, la erosión hídrica y eólica, las corrientes oceánicas superficiales y profundas, además de procesos biológicos definidos por las redes tróficas (Cerón-Rincón y Aristizábal-Gutiérrez, 2012).



Relaciones entre el ciclo del fósforo y los compartimentos orgánicos y minerales. Los cuadros negros son las entradas al sistema, los grises las fracciones disponibles, sin color las fracciones minerales; sin recuadro procesos y factores que tienen influencia en la disponibilidad de fósforo (MO: Materia orgánica). Imagen obtenida de Cerón-Rincón y Aristizábal-Gutiérrez (2012).

Ciclo del azufre

Así como los anteriores ciclos mencionados, el sulfuro tiene una representación geobiológica bastante importante. Con estados de oxidación -2, +2, +4 y +6, la dinámica del azufre es bastante diversa en los procesos a escala planetaria, en rutas metabólicas y en los registros geológicos, además de interactuar con los ciclos del C, O, N y Fe presente en la hidrosfera. El ciclo biológico del azufre representa una gran variedad de compuestos (SO_4^{2-}; SO_3^{2-}; $S_4O_6^{2-}$; $S_2O_3^{2-}$; SO) que se encuentran en diferentes etapas del metabolismo microbiano conocido (bacterias como

Para curiosos

El planeta tierra se divide para un mejor estudio en diferentes sistemas o secciones, ya que existen procesos y sistemas planetarios que ocurren en algunos casos limitados por características de composición, presión y temperatura. Por tal motivo, el planeta se divide en: hidrosfera (el agua), biosfera (la vida), litosfera (capas geológicas) y atmosfera (aire), inclusive en algunas áreas del conocimiento reconocen también la antroposfera (humano).

las “sulfato-reductoras” y “fotosintéticas-anoxigénicas-oxidantes del sulfuro”), representado por un juego de reacciones metabólicas bacterianas (Canfield & Farquhar, 2012).

Formula química de la reacción	Nombre de la reacción
$SO_4^{2-} + 2CH_2O \rightarrow H_2S + 2HCO_3^-$	Reducción del sulfato.
$SO_3^{2-} + 3CH_2O + H \rightarrow 2H_2S + 3HCO_3^-$	Reducción del sulfito.
$4S° + 4H_2O \rightarrow 3H_2S + SO_4^{2-} + 2H^+$	Desproporción de azufre.
$4SO_3^{2-} + 2H+ \rightarrow H_2S + 3SO_4^{2-}$	Desproporción de sulfito.
$S_2O_3^{2-} + H_2O \rightarrow H2S + SO_4^{2-}$	Desproporción del tiosulfato.
$H_2S + CO_2 +$ ***Energía lumínica (E.L.)*** $\rightarrow CH_2O + H_2O + 2S°$	Oxidación foto trófica de sulfuro a azufre (fotosíntesis no oxigénica)
$2S° + 3CO_2 + 5H_2O +$ ***E.L.*** $\rightarrow 3CH_2O + 2SO_4^{2-} + 4H^+$	Oxidación foto trófica de azufre a sulfato (fotosíntesis no oxigénica)
Tomado y ajustado de (Canfield & Farquhar, 2012).	

Redes ecológicas (sistemas biológicos complejos)

En las redes ecológicas figuran las conexiones que se encuentran representadas entre unidades biológicas funcionales (organismos y especies), las cuales casi nunca son lineales. Estas redes tienden a ser complejas y difícilmente pueden ser representadas en diagramas que simplifiquen todos los procesos ecológicos que se encuentran involucrados en un ecosistema. Muchos de las explicaciones funcionales se basan en relaciones de consumo (depredador-presa). Sin embargo, hay muchas más formas de vincularse.

Tipo de relación		Efecto de la relación	EJEMPLO	Condición
Relación depredador-presa	→	+ | -	Puma | Venado	NO OBLIGADAS
elación mutualista	→	+ | +	Ganado | Picabuey	NO OBLIGADAS
Relación parasítica	→	+ | -	Pulgas | Perros	OBLIGADAS
Relación simbiótica	→	+ | +	Polillas | semillas	OBLIGADAS

No obstante, existen aproximaciones matemáticas que intentan ejemplificar la productividad de los sistemas en función de los procesos generales más importantes. De esta manera, las redes tróficas se miden en número de conexiones existentes dentro de un ecosistema definido; por ende, entre más especies existan en un área definida, mayor será la posibilidad de existir conexiones tróficas complejas (Ramírez-Hernández et al., 2019; Rico-Gray et al., 2012; Rodríguez Martínez et al., 2013).

Imaginemos un sistema hipotético de 14 organismos y establezcamos relaciones a cada una de las especies: consumo, mutualistas, parasíticas o simbióticas. Con esto, podremos conocer la importancia de eliminar una especie del sistema y qué efectos tendría para todas las demás.



En este sistema de conexiones hipotéticas tenemos claro que las flechas unidireccionales son de consumo (depredadores en la parte trasera de la flecha) y las flechas bidireccionales son relaciones simbióticas o parasíticas. En este ejemplo de redes ecológicas podríamos predecir qué pasa si una de las especies es eliminada en función del número de relaciones y de la importancia de esta. Por ejemplo, si la especie 8 se eliminara, la especie 2 se vería afectada directamente por depender de su consumo, mientras que la relación simbiótica o parasítica entre las especies 1 y 2 también sería de importancia para la existencia de la especie 1 si la 8 desaparece. En otro lado de la red, las especies 10 y 11 afectarían individualmente la existencia de las especies 3, 4 y 5. Es claro que las redes ecológicas tienen significancias distintas en función del número de especies y de conexiones posibles por especie dentro de la red.

En este mismo discernimiento, las redes tróficas se caracterizan por cinco propiedades **tipológicas** definidas de la siguiente manera (Rodríguez Martínez et al., 2013):

1. **S** = Número de especies
2. **L** = Número de conexiones
3. **L/S** = Conexiones por especie o densidad de conexiones
4. **C** = Conectancia o número observado de conexiones
5. **D** = Distancia característica o número mínimo de conexiones
6. **K** = Coeficiente de agregación

Las **proporciones de las abundancias** (**abundancias relativas**) de las especies representan el centro de la dinámica en una red ecológica, y esta cambia poco en sistemas estables y poco variantes. Sin embargo, todas las abundancias se encuentran manejadas por una serie de factores ambientales, tanto físicos como biológicos, que definirán la estructura e interacción de la biodiversidad en cada tiempo en el cual se observa. Los patrones en las redes tróficas son diferentes para redes mutualistas, redes parasíticas o redes de competencia, pues la dirección de cada red definirá el tipo de cambio estructural que se observaría si una o varias especies cambian sus abundancias.

Por su parte, cada interacción establecida en las redes tróficas tiene diferente intensidad con respecto a las demás, lo que significa que las afectaciones existentes al momento de retirar una especie variarán según el grado de intensidad entre las especies y el número de especies conectadas.

Uno de los ejemplos más adecuados para entender la manera en que interactúan las redes ecológicas es el caso de las abejas europeas africanizadas (*Apis mellifera*), una especie introducida por los españoles en la época de la Conquista. Las abejas europeas son altamente competitivas (encabezan la jerarquía de poder sobre el recurso) y desplazan a las especies nativas cuando el recurso floral es limitado. De esta manera, las abejas introducidas modifican las relaciones de polinización existente por las abejas nativas al momento del desplazamiento, cambiando las características de dispersión de especies arbóreas de la región (Agüero et al., 2018; Garza-González y Canto, 2020).

Lamentablemente, la falta de información genera confusión en la población humana y suelen realizarse acciones que promueven la ampliación de distribución y el crecimiento de especies introducidas e invasoras, generando pérdida de la biodiversidad y declive de las especies nativas en todo el mundo (Heiblum-Robles, 2019). Esto es un problema grave, ya que muchos sistemas educativos no tienen la capacidad de corregir la mala información de la sociedad, lo que resulta en acciones ambientalistas y ecologistas mal dirigidas.

Actividad de aprendizaje 11

Especies clave

1. Escanea el siguiente código y observa el video *Algunos animales son más iguales que otros: especies clave y cascadas tróficas*, después realiza en tu cuaderno un organizador gráfico.

Aprendizajes clave

a. Las especies clave tienen efectos directos e indirectos sobre la abundancia y número de otras especies en un ecosistema que son desproporcionalmente mayores en relación con su propia abundancia en ese ecosistema.
b. No todas las especies en un ecosistema tienen interacciones fuertes. La remoción de algunas especies tiene poco o ningún efecto sobre otras especies.
c. Muchas especies clave son superdepredadores: depredadores en el nivel más alto de la red alimentaria que no son depredados por otros organismos.
d. La remoción o adición de un superdepredador que, además, es solo una especie clave, provoca cambios en el tipo y número de especies, así como en sus tamaños poblacionales a diferentes niveles tróficos, afectando toda la red ecológica.
e. Las especies clave son fundamentales para mantener la diversidad y estabilidad de un ecosistema.

2. En términos ecológicos, las especies se clasifican según su origen e importancia dentro del ecosistema. Para mejorar tu comprensión sobre los temas expuestos, investiga y escribe cada uno de los siguientes conceptos:

a. Especies raras:

b. Especies ingenieras:

c. Especies clave:

d. Especies sombrilla:

e. Especies nativas:

f. Especies endémicas:

g. Especies exóticas:

h. Especies naturalizadas:

i. Especies invasoras:

3. Responde el cuestionario:

a. ¿Qué pasó cuando el investigador Robert Pain eliminó a la estrella de mar del sistema acuático que estudió?

b. ¿Qué efecto tenían las nutrias sobre las poblaciones de erizos?

c. ¿Qué pasaba con las algas cuando las nutrias desaparecían?

_____

_____

_____

d. El problema sobre la mortalidad de abejas es de importancia mundial. ¿Cómo podrían estar afectando las abejas europeas a las poblaciones de especies nativas y qué relación tiene con los programas de conservación de abejas? Escanea los siguientes códigos para poder leer dos artículos que te ayudarán a responder de forma fundamentada:

a. Impactos de la abeja melífera sobre plantas y abejas silvestres en hábitats naturales. *Ecosistemas*, 27(2), 60-69.

b. Abejas: insectos polinizadores. *INCyTU* (31; NOTA).

MOMENTO STEAM

Estabilidad dentro de un ecosistema cerrado (práctica de laboratorio)

(Práctica tomada del Portal Académico CCH)

Escanea el siguiente código para ver el video *Cómo hacer un ecosistema acuático*, después realiza la práctica con ayuda de tu docente y, por último, elabora tu reporte de práctica.

Objetivo

Que el alumno desarrolle un ecosistema acuático artificial estable donde pueda observar la interacción que existe entre distintos organismos y perciba la importancia de un soporte fisicoquímico que permita el flujo de energía y el ciclo de nutrientes a través de las diferentes redes ecológicas. Con esta práctica el alumno podrá definir un ecosistema, identificando los componentes bióticos y abióticos.

Materiales

1. Un recipiente de vidrio grueso y transparente con capacidad mínima de dos litros y una altura de 25 y 30 cm de boca ancha lisa
2. Un vaso de precipitado de 1L y uno de 250 mL
3. Un agitador de vidrio largo
4. Una caja de Petri
5. Un gotero nuevo de vidrio
6. Pinza de disección
7. Microscopios (estereoscópico y bacteriológico)
8. Porta y cubreobjetos
9. Tira para medir pH
10. Termómetro de pecera
11. Papel filtro
12. Una cartulina blanca
13. Cinta adhesiva transparente ancha
14. Rollo de envoltura de plástico, emplaye o plástico para embalaje
15. Franela, jabón y escobillón
16. Colador de plástico
17. Cúter con navaja nueva
18. Tijeras
19. Cuchara sopera
20. Regla

Sustratos y organismos

- Arena de río natural sin color
- Graba de río sin color, previamente lavada
- Agua embotellada
- Agua de lago, estanque o florero
- Planta Elodea
- Pulga de agua
- Artemia
- Tres o cuatro caracoles de agua dulce
- Algunos peces pequeños (de preferencia gambas neocaridinas)

Procedimiento

1. Lavar el recipiente de vidrio y secarlo perfectamente. Después colocar dentro la arena y la grava con ayuda de la cartulina en forma de embudo, con el fin de formar el sustrato del ecosistema que deberá de tener entre 4 y 6 cm de altura.

2. Con el vaso de precipitado, verter el agua embotellada en el recipiente, cuidando con no levantar el sustrato para no ensuciar las paredes de este. Dejar 4 o 5 cm antes del borde superior.
3. Colocar las ramas de *Elodea*, enterrándolas al sustrato con ayuda del agitador.
4. Colocar seis u ocho goteros llenos del agua del estanque, revisando previamente en el microscopio bacteriológico que el agua contenga microorganismos.
5. Revisar las pulgas de agua al microscopio estereoscópico para verificar que se encuentren vivas, colocando de seis a ocho goteros llenos en el recipiente de vidrio.
6. Colocar 10 o 12 organismos de *Artemia*, revisando previamente en el microscopio.
7. Ingresar cinco organismos de los caracoles de río con la ayuda de las pinzas y sin tocar el agua.
8. Finalmente, agregar los peces.
9. Una vez ingresados los organismos, se verifica el pH del ecosistema acuático.
10. Con el rollo de envoltura de plástico, sellar el ecosistema cuidadosamente, fijando la envoltura con la cinta adhesiva.
11. Adherir el termómetro por la parte externa.
12. El ecosistema se mantendrá sellado a temperatura ambiente, evitando que le del sol directamente.

Seguimiento

- Se deberá de llevar un registro diario de los cambios que se observan en el ecosistema acuático.
- Se deberá registrar, en lo general, el color del agua, los cambios en el sustrato, el tiempo de supervivencia de los organismos, entre otros.

Resultados

Se entregará un reporte escrito sobre los observado en el ecosistema acuático, siguiendo el formato anexo.

Tabla propuesta para el seguimiento:

	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 8	Día 9
Sp 1									
Sp 2									
Sp 3									
Sp 4									
Sp “n”									

Anota las observaciones relevantes.

Representación general de los sistemas biológicos (ecorregiones y biomas)

Todas las características funcionales de los ecosistemas terminan por representar generalidades espaciales que podemos percibir de formas espléndidas, en paisajes increíbles y altamente complejos. Por tal motivo, muchos ecólogos que trabajan a escalas grandes se enfocan en delimitar y describir regiones que ecológicamente presentan similitudes biológicas y ambientales, aquellas que normalmente conocemos como **biomas** y **ecorregiones**. No abordaremos mucho sobre cómo delimitarlas conceptualmente, pero veremos la distribución y delimitación conocida con una aplicación de *HHMI Biointeractive* en español, la cual puedes encontrar escaneando el siguiente código:

Actividad de aprendizaje 12

Biomas y ecorregiones

Para trabajar con esta información, entra a la liga de la aplicación de *HHMI Biointeractive* y busca tu localidad en la barra de búsqueda, copia en tu cuaderno la información del bioma que te rodea, la descripción del clima (climatograma) y las características de la biodiversidad (especies de anfibios, reptiles y mamíferos).

TRANSVERSALIDAD

El problema de escala en ecología

Desde los años de 1980, el concepto **escala** fue de relevancia en todas las ramas de la ecología, puesto que todos los fenómenos naturales ocurren a diferentes magnitudes y esto se expresa en escalas temporales o espaciales. Si nos basamos en la Real Academia Española, escala es una graduación empleada en diversos instrumentos para medir una magnitud, por lo que se puede representar en mapas, planos, diseños, etc., ajustados siempre a una escala diferente a la real, para poder representarlos en forma de modelo.

Sin embargo, la escala tiene muchas definiciones técnicas en diferentes áreas, y aún dentro de las mismas áreas de ecología ha tenido diferentes formas de uso. Usualmente la escala se expresa en ecología terrestre como un equivalente a niveles de organización ecológica (organismo → población → comunidad → ecosistema → ecorregión → bioma → biosfera), donde un nivel siempre contiene al nivel inferior, en forma de jerarquía organizacional (Schneider, 2001).

A pesar del uso dado al concepto de escala en el párrafo anterior, muchos estudios multiescalares en ecología han notado el problema cuando se trabaja con procesos y mecanismos ecológicos, puesto que muchos de ellos no se encuentran delimitados a una escala. Lo anterior complica la situación, pues hay procesos y mecanismos como la **depredación de especies**, donde la escala espacial depende la masa corporal de las especies en cuestión, ya que **no es la misma escala espacial en la que ocurre una relación depredador-presa entre una araña y una mosca (m^2) que entre un león y una gacela (km^2)**. Así como no es lo mismo una escala temporal entre la demografía de una población de elefantes a una población de insectos, puesto que un **ciclo de reproducción de elefantes ocurre durante años**, mientras que el **ciclo de reproducción de una bacteria transcurre en horas**.



Ambos extremos en los patrones demográficos se conocieron inicialmente como la teoría de estrategias r y k, donde las abundancias que varían enormemente en escalas de tiempos cortos se aplican para grupos como las bacterias, metras que la poca variabilidad demográfica en elefantes ocurre en escalas de tiempo larga. Procesos demográficos que ocurren en distintas escalas temporales, teoría finalmente llamada estrategias de vida de las especies o "Species life-history strategies" (Albaladejo-Robles et al., 2022; Reznick et al., 2002).

Esto implica que, para conocer el impacto de las actividades humanas, se tienen que estudiar los procesos ambientales a diferentes escalas para saber a qué escala tienen mayor efecto las perturbaciones de tipo antrópico. Un ejemplo bastante explicativo son los residuos plásticos que generamos en las ciudades, puesto que, si miramos alrededor de una ciudad, el impacto que podremos ver solo es una parte de los procesos ambientales a escalas mayores (procesos existentes en la escala medida). Pero si ampliamos la escala a nivel mundial e incluyes a todas las fuentes posibles de residuos plásticos, veremos el impacto de la suma de residuos de todos los centros urbanos del mundo. Ahora sabremos que tenemos que tomar muestras más allá de las zonas urbanas, lo que nos permitirá conocer los sitios donde convergen todos los residuos y explicado por procesos de corrientes marinas a escala planetaria (Ritchie & Roser, 2018).



EVALUACIÓN

Actividad 1. Dinámica de poblaciones.

En la sierra de Xilitla, específicamente en la comunidad de La trinidad, existe una población de roedores endémicos que habita una superficie de 50 km², una de las meta-poblaciones estudiada tiene una distribución limitada por proyecciones montañosas extremadamente verticales que rodean un valle poco accesible. **Durante el primer año de muestreo** de la meta-población estudiada se pudo percatar de la existencia de 2 324 individuos, mientras que durante los muestreos periódicos mensuales se pudo percatar de una mortalidad anual de 125 individuos. Al finalizar el año se observó la existencia de **17 machos adultos que no pertenecían a la meta-población estudiada** (lo cual se verificó gracias a la tonalidad del pelo presentada por la meta-población estudiada, y verificada con muestras de ADN tomadas de los ejemplares en cuestión). Al terminar el año, el número total de la meta-población ascendía a 2 598 ejemplares.

El estudio se prolongó por cinco años y se observó un aumento anual constante en **la mortalidad** de la meta-población de 13 individuos con respecto al primer año. Un **ingreso masivo de machos** de otra meta-población de 98 ejemplares, el segundo año solamente, no se observó más ingresos en los siguientes años. La relación de sexos se mantuvo bastante estable todos los años, de 1 hembra por cada 2 machos y la natalidad media anual se calculó en un 5 % con respecto a la total anual**, a partir del segundo año**. Al finalizar cada año se contabilizaron todos los ejemplares, por lo que se observaron **2 598 ejemplares al inicio del segundo año; 2 345 el tercer año; 1 958 ejemplares el cuarto año y 1 665 ejemplares el quinto año.** Cabe aclarar que no se encontró evidencia de la existencia de depredadores dentro del valle.

Calcula los valores de las características denso-dependientes, grafica los datos y contesta el cuestionario.

Meta-población inicial censada 2,324	AÑO 1 N_0	AÑO 2 N_1	AÑO 3 N_2	AÑO 4 N_3	AÑO 5 N_4	AÑO 6 N_5	Media	Tasa
Si … $N_{i+1} = N_i + Eq_{Ni}$ Entonces Eq_{Ni} = ____ – ____	2,324					¿?		
Natalidad (n)	¿?					¿?		
Mortalidad (m)						¿?		
Emigración (E)	¿?	¿?	¿?	¿?	¿?	¿?		
Inmigración (I)						¿?		

Eq. = (n – m) + (I – E) =	¿?	¿?	¿?	¿?	¿?	¿?		
TC=Eq/N								

Basándote en los cálculos obtenidos:

1. ¿Qué explicación se pude dar a la caída en el número de ejemplares en la meta-población?

   _____
   _____
   _____

2. Si la relación de sexos se mantuvo constante, ¿cuál es el número de crías paridas por cada hembra cada año?

   _____
   _____
   _____

3. Si el grupo de individuos no se encontraba presionado por depredación, ¿qué más podría afectar a la meta-población?

   _____
   _____
   _____

Actividad 2. Biodiversidad

Se realizó un estudio de la biodiversidad de escarabajos en varios sitios con diferente tiempo de abandono por actividades humanas, el primer sitio tenía un año de abandono, el segundo 5 años y el tercero 50 años. Los datos se capturaron en la tabla colocada más abajo.

1. Realiza los siguientes cálculos y contestas las preguntas:

   a. Calcula la abundancia relativa de cada situación.

b. Calcula el índice de biodiversidad de Simpson (índice de dominancia) para cada sitio.

c. Calcula las diversidades alfa, beta y gamma.

d. Realiza una gráfica comparativa de las abundancias.

	SITIO 1		SITIO 2		SITIO 3	
	1 año	Abundancia relativa	(5 años)	Abundancia relativa	(50 años)	Abundancia relativa
C. cf. Cupreum	298		199		72	
S. sexpilotus	27		354		123	
D. belus,	26		61		89	
D. mamillatus,	39		151		69	

Uroxys sp.,	44		96		92	
C. luteicollis	9		161		49	
C. aequinoctiali	0		0		83	
Coprophanaeus jasius	0		3		7	
Canthidium euchalceum	0		5		4	
Oxysternon silenus	0		0		13	
TOTAL (N)		1		1		1
ÍNDICE DE DOMINANCIA	D=		D=		D=	
DIVERSIDAD ALFA		**DIVERSIDAD ALFA**		**DIVERSIDAD ALFA**		
1		2		3		
DIVERSIDAD GAMMA:				**DIVERSIDAD GAMMA:**		

2. Contesta las siguientes preguntas.

   a. ¿Hay alguna consecuencia por los efectos del disturbio y abandono que pueda ser observado en los datos? Explica tu respuesta.

   b. ¿Qué efecto es el más relevante?

   c. ¿Cuántas especies aparentemente se vieron afectadas por las actividades de pastoreo y agricultura? ¿Por qué crees que pasó esto?

REFERENCIAS

Agüero, J. I., Rollin, O., Torretta, J. P., Aizen, M. A., Requier, F., & Garibaldi, L. A. (2018). *Impactos de la abeja melífera sobre plantas y abejas silvestres en hábitats naturales*. Ecosistemas, 27(2), 60-69. Asociación Española de Ecología Terrestre. https://doi.org/10.7818/ECOS.1365

Allégre, C. J., Poirier, J.-P., Humler, E., & Hofmann, A. W. (1995). *The chemical composition of the Earth. Earth and Planetary Science Letters*, 134, 515-526.

Armenteras, D., González, T. M., Vergara, L. K., Luque, F. J., Rodríguez, N., & Bonilla, M. A. (2016). Revisión del concepto de ecosistema como "unidad de la naturaleza" 80 años después de su formulación. Ecosistemas, 25(1), 83-89. Asociación Española de Ecología Terrestre. https://doi.org/10.7818/ECOS.2016.25-1.12

Balsega, A., & Gómez-Rodríguez, C. (2019). *Diversidad alfa, beta y gamma: ¿cómo medimos diferencias entre comunidades biológicas?* Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), 26, 39-45.

Canfield, D. E., & Farquhar, J. (2012). The Global Sulfur Cycle. In A. H. Knoll, D. E. Canfield, & K. O. Konhauser (Eds.), *Fundamentals of Geobiology* (1st ed., pp. 49–64). Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/10.1002/9781118280874.ch5

Cerón-Rincón, L. E., & Aristizábal-Gutiérrez, F. A. (2012). Dinámica del ciclo del nitrógeno y fósforo en suelos. Revista Colombiana de Biotecnología, XIV(1), 285-295.

Córdova-Tapia, F., & Zambrano, L. (2015). La diversidad funcional en la ecología de comunidades. Ecosistemas, 24(3), 78-87. https://doi.org/10.7818/ecos.2015.24-3.10

Dodds, W. K. (2009). Laws, Theories, and Patterns in Ecology (1st ed.). University of California Press. http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1pn96n

Fragoso, C., & Rojas, P. (2014). Biodiversidad de lombrices de tierra (Annelida: Oligochaeta: Crassiclitellata) en México. Revista Mexicana de Biodiversidad, 85(SUPPL.), 197-207. https://doi.org/10.7550/rmb.33581

Galiana, A. (2001). La Ecología Poblacional Humana como Primera Ecología. Revista de La Sociedad Española de Historia de Las Ciencias y de Las Técnicas, 24(49), 119-130. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=460316

García-Velázquez, L., & Gallardo, A. (2017). El ciclo global del nitrógeno. Una visión para el ecólogo terrestre. In Ecosistemas, 26(1), 4-6). Asociación Española de Ecología Terrestre. https://doi.org/10.7818/ECOS.2017.26-1.02

Garza-González, D. A., & Canto, A. (2020). Abejas nativas y abejas africanizadas: ¿amigas o enemigas? Desde El Herbario CICY, 12, 58-63.

Halffter, G., Soberón, J., Koleff, P., & Melic, A. (2005). Sobre Diversidad Biológica: el Significado de las Diversidades Alfa, Beta y Gamma. In G. Halffter, J. Soberón, P. Koleff, & A. Melic (Eds.), SOCIEDAD ENTOMOLÓGICA ARAGONESA.

Heiblum-Robles, A. (2019). Abejas: insectos polinizadores. In INCyTU (No. 31; NOTA). www.foroconsultivo.org.mx

Khan, N. T. (2018). Concept of Population Ecology. International Journal of Environmental Sciences and Natural Resources, 12(1), 11-13. https://doi.org/10.19080/IJESNR.2018.12.555828

Maass, J. M., & Martínez-Yrízar, A. (1990). Los ecosistemas: definición, origen e importancia del concepto. CIENCIAS, Especial(4), 10-20.

Maciel-Mata, C. A., Manríquez-Morán, N., Octavio-Aguilar, P., & Sánchez-Rojas, G. (2015). El área de distribución de las especies: revisión del concepto. Acta Universitaria, 25(2), 3-19. https://doi.org/10.15174/au.2015.690

Macip-Ríos, R., López-Alcaide, S., & Muñoz-Alonso, A. (2013). Abundancia, uso de hábitat, microhábitat y hora de actividad de Ameiva undulata (Squamata: Teidae) en un paisaje fragmentado del Soconusco chiapaneco. Revista Mexicana de Biodiversidad, 84(2), 622-629. https://doi.org/10.7550/rmb.31752

Magurran, A. E. (2004). Measuring Biological Diversity. In Environmental Science & Technology. 1st ed. 27(1). Blackwell Science Ltd. https://doi.org/10.1021/es00038a601

Margalef, R. (1977). *Ecología* (2nd ed.). Ediciones Omega.

Maruyama, S., & Ebisuzaki, T. (2017). Origin of the Earth: A proposal of new model called ABEL. Geoscience Frontiers, 8, 253-274. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2016.10.005

Morgan, J. W., & Anders, E. (1980). Chemical composition of Earth, Venus, and Mercury. The Proceedings of the National Academy of Sciences, 77(12), 6973-6977. https://www.pnas.org

Pelegri, J. P., Marotta, H., Navarrete, S. A., & Pascual, A. (2019). El papel regulador de los océanos en el sistema terrestre. In P. A. Marquet, F. Valladares, S. Magro, A. Gaxiola, & A. Enrich-Prast (Eds.), Cambio Global: Una mirada desde Iberoamérica (pp. 129-152).

Piché-Choquette, S., & Constant, P. (2019). Molecular Hydrogen, a Neglected Key Driver of Soil Biogeochemical Processes. https://doi.org/10

Ramírez, A., & Gutiérrez-Fonseca, P. E. (2016). Sobre ensambles y ensamblajes ecológicos - Respuesta a Monge-Nájera. Revista de Biologia Tropical, 64(2), 817-819. https://doi.org/10.15517/rbt.v64i2.21232

Ramírez-Hernández, A., Martínez-Falcón, A. P., Micó, E., Almendarez, S., Reyes-Castillo, P., & Escobar, F. (2019). Diversity and deadwood-based interaction networks of saproxylic beetles in remnants of riparian cloud forest. PLoS ONE, 14(4). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214920

Rico-Gray, V., Díaz-Castelazo, C., Ramírez-Hernández, A., Guimarães, P. R., & Holland, J. N. (2012). Abiotic factors shape temporal variation in the structure of an ant-plant network. Arthropod-Plant Interactions, 6(2), 289–295. https://doi.org/10.1007/s11829-011-9170-3

Rodríguez Martínez, J., Blanco Martín, J. M., & Rodríguez Martínez, V. (2013). Ecología (3a ed.). EDICIONES PIRÁMIDE.

Smith, T. M., y Smith, R. L. (2007). Ecología (Sexta). Pearson. Addison Wesley.

Van Nouhuys, S. (2016). Metapopulation Ecology. ELS, 2009, 1-9. https://doi.org/10.1002/9780470015902.a0021905.pub2

Yuttham, K., Jaroensutasinee, M., & Jaroensutasinee, K. (2003). Metapopulation and its applications in conservation biology. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 25(February 2003), 395-409.

UNIDAD 3

Servicios ecosistémicos y huella ecológica

Eje

Relaciona los servicios ambientales, el impacto que genera la actividad humana y mecanismos para la conservación de los ecosistemas.

Componente

Ecosistemas y actividad humana.

Contenido central

Aprovechamiento racional de fuentes de energía en actividades cotidianas.

Contenido específico

- **¿Qué porcentaje de las viviendas de México tiene energía eléctrica?**
- **¿Qué países no tienen acceso a la energía eléctrica?**
- **¿Cuál es el impacto ecológico de las fuentes tradicionales de energía?**
- **¿Qué ventajas y desventajas tienen las energías renovables?**
- **¿Cuáles tecnologías de energía renovable podrías implementar en tu casa?**
- **Impacto ambiental de los combustibles fósiles.**
- **Fuentes alternas de energía.**
- **Ventajas y desventajas de la energía hidráulica, geotérmica, eólica, solar, bioenergía.**

Aprendizaje esperado

- **Diseña y argumenta la implementación de energías renovables en el hogar.**
- **Diferencia las fuentes de energía que utiliza para el desarrollo de sus actividades cotidianas.**
- **Explica los impactos medioambientales que generan los procesos de producción de energía.**
- **Reconoce las ventajas y desventajas de las energías renovables.**
- **Identifica las actividades cotidianas en las cuales podría utilizar energía renovable.**

Productos esperados

Diseño de una casa que funciona sólo con fuentes alternas de energía.

Presentación de la unidad

En esta unidad analizaremos los factores ambientales del lugar donde vivimos. Hablaremos de los ecosistemas y sus componentes con sus características. Un ecosistema es una comunidad que incluye organismos vivos, como plantas, animales y microorganismos, y elementos no vivos, como el suelo, el agua y el aire; y pueden variar en tamaño desde un pequeño charco hasta el planeta entero.

Por lo tanto, los factores ambientales del lugar donde vives pueden incluir: el clima, el suelo, la vegetación, la topografía, la disponibilidad de agua, la presencia de contaminación y la proximidad a recursos naturales, esto hace necesario identificar el funcionamiento y la productividad de los ecosistemas.

También incluye las relaciones e interacciones entre estos componentes, como la alimentación, la reproducción y la competencia. En esta unidad analizaremos los componentes de un ecosistema, sus poblaciones y comunidades, así como las consecuencias en el ambiente si algún componente cambia.

Evaluación Diagnóstica

Algunas de las ramas de la Ecología, tienen una mayor relación con el cuidado del medio ambiente, aunque no pueden tomarse como actividades ambientalistas o ecologistas. Dentro de la ecología aplicada podemos encontrar algunas disciplinas como la ecología de la conservación, la ecología de la restauración, la ecología urbana, ecología del disturbio y ecología del paisaje, en las cuales se llegan a describir procesos ecológicos en los cuales el humano se encentra inmerso.

Hasta este punto, es claro que los procesos ecológicos son complejos y muy dinámicos, por lo que es necesario iniciar con un eje de preguntas de análisis antes de entrar a los temas centrales de este bloque.

1. ¿Cómo afectan las actividades humanas a los componentes y características de un ecosistema?

2. ¿Qué cambios ocurren en los ecosistemas cuando extraemos una o varias especies?

3. ¿Qué beneficios obtenemos de los ecosistema?

4. ¿Cómo cuantificamos los daños o modificaciones de los ecosistema?

5. ¿Qué sucede con un ecosistema que ha sido talado o destruido por la actividad agrícola?

6. ¿Qué es ocurre con la producción primaria y con la transferencia de energía si talamos un bosque?

7. ¿Qué pasa con los ciclos biogeoquímicos cuando liberamos gases de efecto invernadero?

8. ¿Qué le pasa a la capa de ozono con la liberación de clorofluorocarbonados?

9. ¿Qué ocurre con la relación de carbono en la atmosfera y el océano cuando liberamos gases de efecto invernadero?

Conclusión

Proyecto
Intégrate

Parte 1

Escanea los siguientes códigos y observa los videos correspondientes; después realiza un organizador gráfico con la información que consideres relevante para el tema principal del bloque.

Aquel que se Escapó (El Tamaño Importa)	Los habitantes de lo profundo	La gran plaga de langostas norteamericanas
Aprendizajes clave		
• Control legal de pesca (pesca selectiva y pesca equilibrada). • Seguridad alimentaria. • Modificación de genética por presión de la extracción.	• Biodiversidad de los mares profundos. • Capacidad de extracción de recursos pesqueros. • Cantidad límite de extracción. • Capacidad de reproducción de cada especie.	• Extinción de especies por agricultura. • Capacidad de producción agrícola. • Cambios ambientales por agricultura y pastoreo por ganadería.

Ahora responde el siguiente cuestionario:

1. ¿Qué beneficios o perjuicios tiene la pesca legalmente controlada?

_____
_____
_____
_____

2. Investiga qué es seguridad alimentaria y qué acciones se realizan en la actualidad para garantizarlas.

_____
_____
_____
_____

3. ¿Qué efectos tiene la pesca sobre la evolución de las especies?

_____
_____
_____
_____

4. ¿Cuál es la diferencia de remplazo anual de ejemplares entre el reloj anaranjado, el bacalao, la caballa y el arenque?

_____
_____
_____
_____

5. Qué importancia tiene la capacidad de remplazo para la pesca y la capacidad de extracción de ejemplares.

_____
_____
_____
_____

6. Realiza una lista de las especies que se cultivan extensamente en tu localidad y analiza los efectos que esta estrategia tiene para la conservación o impacto sobre el medio ambiente.

Cultivo	Impacto

Los bienes y servicios que obtengo del ecosistema

Una vez que intentamos profundizar en la complejidad de los ecosistemas, entendemos que nosotros, los humanos, nos encontramos inmersos en esta complejidad y representamos un agente importante de cambio en de ellos. Por tal motivo, es necesario entender tanto **nuestro impacto en los ecosistemas** como los **servicios que éstos nos brindan** en sus estados saludables.

Los **sistemas saludables**, al ser complejos y diversos, brindan beneficios en forma de recursos, servicios o productos que pueden ser tangibles o no. Los recursos o productos tangibles se identifican por ser físicamente percibidos, como la madera, el alimento, el agua, minerales, subproductos vegetales y animales, entre otros. Mientras que los recursos, servicios o productos no tangibles pueden ser el aire limpio, la regulación natural de patógenos, la productividad de oxígeno, la captación de nutrientes, la captación y retención del agua, la polinización de especies agrícolas, entre otros.

En este sentido, los servicios ambientales se clasifican en:

1. **Servicios ambientales de soporte:** son aquellos que permiten la continuidad natural, independientemente de los cambios existentes dentro del sistema.
   - Disponibilidad de energía lumínica y calórica
   - Bancos de semillas
   - Arrastre y depósitos de nutrientes (S, P, O, N, C e H)
   - Sitios de captación o desfogue de aguas superficiales y subterráneas

2. **Servicios ambientales de regulación:** son aquellos que permiten la regulación, manteniendo la variabilidad controlada y evitando cambios abruptos que deterioren el ecosistema.
   - Sitios de filtración y eliminación de contaminantes naturales
   - Control de plagas por consumo de depredadores
   - Capacidad de evapotranspiración

3. **Servicios ambientales de provisión:** es todo lo que puede utilizar el ser humano.
4. **Servicios ambientales culturales:** son espacios de recreación y condiciones para el esparcimiento humano. Podemos dividirlos de forma general en dos tipos:
   - Servicios naturales del ecosistema (de soporte y regulación); y,
   - Servicios para el consumo y el bienestar humano (de provisión y culturales). Aunque todos los servicios nos benefician directa o indirectamente, unos son más visibles y comprensibles.

Los servicios de soporte y regulación se mantendrán siempre y cuando no exista deterioro ambiental por actividades humanas incontroladas, mientras que los servicios de provisión y culturales dependerán del uso racional de los mismos (servicios de provisión y culturales). Todos los sistemas pueden ser aprovechados si se sigue una lógica simple que se encuentra basada en la productividad de los ecosistemas (integración de la energía y ciclo de nutrientes), lo cual se basa en la capacidad del ecosistema de reponer la **biomasa** perdida en un evento de disturbio. Por lo que (Rodríguez Martínez et al., 2013):

$$Producción = \frac{\Delta Biomasa}{\Delta Tiempo} + pérdidas$$

La productividad en los ecosistemas se mide en **biomasa** (cantidad de masa representada por los organismos vivos) o por número de ejemplares por especie, suponiendo que cada ejemplar representa una unidad de biomasa aproximada.

Una tasa representa la relación entre dos magnitudes, la definida y la variante.

Donde *pérdidas* es igual a la suma de todas las pérdidas naturales, más las extracciones por actividades antrópicas.

Esta fórmula se puede utilizar como base para calcular **tasas** de extracción y aprovechamiento de cualquier ecosistema que pueda y necesite ser aprovechado. Por lo que es muy similar al equilibrio de una población, solo que está más enfocada en el excedente de la producción que se encuentra disponible para ser aprovechado sin generar ningún problema a la población misma.

Ejemplo:

Supongamos que se tiene un criadero de cerdos de los cuales se alimenta a una comunidad humana conocida de 100 habitantes. Hay un total de 20 cerdos, de los cuales la mitad son hembras adultas (10) que anualmente paren a 10 crías cada una, por lo que se obtienen 100 cerditos para engorda (uno por cada habitante). Con esta producción anual, cada habitante puede consumir lo equivalente a un cerdo por año, los suficiente para mantenerse bien alimentados.

Pero, ¿qué pasa si, por razones ajenas, el siguiente año una enfermedad porcina mata a un 20 % de los lechones recién nacidos? Las pérdidas bajarían la cantidad de aprovechamiento anual por persona de 1 a 0.8 cerdos; siendo que, si las personas siguen consumiendo 1 cerdo al año, tendrían que comer a los 20 cerdos adultos, lo cual acabaría con la producción. O sea que, para el tercer tiempo de producción, tendrían que comprar los 100 cerdos para su consumo fuera de la comunidad, o comprar solo los cerdos adultos para sustituir a los de edad productiva y seguir con su producción considerando la tasa de mortalidad.

		Tiempo 0	Tiempo 1	Tiempo 2
Cerdos para el consumo	Machos	10	10	0
	Hembras	10	10	0
	Crías para engorda	10 * 10 = 100	10 * 10 = 100	0
	Pérdidas (muertes)	-0	-20 %	0
	Total anual	120	100	0
Aprovechamiento	Población humana	100	100	0
	Tasa de consumo (extracción)	1 * 100 = 100	1 * 100 = 100	**1 * 100 = 100**
	Cerdos sin consumir	20	0	0

Por lo contrario, conociendo la tasa de muerte de cerdos se puede buscar un recurso alternativo para sustituir la falta de carne o incrementar la producción en función de las pérdidas. Entonces se tienen dos panoramas:

a) Si se cuenta con un recurso alternativo para sustituir la pérdida de carne, se tiene que bajar la tasa de consumo de 1 cerdo a 0.8 cerdo por persona.

		Tiempo 0	Tiempo 1	Tiempo 2
Cerdos para el consumo	Machos	10	10	10
	Hembras	10	10	10
	Crías para engorda	10 * 10 = 100	10 * 10 = 100	10 * 10 = 100
	Pérdidas (muertes)	0	-20%	-20%
	Total anual	100 + 20 = 120	80 + 2 0= 100	80 + 20 = 100
Aprovechamiento	Población humana	100	100	100
	Tasa de consumo constante	1 * 100 = 100	0.8 * 100 = 80	0.8 * 100 = 80
	Cerdos sin consumir	20	20	20

b) Si se incrementa el número de hembras para compensar las pérdidas, entonces 100 crías para engorda representa el 80% de producción final después de la pérdida del 20%. Entonces, con 3 hembras extra podríamos compensar la pérdida del 20%. Esto generaría un excedente por cada tiempo productivo, lo cual incrementaría paulatinamente la producción de cerdos, generando capacidad de venta hacia el exterior de la comunidad.

		Tiempo 0	Tiempo 1	Tiempo 2
Cerdos para el consumo	Machos	10	10	12
	Hembras	10	13	15
	Crías para engorda	10 * 10 = 100	13 * 10 = 130	15 * 10 = 150
	Pérdidas (muertes)	0	-20%	-20%
	Total anual	100 + 20 = 120	104 + 23 = 127	120 + 27 = 147

Aprovechamiento	**Población humana**	100	100	100
	Tasa de consumo constante	1 * 100 = 100	1 * 100 = 100	1 * 100 = 100
	Cerdos sin consumir	120 - 100 = 20	127 - 100 = 27	147 - 100 = 47

Gracias a este modelo general, los recursos naturales de origen biológico se pueden clasificar en recursos naturales renovables y no renovables, parafraseando lo anterior entonces ***los recursos naturales de origen biológico NO renovables son aquellos en los que la tasa de aprovechamiento es mayor a la tasa de productividad natural y que los recursos naturales de origen biológico renovables son aquellos en los que la tasa de aprovechamiento es menor o igual a la tasa de productividad natural*** (Rodríguez Martínez et al., 2013).

Para el caso de recursos biológicos naturales, como es el caso de animales y plantas silvestres, podrían mantenerse en un estado de aprovechamiento constante siempre y cuando se consideren diferentes características demográficas (Salimath & Jones, 2011). Para esto, primero es necesario considerar las características de la población aprovechada y de la comunidad en la que se encuentra inmersa; posteriormente, pueden establecerse las características del aprovechamiento.

Los aprovechamientos de un recurso biológico se miden en intensidad y temporalidad, ósea, cuánto y cada cuánto tiempo lo aprovecho. Lo anterior puede verse de forma general en el siguiente diagrama:



Los sistemas pesqueros pueden ser utilizados como referencia, puesto que el establecimiento de tiempos de veda sirve para evitar la sobreexplotación, siendo que las temporadas limitadas de pesca se sitúan en los momentos en los que la productividad neta natural es mayor sin comprometer ningún proceso reproductivo (tiempo de veda durante la temporada reproductiva más intensa), garantizando así la continuidad del recurso. Lo anterior se puede observar en la siguiente gráfica:



Esto también se aplica en el aprovechamiento de la madera para la fabricación de muebles y papel, por lo que es necesario calcular y definir los momentos más adecuados para la extracción de los recursos. Y lo podemos extender a casi cualquier sistema de producción agrícola, silvícola o pecuario, así como a todas aquellas actividades alternativas como el turismo natural y las actividades cinegéticas.

México es un país rico en recursos naturales y de gran diversidad, tanto biológica como cultural, por lo que puedes encontrar una gran diversidad de formas de uso, aprovechamiento y explotación de la naturaleza (CONABIO, 2006).

Tabla 3.1 Algunas plantas con origen o domesticadas en territorio mexicano (CONABIO, 2006).

Uso principal	Nombre común	Especie	Origen
Abono verde	Guaje	*Leucaena esculenta, L. leucocephala*	Mesoamérica
Alimento			
	Aguacate	*Persea americana*	Mesoamérica
	Cacao	*Theobroma cacao*	Mesoamérica
	Calabazas	*Cucurbita pepo, C. moschata*	Mesoamérica, América tropical, Norteamérica

Alimento	Chicozapote	*Manilkara zapota*	Mesoamérica
	Frijol	*Phaseolus vulgaris*	Mesoamérica
	Guayaba	*Psidium guajava*	Mesoamérica, norte de Sudamérica
	Jícama	*Pachyrrhizus erosus*	Mesoamérica
	Jitomate, tomate, tomate rojo	*Lycopersicon esculentum*	Mesoamérica, norte de Sudamérica
	Maíz	*Zea mays*	Mesoamérica
	Tejocote	*Crataegus mexicana, C. pubescens*	Mesoamérica
	Tomate verde, tomate de cáscara	*Physalis ixocarpa*	Mesoamérica
	Tuna y nopales	*Opuntia albicarpa, O. ficus-indica, O. megacantha*	Mesoamérica
Bebida			
	Maguey cenizo, maguey del cerro	*Agave asperrima*	Mesoamérica
	Maguey mezcalero, maguey espadín	*Agave angustifolia*	Mesoamérica, norte de México
	Maguey mezcalero, maguey tobalá	*Agave potatorum*	Mesoamérica
	Maguey pulquero, ixtle	*Agave salmiana*	Mesoamérica, norte de México
	Maguey tequilero, maguey azul, Agave azul	*Agave tequilana*	Mesoamérica
Condimento			
	Achiote	*Bixa orellana*	Mesoamérica
	Chile, chile ancho, serrano, jalapeño yotros	*Capsicum annuum*	Mesoamérica
	Vainilla	*Vanilla planifolia*	Mesoamérica
Estimulante			
	Tabaco, yetl	*Nicotiana rustica*	Mesoamérica
Fibra			
	Algodón	*Gossypium hirsutum*	Mesoamérica
	Henequén	*Agave fourcroydes*	Mesoamérica
	Goma (chicle)Chicle, chicozapote	*Manilkara zapota*	Mesoamérica

Ceras			
	Candelilla	*Euphorbia antisyphilitica*	Norte de México, sur de EUA
Ornamental			
	Cempasúchil, flor de muertos	*Tagetes erecta*	Mesoamérica, Norteamérica, Sudamérica
	Nochebuena	*Euphorbia pulcherrima*	Mesoamérica
Pigmento			
	Añil	*Indigofera suffruticosa*	América tropical

En esta lógica, existe la preocupación sobre el área total disponible para la producción de alimentos (agrícola y pecuaria), lo que se conoce como **capacidad de carga para producción ganadera**, así como en el límite real de personas que podrían sostenerse por el máximo productivo de ganadería y agricultura. Por lo anterior, muchos países se preocupan por la "seguridad alimentaria", con el afán de evitar problemas sociales y culturales por hambruna a causa de la falta de producción y distribución nacional e internacional de alimentos.

Lo anterior, en combinación con los efectos del cambio climático, representa uno de los temas más importantes en las agendas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en ingles), ya que representa una de las principales problemáticas a resolver para prevenir catástrofes mundiales por hambruna, si la productividad y áreas productivas no fueran suficientes para abastecer de alimento a la población humana, recalcando la importancia de la "seguridad alimentaria" y a los "alimentos seguros" para la población humana (FAO, 2020).

Los sistemas productivos humanos son dependientes de la productividad de los ecosistemas y de la estabilidad de los ciclos de nutrientes, lo cual hace que los sistemas productivos agrícolas y pecuarios sean frágiles si los ecosistemas se pierden o deterioran. Para garantizar una producción agrícola constante y alta se pueden seguir dos caminos: 1) un mejoramiento de suelos a través del manejo sustentable, dirigido al incremento y mantenimiento de las relaciones ecológicas; o, 2) agregando los nutrientes faltantes de forma directa (fertilización del suelo), así se ha realizado durante muchos años, como lo muestra la siguiente gráfica.

Tabla 3.2 Porcentaje de aplicación de fertilizante por tipo de cultivo, en kilotoneladas (González-Ulibarry, 2019)

Cultivo	K a nivel mundial	%
Cereales	89 622	49.26 %
Oleaginosas	23 156	12.73 %
Fibra	6 732	3.70 %
Azúcar	7 460	4.10 %
Raíces y tubérculos	4 185	2.30 %



Frutales	13 100	7.20%	
Hortalizas	15 648	8.60%	
Pastizales	7 824	4.30%	
Residuos (especies no agrícolas)	14 192	7.80%	

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 13

Fertilización de suelos agrícolas: ventajas y desventajas.

El hombre que mató y salvó a millones

https://bit.ly/488tKSg

1. **¿Por qué la gente desea tanto tener islas cubiertas de excremento de aves?**

2. **¿Por qué había un mercado tan grande de excrementos?**

3. **¿Cuánto nitrógeno contiene el guano?**

4. **¿Por qué el nitrógeno no está tan disponible a pesar de ser muy abundante?**

5. **¿Cómo ayudó la producción de amoniaco a la cosecha de trigo en Reino Unido?**

6. **¿Cómo perjudicó la industria del amoniaco al mundo?**

Discutan el tema sobre lo malo y lo bueno del químco Fritz Haber y sus aportaciones tanto en la producción de fertilizantes como armas químicas. Escribe un texto expositivo sobre el tema en tu cuaderno.

Para controlar la productividad, los sistemas agrícolas incluyeron el ingreso de fertilizantes extraídos de bancos mineros y producidos en laboratorios industriales, aplicándolos a los cultivos directamente al suelo o la planta. Esto benefició a la productividad de los cultivos, pero perjudicó aún más las redes ecológicas que ya se encontraban dañadas por la producción agrícola, reduciendo la productividad natural del suelo y generando otros problemas por lixiviación y arrastre de los residuales de los fertilizantes, formando lo que se conoce como "zonas muertas costeras" (Arellano-Aguilar et al., 2016). Esto generó otros problemas que se tienen que solucionar, ya que definitivamente necesitamos seguir produciendo alimento para mantener a la enorme población humana que sigue creciendo.

El primer efecto de la aplicación de fertilizantes es el desplazamiento de especies bacterianas del suelo, las cuales son eliminadas por el ingreso de fertilizantes, extinguiendo localmente muchas especies de bacterias fijadoras de nitrógeno. La absorción de los fertilizantes por las plantas representa alrededor del 30% del total de fertilizantes aplicados, mientras que el restante se transporta a través del suelo por las corrientes de agua y se acumula en zonas particulares donde se sobrecarga de nutrientes hasta el punto de eutrofización (enriquecimiento de nutrientes), lo que genera zonas costeras anóxicas sin capacidad productiva (González-Ulibarry, 2019; Reyes Tirado et al., 2016).

Otro impacto importante generado por la agricultura es el desplazamiento de selvas y bosques naturales, los cuales son sustituidos por los monocultivos de importancia como el trigo, el maíz, la caña, el sorgo, la soya, la avena, entre otros. La pérdida de selvas no solo afecta a la biodiversidad de especies, ya que también modifica los ciclos biogeoquímicos del planeta desde la atmosfera hasta el océano, por las características de evapotranspiración de las plantas y la capacidad de retención y redistribución de agua que realizan las raíces profundas de las especies de árboles tropicales (Pierret et al., 2016).

La desecación de las cuencas en áreas tropicales de México ocurre principalmente por la pérdida de cobertura forestal, al extender las áreas agrícolas y de pastizales para ganadería, actividades que modifican fuertemente los flujos de agua y el secuestro de carbono además de aumentar la erosión hídrica y reducir la infiltración y retención hídrica, como lo han demostrado algunos estudios con manejos silvopastoril o simplemente silvícolas (Monárrez-González et al., 2018).



El dibujo presenta el perfil del sistema de raíces de la especie de *Pinus silvestris*, *Pimpinella saxifrage*, *Zygophullum xanthoxylo* y *Convolvulus tragacanthoides*. Donde H/D es la proporción que tiene la altura de la planta con respecto a la profundidad de las raíces. Sin embargo, el mismo estudio de donde se extrae este diagrama de profundidades menciona el estudio de Phillips de 1963 donde se registra para *Prosopis juliflora* (un mezquite nativo de México) una altura sobre el suelo de 10 a 12 metros y raíces con profundidades que superan los 50 metros (Pierret et al., 2016). Si comparamos estos sistemas radiculares con algunas especies de cultivo agrícola podemos comprender lo que significa para los ecosistemas del suelo cuando se cambia una selva por un monocultivo de gramíneas, como ejemplo tenemos a las raíces de la caña que no superan el metro de profundidad y tan solo en México representa más 663 mil hectáreas dedicadas a su cultivo (Aguilar-Rivera et al., 2010; Romero et al., 2014), áreasz que naturalmente estaban cubiertas por selvas tropicales bajas y medianas con raíces presumiblemente mucho más profundas que las de la caña.

Actividad de aprendizaje 14

Recursos agrícolas y sus impactos

Investiga qué tipo de cultivos se producen en tu región o municipio, qué manejo se realiza (fertilización y pesticidas son utilizados) y cuál es el área aproximada de cada tipo de cultivo. Con la información obtenida llena la siguiente tabla:

Especie de cultivo	Fertilizante	Pesticida	Área cultivada (hectáreas)

Impactos ambientales, perturbación y disturbios ecológicos.

Las perturbaciones ecológicas se pueden definir como aquellos cambios ecosistémicos promovidos por disturbios o impactos ambientales (fuentes externas o internas no normales) (Edward & Rykiel, 1985). Estos impactos o disturbios pueden generan perturbaciones en magnitudes variables sobre la estabilidad del ecosistema, estos impactos o disturbios pueden ser de origen natural o antrópico. Claro que los cambios pueden tener diferentes sentidos o direcciones cuando hablamos de productividad y biodiversidad, puesto que podrían considerarse **positivos si los cambios aumentan la productividad y la biodiversidad o negativos si reducen la productividad y merman la biodiversidad.**



Por esa razón es necesario comprender primero la capacidad productiva (tanto la productividad primaria como las subsecuentes, hasta la disipación de energía calórica) de un ecosistema y su biodiversidad, antes de saber si un impacto ambiental tiene consecuencias positivas o negativas, y así poder establecer formas de medición adecuadas para describir el tipo y grado del disturbio provocado por el impacto. En esta misma lógica, los impactos o disturbios pueden ser caracterizado por su origen, dirección, magnitud y temporalidad. Estos disturbios pueden ser clasificados según su efecto en destructivos, reestructurantes (discomposition), de interferencia o de supresión. Para comprender mejor esta clasificación, tomamos como referencia el trabajo de Edward y Rykiel (1985), de donde tomamos, traducimos y modificamos ciertos textos para su mejor comprensión en español.

A. Perturbación.

Un efecto; la respuesta de un componente ecológico o sistema a un disturbio u otro proceso ecológico. Los disutbios pueden ser caracterizados por el origen, dirección, magnitud y persistencia.

1. **Transitoria:** Una modificación temporal que con el tiempo regresa a un estado normal.
2. **Permanente:** Una modificación defiitiva que se mantiene durante el tiempo, a pesar de que el disturbio ya no exista.

B. Estrés

Un efecto, fisiológico (individuo) o funcional (sistema), causada por un disturbio caracterizado por su dirección, magnitud y persistencia.

1. **Trauma de sobreviviencia:** Estres inducido por pérdida de biomasa, como una poda de un árbol
2. **Trauma letal:** Muerte del individuo por pastoreo.

C. Disturbio

Una causa, una fuerza física, agente o proceso, biotico o abiotico, causando un aperturbación (incluye estres) en un componente ecológico o sistema.

1. **Destrucción:** La biomasa es reducida en cantidad.
2. **Reestructuración:** Una población particular es selectivamente eliminada, reducida, agregada o expandida.
3. **Interferencia:** La inhibición de procesos de flujo de energía, ciclos de nutrientes o de las redes tróficas.
4. **Supresión:** Prevención de un disturbio natural.

Por consiguiente, antes de evaluar un impacto ambiental o disturbio ecológico, se tiene que conocer las fluctuaciones naturales presentes en los ecosistemas en donde se mide el impacto o el disturbio.

En esta imagen se puede percibir cómo los valores expresados muestran fluctuaciones temporales repetitivas, y como las fluctuaciones de CO_2 como CH_4 siguen cierta similitud a las fluctuaciones de temperatura. En este caso, la temperatura representa una aportación energética que se refleja en los subproductos metabólicos CO_2 y CH_4.



Además de la escala, los efectos pueden variar según las características físicas y biológicas del mismo ecosistema y su capacidad de **resiliencia**. Es por lo que, medir los efectos de los impactos y disturbios ambientales tiende a ser complicado y muy costoso, por lo que es necesario tener puntos de comparación que nos permitan conocer los cambios para cada tipo de evento de disturbio y para cada tipo de ecosistema, para finalmente poder predecir posibles impactos previo a una extracción o actividad antrópica particular. Además de eso, hay tipo de eventos de perturbación que emiten contaminantes que solo se pueden medir con tecnologías o técnicas costosas, como es el caso de los medidores digitales de oxígeno atmosférico, los medidores de decibeles para contaminación por ruido, metodologías de laboratorio para detección de metales pesados, entre otras.

Glosario

Resiliencia. Es la capacidad de un sistema de regresar a un estado de normalidad posterior a un impacto ambiental.

Los impactos ambientales pueden ser de origen natural (huracanes, terremotos, tornados, sunamis, erupciones volcánicas, entre otras) o de origen antrópico (contaminación por metales pesados, acumulación de resinas plásticas en cuerpos de agua, uso excesivo de compuestos tóxicos para la biodiversidad, contaminación por ruido y polvo, emisión de CO_2, entre muchos otros).

Los impactos ambientales de origen natural sueles darse en periodos más o menos cíclicos, definidos por los sistemas planetarios en la atmosfera, hidrósfera y litósfera. Uno de los ejemplos más conocidos de impactos naturales más intensos es la erupción de un volcán, que suelen ser devastadores en muchos sentidos, pues tienden a arrasar con la flora y fauna circundante además de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Aunque, por el contrario, en sistemas a escalas tan pequeñas como centímetros cuadrados, la caída de un árbol en un bosque genera una modificación localizada

que implica la remoción y desplazamiento de especies al cambiar la incidencia del sol (temperatura, humedad, radiación, entre otras) en el espacio que dejó el árbol caído.

Por su parte, los humanos generan una diversidad de cambios en los sistemas que suelen ser muy severos, tanto que la estructura original difícilmente podría recuperarse. Puedes ver este simulador para imaginar los cambios que se generan alrededor de un centro urbano costero:

Los impactos antropogénicos se pueden describir desde diferentes esferas o aspectos físicos o biológicos, como lo mostramos en seguida:

https://bit.ly/3NAbvN5

- **Atmósfera | Atmosphere:** La contaminación del aire es tan diversa en componentes químicos que afectan de muchas maneras a los sistemas biológicos.

  Uno de los procesos de contaminación atmosférica más significativos del siglo pasado fue el agujero en la capa de ozono. Un proceso atmosférico que fue explicado por el mexicano ganador del premio nobel de Química, el Dr. Mario Molina (Molina & Rowland, 1974). Gracias a su publicación, acciones internacionales se realizaron a tiempo para detener el avance del daño atmosférico que se realizaba por la liberación de los clorofluorocarbonados.

Recurso digital

Por su parte, los humanos generan una diversidad de cambios en los sistemas que suelen ser muy severos, tanto que la estructura original difícilmente podría recuperarse. Puedes ver este simulador para imaginar los cambios que se generan alrededor de un centro urbano costero escaneando el siguiente código:

"...Proporciones de mezcla atmosférica global estimadas (en ppt) de clorofluorocarbonos (CFC), hidroclorofluorocarbonos (HCFC) e hidrofluorocarbonos (HFC), mostrados por separado para el hemisferio norte (NH; rojo) y hemisferio sur (SH; azul). Los círculos muestran las medidas del Experimento Avanzado de Gases Atmosféricos Globales y Laboratorio de Monitoreo y Diagnóstico del Clima, mientras las líneas de color muestran concentraciones simuladas de CFC-11 basadas en estimaciones de emisiones y tiempos de vida atmosféricos..." Tomado de (IPCC & TEAP, 2005).



- **Océanos, lagos y ríos | Ocean and rivers:** Actividades humanas afectan de forma importante las bombas planetarias de carbono. Todas las actividades anteriormente mencionadas afectan

a la dinámica planetaria, afectan los procesos fisicoquímicos modificando los flujos de energía y los ciclos de materia. Principalmente, modifican las corrientes marinas, afectando la distribución de nutrientes por todo el planeta y las temperaturas que se encuentran manejadas por el intercambio de aguas frías y cálidas por medio de estas corrientes.

En los ríos y lagos, por ejemplo, las características de pH, oxígeno disuelto y iones de bicarbonato presentan cambios importantes a lo largo del día. Como lo muestra la gráfica siguiente, que muestra las fluctuaciones medidas en un cuerpo de agua a 20cm de profundidad, donde se midió la radiación solar y temperatura en relación con el pH, oxígeno y bicarbonato durante 24 horas. En este ejemplo, la saturación del oxígeno (DO) se encuentra negativamente relacionada a la formación de carbonatos (HCO_{3^-}), mientras que el oxígeno disuelto muestra una relación positiva con el pH (Pacini et al., 2019).

Considerando estas fluctuaciones naturales, es más fácil imaginar los escenarios probables si se modificaran las características del agua por la acumulación de contaminantes, lo que generaría cambios importantes en la composición química (pH y oxígeno disuelto) repercutiendo en el funcionamiento del ecosistema acuático afectado.



La gráfica muestra la radiación y temperatura medida a 20cm de profundidad en el sureste de Bohemia en Republica Checa. También se midieron el oxígeno disuelto, pH y ión de bicarbonato en intervalos de 10 minutos durante 24 horas. Gráficas tomada de Pacini et al (2019).





La gráfica muestra una relación entre el pH y el oxígeno disuelto en un sistema donde la fotosíntesis y respiracion determinan el pH y oxígeno. Esta gráfica fue tomada de ... muestra cómo la fotosíntesis intensiva resulta en fluctuaciones en los parámentrs de pH y oxígeno. Gráfica tomada de Pacini et al (2019).

Un ejemplo bastante común en los cuerpos de agua en México es el lirio acuático, especie invasora introducida en muchos ríos, lagos y presas, que su capacidad reproductiva y su flotabilidad sobre la superficie del agua la hace capaz de bloquear el ingreso de luz, modificando la capacidad fotosintética de las algas y cambiando a su paso el pH y concentración de oxígeno disuelto, desplazando y eliminando especies de peces y artrópodos de importancia alimenticia.

Lirio acuático: la especie que amenaza los lagos de México.

https://noticias.imer.mx/blog/lirio-acuatico-la-especie-que-amenaza-los-lagos-de-mexico/

"El lirio acuático llegó a México a finales del siglo XIX. Esta planta invasora se extiende y reproduce velozmente, impidiendo el paso de luz y acabando con el oxígeno en el agua." Texto y foto tomada del artículo de Carretto Bianca en la página de Noticias IMER (https://noticias.imer.mx/).

"La competencia por el oxígeno del agua pone en peligro a peces, ranas, patos e incluso otras plantas subacuáticas de la laguna" Texto y foto tomada del artículo de Carretto y Gámez (2022) de la siguiente liga https://es.mongabay.com/2022/09/lirio-acuatico-planta-invasora-en-mexico/

- **Uso del agua | Water use:** El uso del agua seca las cuencas y modifica la estructura de los ecosistemas. Esto junto a la deforestación por cambio de uso de suelo generan lo mayores

cambios ecosistémicos. La construcción de represas genera cambios en la distribución del agua, establece fronteras para especies que utilizan los ríos, incluso puede significar el establecimiento de puentes para especies que anteriormente estaban separadas por los ríos, ahora limitados por las cortinas de las represas.

El uso irracional del agua se puede ejemplificar en muchos sitios de México, principalmente en los alrededores de los grandes centros urbanos como las Zonas Metropolitanas (ZM) del Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla-Tlaxcala, Toluca y Tijuana, las más grandes del país (SEDATU et al., 2020). Alrededor de estos centros urbanos se establecen empresas, industrias y actividades agrícolas y ganaderas de gran consumo de agua y contaminación de los acuíferos.

La redistribución y uso del agua es tan excesiva en ciertos casos que estudios en el lago de Chapala han reportado hasta un 60% del agua de retorno sin tratamiento previo a su descarga, contaminando el lago y afectando todos los ecosistemas locales, tanto acuáticos como rivereños, de la cuenca (Pedroza-Gutiérrez & Catalán-Romero, 2017). En otros estudios de análisis sobre el manejo de cuencas se han demostrado cambios excesivos en los cursos de los ríos, aumentando notablemente el arrastre de materiales y azolvando humedales costeros, desecación de cuerpos de agua, pérdida de ecosistemas acuáticos que impacta negativamente en la productividad pesquera, tal es este último caso que en las cuencas del soconusco en Chiapas se han registrado pérdida de productividad de camarón blanco (*Penaeus vannamei*) superior al 50% (Gómez-Ortega et al., 2019).

- **Hábitats costeros| Coastal Habitats.** Aguas costeras son afectadas por contaminación por el desarrollo de actividades humanas e incremento de la intensidad de tormentas, entre otras cosas.

  Una de las problemáticas más relevantes es la formación de zonas muertas costeras, generadas por el arrastre de fertilizantes provenientes de los principales cultivos de granos en todo el mundo. No solo eso, recientes estudios han demostrado que aplicaciones continuas pueden modificar la biodiversidad de plantas en las zonas más bajas, acidifican el suelo reduciendo la disponibilidad de nutrientes (Arellano-Aguilar et al., 2016; Kidd et al., 2017).

- **Ciudad | City:** Necesidad de energía eléctrica, comida y desarrollo de mercado, tiene muchos efectos sobre los ecosistemas al rededor a ellas. Estos impactos se pueden dividir en varios tipos de contaminación: contaminación atmosférica, contaminación por ruido, contaminación del suelo, contaminación del agua, contaminación físico-mecánica y contaminación química.

  Otra de las problemáticas de los centros urbanos y actividades humanas que afecta a los océanos, es el mal manejo de residuos plásticos, lo que ha ocasionado la formación de una isla de basura en el océano pacífico que abarca 1.6 millones de Km2, lo que representa el 82 % del territorio mexicano (Lebreton et al., 2018).

  Todos los tipos de contaminación son el resultado de la cantidad de necesidades productivas que representan dichas urbes, ya que tan solo en México se registran 48 metrópolis, poblaciones que en total representan 67.6 millones de habitantes con una tasa de crecimiento media anual del 1.4%, como se muestra en la gráfica (SEDATU et al., 2020). Estas zonas exigen cantidades enormes de recursos que son extraídos de los alrededores y de otras partes del mundo, lo que implica siempre en impactos ambientales importantes en los ecosistemas aledaños.

Cabe señalar que todas estas poblaciones urbanizadas también impactan en el flujo de drenaje y descargas de aguas grises, lo que representan todo un reto para el desarrollo sustentable.



Una de las problemáticas más intensa de los últimos 40 años en los centros urbanos y actividades humanas que afecta a los océanos es el uso desmedido de resinas plásticas, ya que los residuos de estas resinas plásticas terminan en el mar por un mal manejo. Los residuos plásticos arrastrados han ocasionado la formación de una isla de basura en el océano pacífico que abarca 1.6 millones de Km2, lo que representa el 82% del territorio mexicano (Lebreton et al., 2018).



Imagen tomada de (Lebreton et al., 2018). "*…Concentraciones de masa plástica en el océano para agosto de 2015, según lo predicho por nuestro modelo calibrado con datos. La línea en negrita representa el límite establecido para la isla de basura…*" Imagen y texto tomado de (Lebreton et al., 2018).



En 2015, se estimó que el 55% de los residuos plásticos producidos globalmente, fueron desechados y depositados en rellenos sanitarios o directamente a los ecosistemas terrestres y marinos (Ritchie & Roser, 2018).



- **Hábitats costeros| Coastal Habitats:** Aguas costeras son afectadas por contaminación por el desarrollo de actividades humanas e incremento de la intensidad de tormentas, entre otras cosas.

  Una de las problemáticas más relevantes es la formación de zonas muertas costeras, generadas por el arrastre de fertilizantes provenientes de los principales cultivos de granos en todo el mundo. No solo eso, recientes estudios han demostrado que aplicaciones continuas pueden modificar la biodiversidad de plantas en las zonas más bajas, acidifican el suelo reduciendo la disponibilidad de nutrientes (Arellano-Aguilar et al., 2016; Kidd et al., 2017).

- **Granjas | Farms:** La conversión de la vegetación a cultivos es la principal actividad humana que impacta directamente sobre la biodiversidad. Según la FAO de la ONU, la producción de cereales incrementó 126 % de 1970 al 2000. Además de la pérdida de vegetación por deforestación, la aplicación de pesticidas ha generado problemas sobre la biodiversidad en todo el planeta, tal cual fue el caso del DDT.

  Los pesticidas utilizados por la agricultura representan componentes químicos de gran importancia ambiental, puesto que el uso excesivo y no controlado de estos ha generado daños ambientales importantes a nivel planetario, al grado que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) enlisto algunos compuestos denominados **"la docena sucia".** Estos compuestos organoclorados son altamente estables (de larga durabilidad en el medio), baja solubilidad en agua, alta solubilidad en medios biológicos (medios hidrocarbonados) y alta toxicidad en insectos. Estas características los hacía ideales para su uso como pesticidas, pero los hace altamente persistentes dentro de los organismos biológicos (dentro de tejidos adiposos), por lo cual fueron llamados Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y prohibidos en casi todos los países del mundo.

Pesticidas organoclorados de la lista de Contaminantes Orgánicos Persistentes de la ONU	
DDT	Hexaclorobenceno (HCB)
Aldrín	Mirex
Dieldrín	Toxafeno
Endrin	Clordecona (Cepona)
Chlordane	Pentaclorobenceno
Heptacloro	Endosulfán*

Uno de los impactos más conocidos en Norteamérica fue el generado en las poblaciones de águilas calvas y Halcones peregrinos del ártico, fuertemente disminuidas por la acumulación ambiental de DDT alrededor de 1967, que en la actualidad se encuentran afectadas por la contaminación por plomo (Brasic et al., 2020). Es claro que la recuperación de las poblaciones de águila calva se recuperó hasta que la concentración ambiental del contaminante bajo lo suficiente como para no tener efectos sobre la tasa de mortalidad de estas aves, aunque según el reporte de Brasic, aún siguen existiendo contaminantes que afectan a estas poblaciones.

Otro componente químico presente en la industria humana altamente contaminante ha sido el ácido perfluorooctanoico (PFOA), relacionado con teflón y que durante le década de los 70s, 80s, 90s e inicio siglo contaminó acuíferos, suelo y aire alrededor de los centros

de producción de la empresa química DuPont que los utilizaban para producir sartenes (principalmente en EUA, aunque la industria alrededor de este compuesto se estableció a nivel mundial) (Frisbee et al., 2009; Shin et al., 2011). El caso anterior fue tan relevante para la administración estadounidense que se dedicó una película en 2019 sobre el tema, la cual fue titulada "*Dark Waters*" y como "*El Precio de la Verdad*" en Hispanoamérica.

Todos los sartenes de teflón contenían este componente altamente tóxico y por muchos años fueron liberados a las personas que los utilizaron y muchos de los cuales aún se siguen utilizando, alrededor de todo el mundo. Este compuesto es uno de un grupo de alrededor de 10 compuestos similares que son altamente resistentes y prevalecen por muchos años en los sistemas biológicos sin apenas degradarse. Estos compuestos se caracterizan por ser resistentes a la temperatura ayudando a reducir la fricción, por lo que se usaron en muchas ramas de la industria (automóviles, textiles, construcción, electrónica, entre otros), aumentando la exposición de los organismos biológicos a estos compuestos (Teaf et al., 2019).

- **Bosques | Forest:** El crecimiento de la población humana no solo resulta en la pérdida del hábitat, sino que también en la fragmentación de ellos. La fragmentación afecta directamente a la dinámica de las poblaciones y comunidades, impactando sobre la complejidad de los ecosistemas y afectando las redes ecológicas.

  La pérdida de bosques se ha realizado principalmente por actividades humanas como:

  - Aprovechamiento maderable inadecuado.
  - Incremento del área agrícola para producción de alimento y pastoreo.
  - Crecimiento urbano y construcción de carreteras, trenes, gasoductos, acueductos, represas, etc.
  - Desarrollo de centros turísticos.

  Todas estas actividades afectan directamente a la biodiversidad por la pérdida de biomasa principalmente, mientras que la fragmentación de ecosistemas reduce la conectividad entre poblaciones y su intercambio genético (Calvão et al., 2013; Zhang & Huang, 2019).

- **Biodiversidad | Biodiversity:** La extinción de especies se ha registrado por muestras geológicas, permitiéndonos conocer al menos 5 extinciones masivas los últimos 540 millones de años.

  Los procesos de extinción provocados por las actividades antrópicas son eventos de gran importancia para la biodiversidad del planeta, ya que se tiene una estimación de al menos 1 millón de especies llevadas a la extinción por actividades humanas. Esto es gracias a que nuestras actividades han alterado drásticamente alrededor del 75% de los ecosistemas terrestres y el 66% de los ecosistemas marinos. Como ya se mencionó, la adición o eliminación de elementos ecosistémicos o procesos del sistema, la extracción de biomasa y la

  Las especies domésticas no solo comparten nuestros hogares, ya que la introducción de estas especies ha generado grandes cambios en las dinámicas de los ecosistemas locales y circundantes, como el caso del gato que ha provocado afectaciones sobre poblaciones nativas y endémicas de aves, reptiles y mamíferos, provocando la extinción de al menos 33 especies, lo que representa el 13% del total de extinciones registradas a nivel mundial para aves, mamíferos y reptiles (Medina et al., 2011; Tollefson, 2019).



Distintas iniciativas se han establecido con el fin de reconocer aquellas especies que se ven afectadas por actividades humanas, con el objetivo de tener una guía de trabajo que pueda priorizar aquellas especies con mayor urgencia de ser rescatas por acciones de protección y restauración de sus hábitats. La lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza[1] (IUCN por sus siglas en inglés) es una herramienta que registra todas las especies impactadas en todo el mundo y las categoriza según su tamaño poblacional, cuantificando el riesgo a extinguirse del planeta.



1 La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

El diagrama ejemplifica las distintas categorías establecidas por la IUCN en su manual de Directrices para el uso de los criterios de la lista roja de la UICN a nivel regional y nacional.

Estas son propuestas de trabajo para los países, lo cual ayuda en la homogeneización internacional para la gestión de especies en alguna situación de riesgo.

La categorización solo se recomienda para poblaciones silvestres dentro de áreas naturales, así como poblaciones migratorias y de paso, como ocurre con la mariposa monarca en muchos sitios de México.

Recurso digital

Escanea el siguiente código para conocer más sobre especies invasivas.

- **Especies invasivas | Invasive species:** Se define como especies no nativas que generan daños económicos, ambientales o salud humana. Las especies invasoras son una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad y extinción de especies.

La introducción de especies a zonas donde no se distribuyen normalmente (consideradas especies exóticas), genera la posibilidad de integrar **especies con capacidad invasiva a ecosistemas naturales**. Estas especies generan cambios estructurales en las redes ecológicas, teniendo la posibilidad de desplaza o extinguir especies nativas en poco tiempo, generando cambios en cascada en toda la red ecológica. En México se han registrado más de 300 especies como invasoras que representan daños estimados en cerca de 60mil millones de dólares cada año, por lo que es necesario hacer conciencia sobre esta temática y colaborar activamente para reducir los riesgos de liberar especies exóticas en los ecosistemas naturales (Aguirre Muñoz et al., 2009; Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras., 2010).

Recurso digital

Escanea el siguiente código para descargar el libro *100 de las especies exóticas más invasivas del mundo.*

Tan solo la conversión de áreas naturales a cultivos ha generado un cambio en la dinámica de las comunidades generando grandes cantidades de invasiones de especies exóticas que se encuentran representadas en las plagas. Existe una lista de la IUCN que reconoce las 100 especies invasoras que han provocado grandes desastres ambientales con costos monetarios altos (Lowe et al., 2004), en la cual encontramos especies nativas de México que han sido introducidas alrededor del mundo ocasionando problemas ambientales, mientras que otras plantas de otras plantas del mundo pueden ser encontradas como invasoras en México.

- **Minería | Mining:** Estas actividades liberan depósitos contenidos en áreas localizadas, dispersándolas por todo el planeta, algunas de ellas bioacumulables. Lamentablemente, mucha de la tecnología actual contiene metales que solo se obtienen por extracción minera, por eso la economía circular es interesante para reducir la cantidad de extracción anual y, al mismo tiempo limitar la dispersión de contaminantes por todo el planeta.

Actividad de aprendizaje 15

Utilizando internet o material en papel de la biblioteca, determina la fórmula estructural de los siguientes COP, todos los cuales se han utilizado en el pasado como insecticidas organoclorados: aldrín, dieldrín, endrín, clordano, heptacloro, mirex, clordecona (Cepona) y endosulfán.

Dibuja una circunferencia alrededor de la estructura común del componente ciclopentadieno incorporado en todos ellos. ¿Cuál es el actual estatus de cada uno de estos compuestos en su país?

Aldrín	Dieldrín
Endrín	**Clordano**
Heptacloro	**Mirex**

Clordecona (Cepona)	Endosulfán

¿Cuál es el actual estatus de cada uno de estos compuestos en tu estado?

Aldrín

Dieldrín

Endrín

Clordano

Heptacloro

Mirex

Clordecona (Cepona)

Endosulfán

Mi huella ecológica, mi huella hídrica y mi huella de carbono

Los impactos ambientales representan a tipos de estudios que miden las respuestas de los ecosistemas a eventos de disturbio. Estos eventos de disturbio se pueden medir a diferentes escalas espaciotemporales que nos permiten comprobar cuál es el impacto real de nuestras actividades sobre el entorno.

En la actualidad, con el objetivo de generar conciencia sobre la capacidad de carga de un ecosistema, existen muchas formas para calcular indicadores que nos permitan conocer nuestro impacto sobre el planeta basado en aprovechamiento de los recursos. Uno de los indicadores biofísico más conocidos y ampliamente compartido en el ámbito científico, gubernamental, empresarial y formativo es **la huella ecológica**, la cual se define como **"el área necesaria para producir lo que consumimos y degradar lo que desechamos"** y se relaciona al área total del planeta disponible para producción, utilizada para medir la sustentabilidad (Cecilia Gareis, 2022).

En la literatura se pueden encontrar al menos 21 tipos de huellas ecológicas, casi todas ellas dirigidas a la cuantificación de la sustentabilidad y medir los impactos en magnitudes biofísicas (Čuček et al., 2012).

Tipos de huellas como indicadores de la sustentabilidad, según la revisión realizada por Čuček y colaboradores (2012)

Tipo de indicador.	Nombre	Abrev.	Unidad de medida
Huellas ambientales			
	Huella de carbono (CF).	CF	au; mu/fu; au/fu; mu/tu; mu/(au*tu); au*tu; mu
	Hidrica.	WF	au; mu/(au*tu): vu/au; vu/fu; mu
	Huella de energía.	ENF	au; au/fu; eu/fu; vu/(au*tu)
	Huella de enmisiones.	EMF	au
	Huella de nitrógeno.	NF	mu/fu
	Huella de tierra.	LF	au; au/fu
	*Huella de tierra FORESTAL.	FLF	au; au/fu

	*Huella de tierra de AGRICULTURA.	ALF	au; au/fu
	*Huella de tierra de CONSTRUIDA.	BLF	au; au/fu
	*Huella de tierra de PASTIZALES.	GLF	au; au/fu
	*Huella de tierra de CEREALES.	CLF	au; au/fu
	Huella de biodiversidad.	BF	au; au/fu; Indices de biodiversidad.
	Huella de fósforo.	PF	mu/fu
	Huella de basura	WSF	mu/fu
	Huella humana	HF	mu/fu; vu/fu
Huellas sociales			
	Huella Social	SF	SIN ESPECIFICAR
	Huella del derecho humano	HRF	SIN ESPECIFICAR
	Huella de corrupción humana	COF	SIN ESPECIFICAR
	Huella de la pobreza	POF	SIN ESPECIFICAR
	Huella de la sociedad digital.	OSF	SIN ESPECIFICAR
	Huella del trabajo.	JF	SIN ESPECIFICAR
	Huella del trabajo ambiental.	WEF	SIN ESPECIFICAR
	Huella de energía y comida.	FEF	SIN ESPECIFICAR
	Huella de la salud.	HLF	SIN ESPECIFICAR
Huellas económicas			
	Huella Financiera	FF	SIN ESPECIFICAR
	Huella Económica	ECF	SIN ESPECIFICAR
Huellas combinadas.			
	Huella de exergía.	EXF	eu/fu
	Huella Química.	CHF	mu/fu; índices de riesgo
Huellas compuestas			
	Huella Ecológica	EF	au; au/fu
	Índice de procesos sustentables.	SPI	SIN ESPECIFICAR

	Indicador del desempeño ambiental sostenible	SEPI	SIN ESPECIFICAR
Unidades de medición: au=unidad de área; eu=unidad de energía o exergía; fu=unidad funcional; mu= unidad de masa; tu=unidad de tiempo; vu=unidad volumétrica.			

Aunque existen todas estas métricas para medir los avances realizados en materia de conservación y sustentabilidad, siempre es necesario realizar acciones realmente positivas hacia el desarrollo sustentable, reducir la corrupción, rediseñar la producción y buscar alternativas para el manejo de los residuos urbanos y residuos de manejo especial. Es claro que falta mucho por hacer, pero podemos iniciar conociendo nuestra aportación a la huella ecológica.

Actividad de aprendizaje 16

Entra a la página de y realiza el cálculo de tu huella ecológica (copia las gráficas de los detalles en tu cuaderno). Después, enlista todos los productos que tienes en tu casa (perfumes, desodorantes, pasta de dientes, cereales, etc) y registra el país o estado de origen; posteriormente, en un mapamundi, haz líneas que unan cada sitio de origen a tu ubicación por cada producto enlistado.

Recurso digital

Escanea el siguiente código para conocer tu huella.



Huella hídrica

Para el caso de la huella hídrica, se puede tomar como referencia el reporte de AgroDer y World Wild Fund (WWF) en 2012. Este reporte ayuda a comprender los conceptos relacionados a lo que se conoce como **huella hídrica,** la cual es un valor que engloba toda el agua que usamos, consumimos, ensuciamos y desechamos en nuestra vida diaria. Prácticamente todo lo que consumismos representa un gasto de agua para su producción a lo cual llaman **agua virtual**, además de la clasificación de toda el agua que se encuentra dentro de los sistemas ecológicos. En este mismo razonamiento se clasifica en agua azul, verde y gris en función de su posición dentro de todo el sistema antrópico (AgroDer, 2012).

Entonces, se le denomina **agua azul** a toda el agua utilizada que se encuentra en cuerpos de agua superficiales y subterráneos; **agua verde** a la utilizada que se almacena como humedad siempre que no se convierta en escorrentía; **agua gris** es la contaminada por actividades humanas, la cual se reconoce como el agua dulce necesaria para asimilar la carga de contaminantes vertidos por la humanidad. Con todo lo anterior, la suma de agua utilizada de cada tipo en la producción de productos **representará su huella hídrica** (AgroDer, 2012).

AGUA GRIS

AGUA VERDE

AGUA AZUL

Para calcular tu huella hídrica, solo tienes que medir y calcular el agua que utilizas en tu casa durante un tiempo determinado, considerando todas las actividades que realizas (bañarte, lavar, regar plantas, consumir productos, entre otros). El agua gris, es prácticamente toda el agua que después de usar se va por el drenaje, mientras que el agua virtual es toda aquella que encuentras inmersa en tus alimentos y la utilizada para hacer cada producto que consumes, que finalmente termina en las tuberías de aguas grises, evaporada o en el cesto de residuos.

Realiza la siguiente actividad para conocer tu huella hídrica.

Actividad de aprendizaje 17

Calcula tu huella hídrica

1. Escanea el siguiente código para acceder a la lectura del documento "El agua que no vemos". Después, con la ayuda de los recibos de agua de tu casa, calcula tu huella hídrica del último año (puede ser de los últimos tres meses) y compárala con tus compañeros del salón.

2. Realiza una gráfica de la huella hídrica

3. Con la ayuda de tu profesor, compañeros y apoyándote de tutoriales, calcula el promedio de la huella hídrica de tu grupo. Puedes ir más allá y compararla con la de oros grupos que también realicen esta actividad, esto te ayudará a visualizar el verdadero impacto que tienen nuestras actividades.

   Vacía los datos en la siguiente tabla.

Nombre	Huella hídrica (metros cúbicos anuales)			
	Agua azul	Agua verde	Agua gris	Huella hídrica total

Huella de carbono

Las emisiones de gases de efecto invernadero tienen gran relevancia para todo lo relacionado con el cambio climático, siendo esta la razón por la cual la huella de carbono es de las más utilizadas en la literatura con una gran cantidad de variantes en las formas en que se calcula, dependiendo del objetivo de la medición.

Čuček y colaboradores (2012) enlistan una serie de preguntas útiles al momento de definir la huella de carbono, puesto que el carbono se encuentra presente en todos los seres vivos. Para calcular la huella de carbono…

1. ¿Solo debería considerarse el carbono presente en la emisión de gases de efecto invernadero?
2. ¿Solo debería de considerarse el CO_2, por ser el más abundante y potencial gas de efecto invernadero?
3. ¿Debería solo restringirse a carbono en estado gaseoso?
4. ¿Pueden incluirse substancias de efecto invernadero cuyas moléculas no contienen carbono?
5. ¿Debería de utilizarse o unidades de masa de CO_2 equivalente, o unidades de masa de CO_2, o unidades de masa de C atómico, o por unidad de área, o por unidad de tiempo?

Esos mismos autores proponen que la huella de carbono debería representar el desequilibrio dentro del ciclo del carbono, incluir solo el carbono y ser medido en unidad de masa de carbono por unidad funcional. Esto lo proponen por ser el carbono un elemento presente en toda la atmosfera, biosfera, litosfera e hidrosfera, además de presentarse en diferentes formas moleculares.

Tal como se abordó en el bloque anterior, el ciclo del carbono incluye procesos naturales de intercambio de CO_2 entre atmosfera e hidrosfera, mediante las llamadas "bomba de solubilidad" y "bomba biológica del carbono" que permite la formación de diferentes compuestos donde se absorbe CO_2 y se libera O_2 en la superficie del océano, sedimentando y movilizando compuestos orgánicos de carbono y formando $CaCO_3$ gracias a las corrientes marinas.



Para entender un poco de lo que nosotros contribuimos a la huella del carbono, muchas organizaciones han puesto calculadoras que permiten estimar cuantas toneladas de emisiones de CO_2 generas con tu estilo de vida, y además proponen acciones para compensar tus emisiones a través de acciones y donaciones.

1. Donaciones directas a proyectos de captura de carbono como

    a. Adoptando bosques viejos.
    b. Aportando a proyectos de captura de carbono, sea mediante técnicas tradicionales o tecnológicas.
    c. Aportando donaciones a comunidades rurales para motivar la conservación de bosques.

2. Sembrando arboles de especies nativas y cuidándolos para aumentar la tasa de supervivencia.
3. Reduciendo el uso de vehículos de combustión a partir de derivados del petróleo.
4. Usar tecnologías y energías limpias, como calentadores solares, paneles solares y aerogeneradores, según sea el caso.

Calculemos y reduzcamos nuestra huella de carbono.

Actividad de aprendizaje 18

Tu huella de carbono

Para calcular tu huella de carbono, puedes utilizar cualquiera de las páginas disponibles, pero te recomendamos usar las páginas de ClimateHero-Calculadora de carbono y de Consumo responsable. Escanea los siguientes códigos para conocerlas:

Ingresa los datos solicitados, apoyate de tus padres o tutores para contestar la encuesta. Finalmente copia tus resultados en tu cuaderno para compartir en clase.

Energías renovables y ciudades sustentables

Las ciudades representan una modificación completa de los ecosistemas naturales, por lo que son el resultado de la deforestación progresiva, introducción de especies, modificación y pérdida de la biodiversidad, contaminación del aire, agua, suelo por falta de estrategias en el manejo de residuos generados en todas las actividades industriales y sociales. Claro está que el progreso humano ha tenido un coste ambiental alto, ya que las organizaciones, instituciones y corporaciones que se encargan de crear bienes y servicios para mejorar nuestra calidad de vida han representado un impacto importante para la estabilidad del planeta (Linares Rodríguez & Suárez Rico, 2017).

Se han realizado y se siguen realizando acciones para cambiar la forma en que mejoramos nuestra calidad de vida, buscando alternativas sustentables, tecnologías novedosas y alternativas que puedan garantizar nuestra permanencia en este mundo por mucho más tiempo. Sin embargo, el camino para lograrlo es largo y costoso para todos, hace falta mayor participación ciudadana y corporativa para lograr un desarrollo sustentable.

Las ciudades han crecido como consumistas y derrochadoras, absorbiendo el recurso de los ecosistemas aledaños, pero se puede cambiar esta característica de muchas formas.

Energías renovables

Las energías limpias han cambiado la forma de mantener a las ciudades funcionando, sin embargo, es importante entender que aún falta un largo camino para dejar de depender de energías basadas en la quema de combustibles fósiles. Existen una diversidad de formas de obtener energía limpia:

Geotérmica

Eólica

Hidráulica

Fotovoltaica

Nucleoeléctrica

El gobierno de México se ha comprometido con el objetivo de lograr el 35 % del abastecimiento de la demanda energética por fuentes de energías limpias (fuentes de energía renovable). Existen muchos proyectos mexicanos y extranjeros, tanto privados como gubernamentales, que han impulsado esta conversión de energías limpias (principalmente en el desarrollo de parques de energía eólica, energía hidráulica en represas principalmente del sureste mexicano, y energía **geotérmica**), pero la demanda energética y el crecimiento de las ciudades hace que esta tarea sea complicada y realmente cara, pues la infraestructura necesaria para abastecer las necesidades energéticas es costosa y lleva tiempo instalarla (Ignacio & Alcocer, 2019; IMCO, 2022; Silva Rodríguez de San Miguel, 2019).

Glosario

"...Geotermia, se refiere a la energía que se encuentra en el interior de la Tierra. En México existe un potencial muy alto de recursos geotérmicos y experiencia en su explotación. Sin embargo, es prioritario seguir con investigaciones y desarrollo de tecnologías para la ubicación y explotación, sobre todo, de los sistemas de roca seca disponibles en el país..." (Santayo & Barragán-Reyes, 2010).

Central Nuclear Laguna Verde

"…Ubicada en Veracruz, la Central Nuclear consta de dos unidades, ambas aportan de manera exitosa alrededor del 5 % de la energía generada en el Sistema Eléctrico Nacional.

No emite contaminantes como el CO2, opera dentro de las normas y estándares de seguridad y calidad de la industria nuclear nacional e internacional, y es supervisada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS)…" (https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2101)

La energía geotérmica es un recurso amplio en México, aunque en la actualidad solo se aprovecha en 4 lugares de todas las anomalías geotérmicas conocidas (Santayo & Barragán-Reyes, 2010). Sin embargo, aprovechar más del recurso geotérmico existente significa una inversión económica por los costos de exploración, además recursos tecnológicos, dificultades de eficiencia en los sistemas de extracción, corrosión y la disposición de fluidos residuales (Santayo & Barragán-Reyes, 2010).

Según los datos obtenidos para 2018, ese año se logró cubrir el 19.5 % de la energía consumida por energía proveniente de tecnologías renovables, con el mayor porcentaje cubierto por energía hidráulica (Silva Rodríguez de San Miguel, 2019). Con los datos obtenidos los años siguientes, es evidente que la energía con mayor crecimiento en 2019 fueron la eólica y solar, con una capacidad instalada de 6,977 MW y 5,955 MW respectivamente.

Tabla 3.5 Porcentajes de energías renobables en México en los años 2018 a 2021 (datos tomados del CENACE)

Tipo de energía generada en México de 2018 a 2021.				
Tipo de energía generada.	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Convencional	80.50%	67.89%	67.27%	66.91%
Hidroeléctrica	9.40%	16.1%	15.2%	14.6%
Nuclear	4.10%	2.0%	1.9%	1.9%
Eólica	3.60%	7.7%	7.8%	8.1%
Geotérmica	1.60%	1.1%	1.1%	1.1%
Biomasa	0.60%	0.5%	0.5%	0.4%
Solar	0.20%	4.6%	6.2%	6.9%

Tipos de energía generada en México de 2018 a 2022 (Fuente: CENACE)



Por lo anterior se estima que, siguiendo el crecimiento actual de desarrollo de proyectos en energías limpias, para el 2036 se podría alcanzar que el 48 % de la energía consumida en México provenga de energías renovables.

"El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) es un organismo público descentralizado cuyo objeto es ejercer el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN); la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y garantizar imparcialidad en el acceso a la Red Nacional de Transmisión (RNT) y a las Redes Generales de Distribución (RGD)... Leer más: http://www.cenace.gob.mx/CENACE.aspx" (En https://www.gob.mx/cenace/que-hacemos)

Ilustración 1. Parque eólico en los límites de Nuevo León y Tamaulipas, en el noreste de México.

Ciudades sustentables

Las ciudades no solo consumen energía eléctrica, sino que también recursos minerales y naturales. Alimentos, materiales y servicios de las zonas rurales (agua limpia, turismo, recursos culturales, plantas ornamentales, etc.) se movilizan en grandes cantidades hacia dentro de los centros urbanos, recursos que son consumidos, pero no recuperados de la forma adecuada, ya que aún se regresan residuos que contaminan las áreas circundantes de estos centros urbanos (Linares Rodríguez & Suárez Rico, 2017).

Aun con lo anterior se pueden enlistar algunas actividades urbanas que reduce el impacto y las orienta hacia el desarrollo sustentable.

Manejo de residuos

Techos verdes

Huertos urbanos (familiares o comunitarios

Captación de agua de lluvia

Uso de calentadores solares

Instalación de biodigestores urbanos

Sistemas de transporte urbano eficientes

Arquitectura sustentable

Además, es necesario cambios culturales que modifiquen hábitos consumistas a sistemas de economía ecológica, una economía que en general promete reducir los impactos medioambientales y que se diferencia de la economía ambiental dirigida hacia las necesidades personales y no la estabilidad de las sociedades.

Economía ambiental	Economía ecológica
Preferencias individuales	Preferencias sociales
Utiliza medidas monetarias.	Utiliza medidas físicas.
Organización como sistema cerrado.	Enfoque sistémico. Sistema abierto.
Maximizar la utilidad.	Minimizar el daño a generaciones futuras.
Se fundamente en eficiencia económica.	Se fundamente en los sistemas de valores.
Internaliza externalidades. Superficial.	Involucra costos sociales, ecológicos y ambientales.

Tomada y modificada de Linares Rodríguez y Suárez Rico (2017)

El índice de biodiversidad urbana como una estrategia innovadora para sustentabilidad.

De muchas formas es que claro que las ciudades representan un problema importante dentro de las estrategias y acciones para el desarrollo sustentable, puesto que las características particulares de las manchas urbanas y zonas metropolitanas no concuerdan con las medidas necesarias para reducir los impactos ambientales. Por dichas circunstancias, las ciudades tendrían que transformarse en un sentido muy radical, siendo sumamente necesario este cambio.

Acciones internacionales se han desarrollado como parte del trabajo en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), donde se han gestionado grupos de trabajo con expertos de la biodiversidad y expertos jurídicos para el establecimiento de colaboraciones de inversión entre países. Estos trabajos culminaron con el establecimiento del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica en la "cumbre de la tierra" (Río de Janeiro en 1992) cuando 30 países firman su ratificación, entrando

en vigor en 1993 e iniciando sus trabajos el 9 de diciembre de 1994 (CBD por sus siglas en inglés; https://cbd.int/history/).

Desde 2008, en Singapur y como parte de trabajo de la Secretaría del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica se estableció una nueva herramienta como estrategia para abordar la pérdida de biodiversidad generada por las actividades urbanas, herramienta que fue llamada "índice de biodiversidad urbana" (Chan et al., 2021). En este índice se establecen una serie de 28 indicadores los cuales se valoran con base en parámetros numéricos determinados según cada rubro de atención (biodiversidad, servicios ecosistémicos y gobernanza). Sin embargo, cada ciudad presenta distintas situaciones ambientales y se ven enfrentadas a problemáticas particulares. Por lo anterior cada uno de los indicadores tienen que ser ajustados y manejados según las condiciones locales tanto ambientales como aquellas que son inherentes a la gestión pública urbana, sea zona metropolitana, metrópoli municipal, zona conurbada o simplemente zona urbana.

Recurso digital

Si te interesa conocer la historia de los eventos de las distintas instituciones colaboradoras y programas de trabajo de la CBD, puedes revisar la línea del tiempo presentada en la siguiente página https://bit.ly/47dkeMc

Algo que es innovador e interesante desde un punto de vista más científico es que se agregan indicadores relacionados a la biodiversidad de especies, incluyendo **la riqueza de especies nativas** y que además se plantea **un máximo del 5% de especies exóticas invasoras con relación al total de especies nativas** (Chan et al., 2021). Aunque por ahora solo se enfoca sobre los grupos más vistosos y llamativos, es bastante alentador que se incluya temas de fragmentación, conectividad de los ecosistemas y restauración ambiental.

La siguiente lista de indicadores es traducida directamente del manual original de la Ciudad de Singapur (*Handbook on the Singapore Index on Cities' Biodiversity* disponible en https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-98-en.pdf).

Biodiversidad nativa en la ciudad	Proporción de áreas naturales en la Ciudad. (4 puntos)
	Conectividad o Fragmentación (4 puntos)
	Biodiversidad nativa en edificios (aves) (4 puntos)
	Especices nativas (plantas basculares) (4 puntos)
	Especies nativas (aves) (4 puntos)
	Especies nativas (artropodos) (4 puntos)
	Restauración de áreas. (4 puntos)
	% áreas naturales protegidas. (4 puntos)
	% de especies exóticas invasoras. (4 puntos)
Servicios ecosistémicos proporcionados por la biodiversidad	Regulación de la cantidad de agua. (4 puntos)
	Regulación del clima. (4 puntos)
	Servicios de recreación. (4 puntos)
	Proximidad y accesibilidad a áreas verdes. (4 puntos)
	Seguridada alimentaria (resiliencia). (4 puntos)

Gobernanza y manejo de la biodiversidad	Capacidad institucional. (4 puntos)
	Presupuesto destinado a la biodiversidad. (4 puntos)
	Políticas, leyes y regulación. (4 puntos)
	Condición del capital natural. (4 puntos)
	Condición de espacios verdes y azules. (4 puntos)
	Biodiversidad relacionada al cambio climático. (4 puntos)
	Políticas e incentivos para el desarrollo de áreas verdes. (4 puntos)
	Estado de colaboración intersectorial. (4 puntos)
	Proyectos de biodiversidad activos. (4 puntos)
	Educación ambiental. (4 puntos)

Como se observa en la tabla, a cada indicador se le asigna un valor en puntos, con el objetivo de valorar su avance de forma constante. Todos los criterios suman un total de 112 puntos (36 puntos para biodiversidad; 20 para servicios ecosistémicos; 56 para gobernanza y manejo de la biodiversidad).

Hasta 2023 en México, solo se conoce una ciudad del país que ha publicado electrónicamente su propio manual de trabajo aplicando el Índice de Biodiversidad Urbano de Singapur como base (IMPLAN & DGMA, 2020)

ACTIVIDAD TRANSVERSAL

Sistemas y conservación de la materia en las ciudades sustentables

El concepto de sistemas tiende a ser complejo que ha abarcado temas en todas las áreas del conocimiento, que se puede definir como un complejo de elementos que interactúan con un objetivo general o particular en relación de sus elementos, aunque el concepto puede variar enormemente entre las diferentes áreas del conocimiento (Bertalanffy, 1976).

Si bien es complicado establecer un concepto bien limitado, para ecología de sistemas se entiende como el conjunto de elementos (organismos, especies, poblaciones y comunidades), procesos y mecanismos (relaciones entre organismos, especies y medio fisicoquímico)

que mantienen o manejan un equilibrio subjetivo en la transferencia de energía biológica en relación con su medio fisicoquímico (Flos, 2005).

Es claro que los sistemas están limitados a las leyes naturales, pues las características de los sistemas no pueden escapar a ellas. En este sentido, una propuesta a la sustentabilidad urbana es una iniciativa de contabilidad económica llamada "balance de masas" o "ecobalance", basada en la primera ley de la termodinámica que considera tanto las entradas y salidas en un sistema urbano de producción-consumo (Linares Rodríguez & Suárez Rico, 2017).

De esta manera, los centros urbanos son considerados como sistemas complejos que necesitan definir correctamente su relación con su entorno para considerarse sustentables, para garantizar un adecuado suministro energético, de agua y de materiales, que además se puedan mantener por un largo periodo de tiempo sin comprometer su existencia (Córdova-Canela & Villagrana-Gutiérrez, 2015; Sobrino et al., 2015).



Componentes del ecobalance. Imagen tomada de (Linares Rodríguez & Suárez Rico, 2017).

El ingreso de materiales por los procesos industriales y comerciales genera a su vez una salida de residuos sólidos urbanos en cantidades que en términos de costos es prácticamente imposible manejar con recursos públicos. Algo que es importante denotar debido al número de metrópolis en México es que estas son las principales generadoras de residuos

urbanos, ya que en ellas se generan más del 70% del total generado a nivel mundial (Sobrino et al., 2015). Lo más preocupante para el caso de los residuos sólidos urbanos es que menos del 10% son reciclados o manejados correctamente, a pesar de que se podrían manejar y reintegrarlos de formas más adecuadas tanto a los sistemas productivos como a los ecosistemas circundantes.

Otro de los flujos de materia más importantes y que tiene un impacto dentro de una cuenca es el abastecimiento de agua para una ciudad y su retorno al afluente original, ya que el agua representa una necesidad primaria. En México existe un registro bastante amplio del agua producida en relación con el agua tratada antes de ser retornada a los caudales originales, lo cual demuestra que solo dos estados de toda la república mexicana tienen la capacidad de tratar más del 90% antes de retornarlas a las cuencas, diez estados superan el 50%, mientras que el restante de los estados trata menos del 50% de sus aguas producidas (potabilizadas introducidas a la red de distribución) (Sobrino et al., 2015).



NOTA: El caudal excedente de agua residual tratada se debe a que existen usuarios con fuentes de abastecimiento propias que descargan al alcantarillado municipal. fuente: SEMARNAT, el medio ambiente en México, 2013-2014.

Imagen tomada de (Córdova-Canela & Villagrana-Gutiérrez, 2015)

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 19

Tu casa como un sistema

Para poder comprender lo anterior, basta considerar a tu casa como un sistema y contabilizar tanto lo que entra como lo que sale, y de esta manera preguntarte cómo hacer más eficiente tu propio sistema hogareño. Puedes iniciar haciendo tu propio "balance de masas" con preguntas simples como:

1. ¿Cuánto plástico, vidrio o metales ingresa a mi casa? y ¿cuánto desecho directamente a los vertederos?

   _____

   _____

2. ¿Qué cantidad de materiales que utilizo es reciclado para volver a ser utilizado?

   _____

   _____

3. ¿Cuánta energía ingresa y cuanta energía es producida en mi sistema hogareño?

   _____

   _____

4. ¿Cuánta agua ingresa limpia? y ¿cuánta agua limpia o sucia sale de mi hogar?

   _____

   _____

5. Si tienes jardín, ¿cuánta materia orgánica entra y cuanta materia orgánica sale, de qué forma?

   _____

   _____

6. Tu sistema hogareño, ¿solo consume y gasta energía? ¿qué puedo hacer para cambiar esto?

   _____

   _____

7. Realiza un proyecto de mejoramiento de tu sistema hogareño y compártelo con tu grupo.

Actividad de aprendizaje 20

¿Qué estoy dispuesto a hacer?

Realiza un investigación y análisis de las alternativas y acciones sustentables que se realizan en las diferentes ciudades del mundo. Después investiga cuales de ellas se aplican en tu centro urbano o en los centros urbanos más cercanos a tu localidad y realiza una infografía sobre el tema y tus conclusiones, respondiendo a la pregunta *¿Qué estoy dispuesto a hacer para reducir mis huellas al medio ambiente?*

Restauración de los ecosistemas

Los ecosistemas dañados se pueden recuperar, y hay un par de disciplinas de la ecología en donde se trata de hacerlo de la mejor manera. La ecología de la restauración y ecología de la conservación se encarga de estudiar los procesos naturales y los elementos de los ecosistemas que son clave para motivar la restauración de un ecosistema degradado o perdido, lamentablemente nunca se logra regresar a un estado original, pero si se puede llevar hacia un punto cercano al original, o al menos se intenta regresar un porcentaje de la complejidad ecológica original.

Sin embargo, las estrategias de restauración siempre son complicadas y complejas, por lo que vamos a abordarlo con la ayuda de algunos videos que intentan explicar esta complejidad.

Actividad de aprendizaje 21

Haz lo que se te pide.

1. Escanea el código para ver el video *La ecología de los superhéroes*. Después elabora un organizador gráfico con la información obtenida.

La Ecología de los Superhéroes	Conceptos Clave
	• Emisiones de efecto invernadero. • Captación de carbono. • Huella de carbono.

2. Escanea el código para ver el video *Transplantes de popó*. Después elabora un organizador gráfico con la información obtenida.

¡Trasplantes de Popó!	Conceptos Clave
	• Especies dominantes. • Restauración de ecosistemas. • Salud de ecosistemas. • Biodiversidad.

3. Realiza una investigación de las especies de plantas que se utilizan en tu localidad para consumo y ornamentales, investiga su origen y etiquétalas como exóticas, nativas o endémicas según sea el caso. Te proponemos la siguiente tabla para recabar los datos.

Nombre común	Nombre científico	Uso (comestible, medicinal, ornamental)	Origen de la especie.	Nativa, exótica o endémica.

4. Calcula el porcentaje de especies exóticas, nativas y endémicas para tu localidad con los datos recabados.

EVALUACIÓN

1. Se refiere a un parámetro de magnitudes numéricas biofísicas que se utiliza para medir la cantidad de tierra necesaria para producir lo que consumimos y degradar lo que desechamos:

   a. Índice de biodiversidad.
   b. Indicador de sustentabilidad.
   c. Huella de carbono.
   d. Huella ecológica.

2. Podrían considerarse positivos si los cambios aumentan la productividad y la biodiversidad o negativos si reducen la productividad y merman la biodiversidad:

   a. Impactos ambientales.
   b. Índice de desempeño de la sustentabilidad.
   c. Productividad primaria.
   d. Huella ecológica.

3. Se encarga de estudiar los procesos naturales y los elementos de los ecosistemas que son clave para recuperar un ecosistema degradado o perdido:

   a. Ecología de poblaciones.
   b. Ecología de los ecosistemas.
   c. Ecología de la restauración.
   d. Ecología cuantitativa.

4. Son zonas costeras anóxicas sin capacidad productiva, producto del arrastre de fertilizantes aplicados en los cultivos agrícolas de todo el mundo:

   a. Zonas no productivas.
   b. Zonas costeras sobrefertilizadas.
   c. Zonas muertas costeras.
   d. Hotspots de la biodiversidad costera.

5. Son especies que se encuentran fuera de su distribución original, y tienen impactos importantes en los ecosistemas por ser muy prolíficas y exitosas:

   a. Especies dominantes.
   b. Especies invasoras.
   c. Especies nativas.
   d. Especies endémicas.

6. Son aquellos que permiten la continuidad natural, independientemente de los cambios existentes dentro del sistema:

   a. Servicios ambientales de soporte
   b. Servicios ambientales de regulación
   c. Servicios ambientales de provisión
   d. Servicios ambientales culturales

7. Son aquellos que permiten la regulación, manteniendo la variabilidad controlada y evitando cambios abruptos que deterioren el ecosistema:

   a. Servicios ambientales de soporte
   b. Servicios ambientales de regulación
   c. Servicios ambientales de provisión
   d. Servicios ambientales culturales

8. Estos servicios se encuentran representados por todo lo que puede utilizar el ser humano directamente de los ecosistemas:

   a. Servicios ambientales de soporte
   b. Servicios ambientales de regulación
   c. Servicios ambientales de provisión
   d. Servicios ambientales culturales

9. Son todos los espacios de recreación y condiciones para el esparcimiento humano:

   a. Servicios ambientales de soporte
   b. Servicios ambientales de regulación
   c. Servicios ambientales de provisión
   d. Servicios ambientales culturales

10. Se le denomina así a toda el agua utilizada que se encuentra almacenada como humedad en los seres vivos y el medio siempre que no se convierta en escorrentías:

    a. Agua azul
    b. Agua verde
    c. Agua gris
    d. Agua virtual

BIBLIOGRAFÍA

AgroDer. (2012). *Huella Hídrica en México en el contexto de Norteamérica*.

Aguilar-Rivera, N., Galindo-Mendoza, G., Contreras-Servin, C., & Fortanelli-Martínez, J. (2010). Zonificación productiva cañera en Huasteca. *Agronomía Tropical*, *60*(2), 139–154. https://www.researchgate.net/publication/262647862

Aguirre Muñoz, A., Mendoza Alfaro, R., Arredondo Ponce Bernal, H., Arriaga Cabrera, L., Campos González, E., Contreras-Balderas, S., Elías Gutiérrez, M., Espinosa García, F. C., Fernández Salas, I., Galaviz Silva, L., & García de León, F. J. (2009). Especies exóticas invasoras: impactos sobre las poblaciones de flora y fauna, los procesos ecológicos y la economía. In *Capital natural de México: Estado de conservación y tendencias de cambio. Conabio, México, pp. 277-318.6: Vol. II* (pp. 277–318).

Arellano-Aguilar, O., García-Mendoza, E., Thompson, K., & Tirado, R. (2016). *Zonas muertas: contaminación por fertilizantes*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22311.55205

Bertalanffy, L. von. (1976). *Teoría General de los Sistemas*.

Brasic, C., Harris-Ward, L., Moreau, G., Bustamante-Orellana, C., & Cevallos-Chavez, J. (2020). *Quantifying the impact of chronic lead toxicity on the American Bald Eagle (Haliaeetus leucocephalus) population in the Great Lakes Region*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.24166

Calvão, T., Pessoa, M. F., & Lidon, F. C. (2013). *Impact of human activities on coastal vegetation-A review Article in Emirates Journal of Food and Agriculture* ·. https://doi.org/10.9755/ajfa.v25i12.16730

Cecilia Gareis, M. (2022). La Huella Ecológica: un análisis de su origen conceptual y sus transformaciones metodológicas. *Revista de Estudios Marítimos y Sociales*, *enero 2022*(20), 187–208.

Chan, L., Hillel, O., Werner, P., Holman, N., Coetzee, I., Galt, R., & Elmqvist, T. (2021). *Handbook on the Singapore Index on Cities' Biodiversity (also known as the City Biodiversity Index)*. Secretariat of the Convention on Biological Diversity. www.emdashdesign.ca

Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras. (2010). *Estrategia nacional sobre especies invasoras en México, prevención, control y erradicación*. www.conabio.gob.mx

CONABIO. (2006). *Capital natural y bienestar social*. Comision Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

Córdova-Canela, F., & Villagrana-Gutiérrez, A. (2015). La ciudad modelada como ecosistema: principios y estrategias para la sustentabilidad de los sistemas del metabolismo urbano de la ciudad. *Revista Nodo*, *9*(18), 59–66.

Čuček, L., Klemeš, J. J., & Kravanja, Z. (2012). A review of footprint analysis tools for monitoring impacts on sustainability. *Journal of Cleaner Production*, *34*, 9–20. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.02.036

Edward, J., & Rykiel, J. (1985). Towards a definition of ecological disturbance. *Australian Journal of Ecology*, *10*, 361–365.

ELAW. (2010). *Guía Para Evaluar EIAs de Proyectos Mineros*.

FAO. (2020). Climate change: Unpacking the burden on food safety. In *Climate change: Unpacking the burden on food safety*. FAO. https://doi.org/10.4060/ca8185en

Flos, J. (2005). El concepto de información en la ecología margalefiana. *Ecosistemas*, *14*(1). http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=82&Id_Categoria=2&tipo=portada

Frisbee, S. J., Brooks Jr., A. P., Maher, A., Flesborg, P., Arnold, S., Fletcher, T., Steenland, K., Shankar, A., Knox, S. S., Pollard, C., Halverson, J. A., Vieira, V. M., Jin, C., Leyden, K. M., & Ducatman, A. M. (2009). The C8 Health Project: Design, Methods, and Participants. *Environmental Health Perspectives*, *117*(12), 1873–1882.

Gómez-Ortega, R., Ramos-Santiago, E., & Romero-Berny, E. (2019). Problemas asociados con la rectificación y cambio de cauce de ríos en los sistemas lagunares de la costa de Chiapas, México. *Ciencia Pesquera*, *27*(2), 59–67.

González-Ulibarry, P. (2019). *Consecuencias ambientales de la aplicación de fertilizantes*. http://bcn.cl/28ziq

Ignacio, G., & Alcocer, G. (2019). La transición energética hacia las tecnologías limpias: un motor para el desarrollo de México. In M. Anglés Hernández & M. Palomino Guerrero (Eds.), *Aportes sobre la configuración del derecho energético en México* (1st ed.). UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS; COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. www.juridicas.unam.mxhttps://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

IMCO. (2022). *Nota informativa: Prodesen refleja una falta de compromiso del Estado mexicano con el medio ambiente*.

IMPLAN, & DGMA. (2020). *Índice de biodiversidad urbana; ciudad de León, Guanajuato 2020*.

IPCC, & TEAP. (2005). *Safeguarding the Ozone Layer and the Global Climate System*.

Kidd, J., Manning, P., Simkin, J., Peacock, S., & Stockdale, E. (2017). Impacts of 120 years of fertilizer addition on a temperate grassland ecosystem. *PLoS ONE*, *12*(3). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174632

Lebreton, L., Slat, B., Ferrari, F., Sainte-Rose, B., Aitken, J., Marthouse, R., Hajbane, S., Cunsolo, S., Schwarz, A., Levivier, A., Noble, K., Debeljak, P., Maral, H., Schoeneich-Argent, R., Brambini, R., & Reisser, J. (2018). Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic. *Scientific Reports*, *8*(1). https://doi.org/10.1038/s41598-018-22939-w

Linares Rodríguez, M. C., & Suárez Rico, Y. M. (2017). Los costos ambientales: un análisis de la producción científica en el periodo 1977-2016 y una revisión de herramientas y teorías subyacentes. *Criterio Libre*, *15*(27), 89–114.

Lowe, S., Browne, M., Boudjelas, S., & de Poorter, M. (2004). *100 de las Especies Exóticas Invasoras más dañinas del mundo. Una selección del Global Invasive Species Database*. www.issg.org/

Medina, F. M., Bonnaud, E., Vidal, E., Tershy, B. R., Zavaleta, E. S., Josh Donlan, C., Keitt, B. S., le Corre, M., Horwath, S. v., & Nogales, M. (2011). A global review of the impacts of invasive cats on island endangered vertebrates. In *Global Change Biology* (Vol. 17, Issue 11). Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2011.02464.x

Molina, M. J., & Rowland, F. S. (1974). Stratospheric sink for chlorofluoromethanes chlorine atome-catalysed destruction of ozone. *Nature*, *249*, 810–812.

Monárrez-González, J. C., Pérez-Verdín, G., López-González, C., Márquez-Linares, M. A., & González-Elizondo, M. D. S. (2018). Effects of forest management on some ecosystem services in temperate forest ecosystems of Mexico. *Madera y Bosques*, *24*(2). https://doi.org/10.21829/myb.2018.2421569

Pacini, N., Pechar, L., & Harper, D. M. (2019). Chemical Determinands of Freshwater Ecosystem Functioning. In *Freshwater Ecology and Conservation: Approaches and Techniques* (pp. 89–105). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198766384.003.0005

Pedroza-Gutiérrez, C., & Catalán-Romero, J. M. (2017). Evolución histórica y ambiental en los procesos de trasformación del lago Chapala. *Ambiente y Desarrollo*, *21*(40), 9. https://doi.org/10.11144/javeriana.ayd21-40.ehap

Pierret, A., Maeght, J. L., Clément, C., Montoroi, J. P., Hartmann, C., & Gonkhamdee, S. (2016). Understanding deep roots and their functions in ecosystems: An advocacy for more unconventional research. *Annals of Botany*, *118*(4), 621–635. https://doi.org/10.1093/aob/mcw130

Reyes Tirado, Kirsten, Thompson., Arellano-Aguilar, O., Ponce de León-Hill, C., García-Mendoza, E., Olivos-Ortiz, A., Rivas-Camargo, D., Bermúdez-Romero, A., Sánchez-Bravo, Y., Zenteno-Palma, C., & Mora-Vallin, Z. (2016). *Los ecosistemas del mundo amenazados por la contaminación con fertilizantes Zonas muertas*. http://www.wri.org/resource/

Ritchie, H., & Roser, M. (2018). *Plastic Pollution*. Published Online at OurWorldInData.Org. https://ourworldindata.org/plastic-pollution

Rodríguez Martínez, J., Blanco Martín, J. M., & Rodríguez Martínez, V. (2013). *Ecología* (3a ed.). EDICIONES PIRÁMIDE.

Romero, J. I., Correa, R., Sosa, F. A., Sotomayor, C., Morandini, M., Aranda, N., & Sanzano, G. A. (2014). Estudios del sistema radicular de la caña de azúcar en Tucumán. Método de la pared de perfil. *Avance Agroindustrial*, *36*(1), 14–20.

Salimath, M. S., & Jones, R. (2011). Population ecology theory: Implications for sustainability. In *Management Decision* (Vol. 49, Issue 6, pp. 874–910). https://doi.org/10.1108/00251741111143595

Santayo, É., & Barragán-Reyes, R. M. (2010). Energía geotérmica. *Ciencia*, *abril-junio*, 40–51.

SEDATU, CONAPO, & INEGI. (2020). *Metrópolis de México*.

Shin, H. M., Vieira, V. M., Barry Ryan, P., Steenland, K., & Bartell, S. M. (2011). Retrospective exposure estimation and predicted versus observed serum perfluorooctanoic acid concentrations for participants in the c8 health project. *Environmental Health Perspectives*, *119*(12), 1760–1765. https://doi.org/10.1289/ehp.1103729

Silva Rodríguez de San Miguel, J. A. (2019). Energía renovable en México: Retos y oportunidades. *Espacios*, *40*(25), 29.

Sobrino, J., Garrocho, C., Graizbord, B., Brambila, C., & Guillermo Aguilar, A. (2015). *Ciudades sostenibles en México: una propuesta conceptual y operativa*. Producción Creativa.

Teaf, C. M., Garber, M. M., Covert, D. J., & Tuovila, B. J. (2019). Perfluorooctanoic Acid (PFOA): Environmental Sources, Chemistry, Toxicology, and Potential Risks. *Soil and Sediment Contamination*, *28*(3), 258–273. https://doi.org/10.1080/15320383.2018.1562420

Tollefson, J. (2019). One million species face extinction. *Nature*, *569*, 171.

Zhang, X., & Huang, X. (2019). Human disturbance caused stronger influences on global vegetation change than climate change. *PeerJ*, *2019*(9). https://doi.org/10.7717/peerj.7763

NOTAS

NOTAS